臺灣總督府

中央研究所農業部報告

第五十五號

臺灣產昆蟲目錄

（鞘翅目）

臺灣總督府中央研究所

昭和六年十月

本報告ハ臺灣産昆蟲ノ中今日マテニ知ラレタル鞘翅目ニ屬スル二千三百餘種ニ就キ其學名産地及分布狀態ヲ明カニシ之ヲ蒐錄記載セルモノニシテ本目錄ノ刊行ハ本島ニ於ケル農林業上學術的參考ニ資スルトコロ不尠ト信ス

昭和六年八月

臺灣總督府中央研究所農業部長

農學博士 大島金太郎

凡　例

(1) 本目錄編纂ニ當リ使用セシ標本ハ總テ當農業部昆蟲標本館ニ現存セルモノナリ

(2) 現在迄ノ調査ニ於テ臺灣産鞘翅目ニ屬スル昆蟲ハ既ニ5,000種ヲ越ユル事ヲ知リ得タリ　其中種名ノ適確ナルモノ2,300餘種ヲ本目錄ニ掲載セリ　卽チ上記調査材料ヲ骨子ト爲シ更ニ從來臺灣産トシテ發表セラレシモノヲ文獻ニヨリ摘出シ猶新シク決定セル種ヲモ逐次追加シテ昭和六年八月ニ及ヘリ

(3) 本目錄ハ應用動物科長技師農學博士素木得一氏指導ノ下ニ之ヲ編纂セリ又部分的ノ種ノ査定ニハ次ノ各國專門家ノ助力ヲ煩ハセリ　卽チ隱翅蟲科 (Staphy-linidae) ハ M. Bernhauer 氏 (Austria), 閻魔蟲科 (Histeridae) ハ H. Desbordes 氏 (France), 僞叩頭蟲科 (Melasidae) ハ E. Fleutiaux 氏 (France), 龍蟲科 (Dytscidae) ハ L. Gschwendtner 氏 (Austria), 象鼻蟲科 (Curculionidae) ハ河野廣道氏 (札幌), 鍬形蟲科 (Lucanidae) ハ P. Nagel 氏 (Hannover), 吉丁蟲科 (Buprestidae) ハ J. Obenberger 氏 (Csekoslovakia), 金花蟲科 (Chrysomeridae) ハ F. Spaeth 氏 (Austria) 等ナリ　其他文獻ノ渉獵、標本ノ蒐集、種ノ査定ニ關シ河野廣道、瀧澤求、箕輪重胤ノ諸氏及部員技手楚南仁博、高橋良一兩氏ノ少カラヌ助力ヲ得タリ

(4) 各科ノ配列ハ Fowler 氏ニ從ヒ Fauna of British India (1912) ニ掲載セルモノヲ採用シ屬、種ノ配列ハ Coleopterorum Catalogus (auspiciis et auxilio W. Junk, edites a S. Schenkling, 1910–'31) ニ從ヒタルモ一部ハ Catalogus Coleopterorum Synonymicus et Systematicus (autoribus Dr. Gemminger et B. de Harold, 1868–'74) ニ從ヘリ

(5) 分布ハ便宜上 Local Distribution 及 General Distribution ノ 2 項ニ分テリ

(6) 各種ニハ原記載文獻ノミヲ掲ケタリ

技師　三輪勇四郎

臺灣總督府中央研究所 農業部報告 第五十五號

臺灣產昆蟲目錄（鞘翅目）目次

I 臺灣產鞘翅目ニ關スル文獻 …… I

II 臺灣產鞘翅目分科一覽表 …… A

III 臺灣產鞘翅目分類目錄 …… 1

IV 學名索引 …… 315

臺灣產昆蟲目錄

鞘翅目

I. 臺灣產鞘翅目ニ關スル文獻

BIBLIOGRAPHY

ACARD, J. Notes sur les Scaphidiidae du Musée de Leyde.
(Zool. Med. Leyd. VI., pp. 84-91, 1921).

ANDREWES, H. E. A revision of the oriental species of the genus Tachys (*Halparinae; Carabidae*).
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, LI., pp. 327-502, 2 pls. 1923-25).

ARROW, G. J. Notes on the lamellicorn genus Popillia and descriptions of some new oriental species in the British Museum.
(Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII., pp. 38-54, 1913).

——— A revision of the Melolonthine beetles of the genus Ectinohoplia.
(Proc. Zool. Soc. Lond. XIX., pp. 267-276, 1921).

BATES, A. W. On a Collection of Coleoptera from Formosa sent home by R. Swinhoe, Esq. H. B. M. Consul, Formosa. (*Carabidae, Serricornes, Lamellicornes, Longicornes, Phitophaga*).
(Proc. Zool. Soc. Lond., pp. 339-355, 1866).

BERNHAUER, M. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Staphylinidae*, I).
(Arch. Naturg. LXXXVIII., A. 7., pp. 220-237, 1922).

BICKHARDT, H. Die Histeriden aus H. Sauter's Formosa-Ausbeute, I.
(Ent. Blätt. VIII., pp. 122-127, 1912).

——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Histeridae*, II).
(Ent. Mitteil. II., pp. 166-177, 1913).

BOILEAU, H. Déscription de Coleopteres nouveaux.
(Le Naturaliste XXVII., 2s, 19, p. 47, 1905).

BOLKAY, S. Descriptions of some new Brenthidae.
(Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. Budapest, IX., pp. 263-265, 1911),

BOPPE, P. Déscription d'une éspèce nouvelle de Rosalia de Formosa.
(Bull. Soc. Ent. Fr., pp. 103-107, 1911).

BORCHMANN, F. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Lagriidae, Alleculidae, Cantharidae*).
(Suppl. Ent. I., pp. 6-12, 1912).

——— Eine neue Gattung der Statirinae.
(Ent. Mitteil. 4., pp. 296-299, 1915).

——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Alleculidae, Othnidae*).
(Arch. Naturg. LXXXII., A. 5, p. 101, 1916).

——— Othnidae, versuch einer ubersicht über die Familie.
(Arch. Naturg. LXXXVII., A. Hefte I., pp. 191-215, 1921).

BORCHMANN, F. Neue Heteromeren aus dem Malayischen Gebiete.
(Treubia, Buitenzorg, VI., pp. 329-354, 1925).
BORN, P. Carosoma maximowiczi sauteri nov. subspec.
(Soc. Ent. XXIV., p. 99, 1909).
BOUCOMONT, A. Onthophagus Asiatiques.
(Ann. Mus. Civ. Stor. Genova, XLVI., pp. 211-242, 1914).
BOURGOIN, A. Description de deux Trigonophorus nouveaux de Formose.
(Bull. Soc. Ent. Fr., p. 438, 1914).
——— Descriptions de Cetonides nouveaux de Formose, des genres Ingrisma et Torynorrhina Arrow.
(Bull. Soc. Ent. Fr., p. 456, 1914).
——— Description de trois Macronota nouveaux de Formose.
(Bull. Soc. Ent. Fr., p. 167, 1915).
——— Description d'un Cetonia nouveaux de Formose.
(Bull. Soc. Ent. Fr., p. 174, 1915).
——— Description de deux Trichiini nouveaux de Formose.
(Bull. Soc. Ent. Fr., p. 177, 1915).
BRENSKE, E. Die Serica-Arten der Erde; B. Oriental Region.
(Berl. Ent. Zeitschr. XLIII., pp. 205-404, 1898).
CSIKI, E. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico.
(Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. IX., pp. 611-612, 1911).
——— Scaphidiidae formosae novae.
(Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. XXI., p. 32, 1924).
DUDICH, E. Eine neue Neolucanus-Art aus Formosa.
(Ent. Blätt. XIX., pp. 17-18, 1923).
DUPUIS, P. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Carabidae*).
(Ann. Soc. Ent. Belg. Bruxelles, LVI., pp. 282-291, 303-338, 1912; LVII., pp. 263-269, 1913; LVIII., pp. 29-36, 1914).
EGGERS, F. H. Japanishe Borkenkäfer, I.
(Ent. Blätt. XXII., pp. 145-148 (p. 147) 1926).
van EMDEN, F. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Sandaliidae*).
(Ent. Mitteil. XIII., pp. 28-34, 1924).
FAIRMAIRE, L. Descriptions de Coleopteres nouveaux recueillis en Chine par M. de Latouche.
(Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII., pp. 617-643, 1899).
FENEYS, A. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Aleocharinae: Staphylinidae*).
(Arch. Naturg. LXXX., A. 2, pp. 45-55, 1914).
FLEUTIAUX, E. Remarques sur les espèces du genre Pterotarsus Guerin (Galba Aus.) (*Melasidae*).
(Ann. Soc. Ent. Fr. XCII., p. 308, 1923).
——— Melasidae nouveaux.
(Bull. Soc. Ent. Fr. pp. 206-209, 1929).
——— Description d'un Campsosternus nouveau de la collection du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris.
(Bull. Mus. Paris, II., No. 4, p. 409, 1930).
FOWLER, W. W. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Languriidae*).
(Arch. Naturg. LXXIX., A. pp. 132-138, 1913).
GAHAN, C. T. Description of a new genus and species of Longicorn-Coleoptera from Central Formosa.
(Ann. Mag. Nat. Hist. V., pp. 308-309, 1900).

GEBIEN, H. Die Tenebrioniden (Coleoptera) des Indo-Malayischen gebietes, unter berueck-sichtigung der benachbarten Faunen, III, IV, V, VI, VII.
(Philip. Journ. Sc. XXVI., No. 4, p. 563; XXVII., No. 1, p. 155; No. 2, p. 260; No. 3, p. 445; No. 4, p. 570, p. 588, 1925).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Tenebrionidae*).
(Arch. Naturg., A. 9, pp. 1-58, 1913).
GESTRO, R. Alcumi nuovi Ichthyurus (*Telephoridae*).
(Ann. Mus. Giv. Stor. Genova, 3ª V (XLV), pp. 44-51, 1911).
GILLET, J. J. E. Descriptions d'Onthophagus nouveaux d'Asie Tropicale.
(Ann. Soc. Sc. Brux. XLIV., pp. 66-70, 1924).
——— Descriptions de Lamellicornes coprophages nouveaux.
(Ann. Soc. Ent. Belg. LXVII., pp. 251-261, 1927).
GRAVELY, F. H. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Passalidae*).
(Suppl. Ent. III., pp. 30-32, 1914).
GROUVELLE, A. Deux especes nouvelles du genre Heterocerus.
(Not. Leyd. Mus. XXXIII., pp. 107-110, 1911).
——— Psammoecus nouveaux du Musée de Leyde (*Cucujidae*).
(Not. Leyd. Mus. XXXIV., pp. 81-94, 1912).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Rhysodidae, Nitidulidae, Ostomidae, Colydiidae, Passandridae, Cucujidae, Cryptophagidae, Diphyllidae, Lathridiidae, Mycetophagidae, Dermestidae*).
(Arch. Naturg. LXXIX., A. pp. 33-73, 1913).
GSCHWENDTNER, L. Neue Dytiscidae aus Formosa.
(Ent. Anzeig. XI., No. 1, p. 21, 1931).
HAAG-RUTENBERG Beitrag zur Kenntnis der Canthariden.
(Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIV., p. 26, 1880).
HELLER, K. M. Die Arten der Brenthiden-Gattung Calodromus.
(Not. Leyd. Mus. XXXII., pp. 177-183, 1910).
——— Eine neue Ceracupes-Art aus Formosa.
(Ann. Soc. Ent. Belg. LV., pp. 256-257, 1911).
——— Faunastische Notizen über Rüsselkäfer.
(Ent. Mitteil. I., p. 11, 1912).
——— Über Nigidius-Arten von Formosa und den Philippinen.
(Ent. Mitteil. VI., pp. 170-174, 1917).
——— Beitrag zur Kenntnis der Erotyliden der Indo-Australischen Region mit besonderer Berücksichtigung der Philippinischen Arten.
(Arch. Naturg. LXXXIV., pp., 1-121, 1920).
——— Curculioniden aus Franzoisch Indo-China.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., Hefte I, p. 18, 1922).
——— Studien zur Systematik der altweltlichen Balanini I & II (*Curculionidae*).
(Stett. Ent. Zeit. LXXXVI., II, pp. 86-134, 1925; LXXXVIII., II, pp. 175-287, 1927).
——— 5. Bestimmungstabelle aussereuropäischerkäfer (*Curculionidae: Curculionidae*).
(Ent. Blätt. XXII & XXIII., p. 9, p. 11, 1926-27).
——— Fauna Buruana: *Curculionidae*.
(Treubia, Buitenzorg. VII., Suppl. pp. 105-138, 1929).
HORN, W. On three new Cicindelinae.
(Not. Leyd. Mus. XXXI, p. 186, 1909).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Cicindelidae*).
(Ent. Mitteil. I., pp. 129-139, 1912).

HOZAWA, S. Notes on a New Termitophilous Coleoptera found in Formosa (*Rhysopaussidae*).
(Ann. Zool. Jap. VIII., pp. 483–488, 1914).

HUBENTHAL, W. Beitrage zur Kenntnis der Curculioniden Gattung Acicnemis, Lacordaire.
(Arch. Naturg. LXXXIII., A. Hefte 8, pp. 92–100; Hefte 9, pp. 53–155, (1917) 1919).

JORDAN, K. New oriental Anthribidae.
(Nov. Zool. X., pp. 415–434, 1903).

——— Formosan Anthribidae collected by H. Sauter.
Nov. Zool. Tring. XIX., pp. 137–145, 1912).

——— New Anthribidae.
(Nov. Zool. Tring. XXXI., pp. 231–255, 1924).

KANO, T. Notes on Longicorn Coleoptera from Japan, Part 1-9.
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVI, No. 85, pp. 101–137, 1926; XVII, No. 88, pp. 43—70; No. 87, pp. 146–151. No. 91, pp. 284–287, 1927; XVIII, No. 95, pp. 118–130; No. 97, pp. 224–229; No. 93, pp. 346–358; No. 99, pp. 402–413, 1928).

——— An unrecorded species of Cetoniinae from Formosa (Japanese).
(Ins. World Gifu Japan, XXXII., No. 369, p. 153, 1928).

——— Nine unrecorded species of Endomychidae from Formosa (Japanese).
(Ins. World Gifu, Japan, XXXII., No. 371, pp. 219–224; No. 372, pp. 259–263, 1928).

——— Seven unrecorded species of Erotylidae from Formosa (Japanese).
(Ins. World Gifu, Japan, XXXII., No. 373, pp. 293–300, 1928).

——— A list of Cicindelidae of Botel-Tobago (Kôtôsho), with a Consideration of it's Insect-Fauna (Japanese, with English descriptions).
(Kontyû, III., No. 2, pp. 76–82, 1929).

——— Materials for the Studies on the Ground-Beetles (*Carabidae*) from Formosa.
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, pp. 521–525, 1929).

——— The distributions of the Curculionid-Beetles of the Genus Pachyrrhynchus Germar, with a consideration of Insect Fauna of the Island of Botal-Tobago and its adjacent Islands.
(Kontyû, III., No. 4, pp. 232–238, 1930).

——— Two unrecorded species of Mordellidae from the Japanese Empire. (Japanese).
(Kontyû, IV., No. 1, pp. 51–52, 1930).

——— On some Coleoptera of the Japanese Empire (Japanese).
(Kontyû, IV., No. 1, pp. 63–65, 1930).

——— Formosan Paussidae, with Descriptions of two new Species (Japanese with English descriptions).
(Kontyû, IV., No. 2, pp. 90–93, 1930).

——— Contribution to the Cerambycoideous-Fauna of Formosa, Part 1 & 2.
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, pp. 24–31; No. 107, pp. 77–80, 1930).

——— On the two species of Cicindelidae from Hôkotô Islands (Pescadores) (Japanese).
(Ins. World, XXXII., 369, No. 9, pp. 17–19, 1930).

——— A list of Brenthidae from the Japanese Empire, with description of a new species.
(Kontyû, IV., No. 3, pp. 151–154, 1930).

——— New and unrecorded Longicorn-beetles from the Japanese-Empire.
(Ins. Mats. V., No. 1 & 2, pp. 41–48, 1930).

KERREMANN, CH. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Buprestidae* I, II, III).
(Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, pp. 203–209; A. 11, pp. 110–116, 1912: LXXIX., A. 8, pp. 102–107, 1913).

KLEINE, R. Neue Taphroderini (*Brenthidae*).
(Ent. Mitteil. V., pp. 1-92, 1916).

——— Ein neues Brenthidengenus aus dem Deutschen Ent. Institut Dahlem.
(Ent. Mitteil. XI., Nr. 3, p. 93, 1922).
——— Neue Brenthiden.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., I, p. 133, 1922).
——— Die Gattung Lyponia, Waterhouse.
(Ent. Blätt. XX., Hefte III., pp. 170–175, 1924).
——— Die Gattung Macrolycus C. O. Waterh.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., pp. 325–331, 1925).
——— Die Lyciden Formosas.
(Stett. Ent. Zeit. LXXXVII., p. 97, 1926).
Kono, H. Beitrag zur den Rhipiphoriden-Arten von Japan.
(Ins. Mats. I., No. 4, pp. 177–182, 1927).
——— Beitrag zur Kenntnis der Attelabinen-Fauna Japans.
(Ins. Mats. II., No. 1, pp. 34–45, 1927).
——— Eine Liste der Apioninen Japan, mit der Beschreibung einer neuen Art.
(Trans. Sapporo, Nat. Hist. Soc. IX., pp. 239–242, 1927).
——— Einige Mordelliden-Arten aus Japan und Formosa.
(Ins. Mats. II., No. 3, pp. 146–150, 1928).
——— Einige Curculioniden Japans.
(Ins. Mats. II., No. 4, pp. 163–177, 1928).
——— Die Mordelliden Japans.
(Trans. Sapporo, Nat. Hist. Soc. X., No. 1, pp. 29–46, 1928).
——— Apoderus brachialis, Voss und Phymatapoderus monticola, Voss (Japanese).
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVIII., No. 94, pp. 12–18, 1928).
——— Über 2 neue Gattungen von Rhynchitinen und ihre Lebensweise.
(Trans. Sapporo Nat. Hist. Soc. X., 2, pp. 122–137, 1929).
——— A study on the Rhipiphoridae from the Japanese Empire (Japanese).
(Zool. Mag. Tokyo, XLI., No. 485, pp. 130–138, 1929).
——— Die Pyrochroiden Japans.
(Ins. Mats. III., No. 2 & 3, pp. 61–72, (1929).
——— Die Mordelliden Japans (Nachtrag).
(Ins. Mats. III., No. 2 & 3, pp. 83–86, 1929).
——— Beitrag zur Silphiden-Fauna Japans.
(Ins. Mats. III., No. 4, pp. 157–164, 1929).
——— Die Lagriiden Japans.
(Ins. Mats. IV., No. 1 & 2, pp. 25–35, 1929).
——— Die Cleoninen Japans.
(Ins. Mats. IV., No. 1 & 2, pp. 49–63, 1929).
——— Einige Alleculiden-Arten aus Japan und Formosa.
(Ins. Mats. IV., No. 3, pp. 95–99, 1930).
——— Die Mordelliden Japans (Zweiternachtrag).
(Ins. Mats. IV., No. 3, p. 104, 1930).
——— Langrüssler aus dem Japanischen Reich.
(Ins. Mats. IV., No. 3, pp. 137–143, 1930).
——— Cerogria miwai, nova species (*Lagriidae*).
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 18, 1930).
——— Kurzrüssler aus dem Japanischen Reich.
(Journ. Col. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. Sapporo, Japan, XXIV., pp. 153–237, 1930).
——— Die Apoderinen aus den Japanischen Reich.
(Journ. Fac. Agr. Hokkaido, Imp. Univ. Sapporo, XXIX., 2, pp. 37–83, 1930).

Kono, H Langrüssler aus japanischen Reich (II).
(Ins. Mats. IV., No. 4, pp. 145-162, 1930).
——— Die biologischen Gruppen der Rhynchitinen, Attelabinen und Apoderinen.
(Journ. Fac. Agr. Hokkaido Imp. Univ. Sapporo Japan, XXIX., part 1, 1930).
Kriesche, R. Die Gattungen Batocera Cast. systematisch u. phylogenischtiergeographisch betrachtet.
(Arch. Naturg. LXXX., A. 11, pp. 111-150, 1915).
——— Bemerkungen über einige Trictenotomiden (Coleopt.).
(Arch. Naturg. LXXXIII., A. 11. p. 150, (1917) 1919).
——— Zur Kenntnis der Lucaniden.
(Arch. Naturg. LXXXVI., A. 8, pp. 92-107, (1920) 1921).
——— Ueber Eurytrachelus titanus Boisd. und seine Rassen.
(Arch. Naturg. LXXXVI., A. 8, pp. 114-119, (1920) 1921).
——— Zur Kenntnis der Laminen.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., pp. 285-29[illegible] 1924).
——— Neue Lucaniden.
(Stett. Ent. Zeit., p. 385, 1926).
Kuntzen, H. Bemerkungen über einige Trigonotominen des Indomalayischen Gebietes (*Carabidae*).
(Ent. Rundsch. Stuttgart, XXVIII., pp. 175-176, 1911).
Kuwayama, S. Lema oryzae sp. nov.
(Ins. Mats. V., No. 3, p. 155, 1931).
Laboissier, V. Nouveaux Galerucini de la faune d'Asie.
(Rev. Chil. Hist. Nat. XXXIII., pp. 289-294, 1929).
——— Observations sur les Galerucini Asiatiques, principalement du Tonkin et du Yunnan, et descriptions de nouveaux genres et espèces.
(Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII., pp. 252-238, 1929).
Lameere, A. Revision des Prionides II.
(Mém. Soc. Ent. Belg. XXI., pp. 1-188, 1912).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Prioninae*).
(Arch. Naturg. LXXIX., A. 7, p. 176, 1913).
Lesne, P. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Bostrichidae, Lyctidae*).
(Suppl. Ent. III., pp. 11-14, 1914).
Lewis G. On new species of Histeridae and Notes of others.
(Ann. Mag. Nat. Hist. XVI., pp. 54-56, 1915).
Maki, M. On the insurious insects of mulberry tree in Formosa (Japanese).
(Bull. Dept. Agr. Gov. Res. Inst. Formosa, 1916).
——— On Pyrocoelia foochowensis, Gorh. (Japanese).
(Ins. World XXXI., 355, pp. 74-75, 1927).
Matsumura, S. Thousand insects of Japan, Vol. II, III & IV (1905-7).
——— Beschreibung von am Zuckerrohr Formosas schädlichen oder nützlichen Insecten.
(Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII., pp. 140-148. 1911).
Matsumura, S. & Yokoyama, K. An interesting Dermestid-Beetle from Japan.
(Ins. Mats. II., No. 3, p. 130, 1928).
——— New and hitherto unrecorded species of Dermestidae from Japan.
(Ins. Mats. III., No. 1, pp. 51-54, 1928).
Miwa, Y. Descriptions of new Species of Japanese Elateridae.
(Ins. Mats. II., No. 1, pp. 12-22, 1927).
——— A List of Lucanidae with the description of one new Species.

(Ins. Mats. II, No. 1, pp. 25–31, 1927).

——— New and some rare species of Elateridae from the Japanese Empire.
(Ins. Mats. II, No. 2, pp. 105–114, 1927; No. 3, pp. 133–146, 1928; III., No. 1, pp. 36–51, 1928).

——— A study on the species of Meloidae in the Japanese Empire.
(Trans. Sapporo, Nat. Hist. Soc. X., pp. 63–78, 1928).

——— On the Rhipiceridae of Japan and Formosa (Japanese with English résumé).
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVIII., No. 99. pp. 371–376, 1928).

——— A Study on some Buprestidae from the Japanese Empire (Japanese).
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 100, pp. 54–62, 1929).

——— An Addition to the List of Lucanid-species from the Japanese Empire.
(Ins. Mats. III., No. 2–3, pp. 71–76, 1929).

——— On the Erotylidae of Japan, Formosa, Korea and Saghalien.
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 101, pp. 120–128, 1929).

——— A new stag-beetle belonging to the genus Dorcus from Formosa.
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 103, pp. 351–354, 1928).

——— Elateridae of Formosa (I–V).
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa XIX., No. 102, pp. 225–246; No. 105, pp. 485–495, 1929; XX, No. 106, pp. 1–12; No. 107, pp. 57–68, 1930; No. 113, pp. 72—98, 1931).

——— A list of Coleoptera from the Pescadores (Hōkotō), collected by Mr. R. Takahashi in June.
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 104, pp. 469–470, 1929).

——— A new Formosan blister-beetle of the genus Meloe.
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, pp. 12–13, 1930).

——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Elateridae*, I & II).
(Wien. Ent. Zeit. XLVII., Hefte 2, pp. 91–97, 1930; Hefte 4, pp. 205–208, 1931).

——— On the Rhysodidae of Formosa (Japanese).
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX, No. 111, pp. 384–385, 1930).

MÖLLENKAMP, W. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Lucanidae*, I & II).
(Ent. Mitteil. I., No. 1, pp. 6–8, 1913: Suppl. Ent. No. 2, pp. 18–21, 1913).

MOSER, J. Beitrag zur Kenntnis der Cetoniden.
(Ann. Soc. Ent. Belg. LIII., pp. 313–323, 1909; LIV., pp. 355–367, 1910; LV., pp. 119–129, 1911; LVII., pp. 155–169, 1913; Deutsch. Ent. Zeitschr. Berlin, pp. 293–301, 1910; pp. 560–574, 1912; pp. 573–614, 1914; Stett. Ent. Zeit. LXXVII., p. 141, 1916).

——— Beitrag zur Kenntnis der Melolonthiden.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., pp. 271–297, 1913; Stett. Ent. Zeit. LXXX., pp. 330–364, 1919).

——— Neue Arten der Melolonthiden Gattungen Holotrichia und Brahmina.
(Ann. Soc. Ent. Belg. LIII., pp. 468–478, 1909).

——— Neue Arten der Melolonthiden Gattungen Holotrichia und Pentelia.
(Ann. Soc. Ent. Belg. LVII., p. 436, 1913).

——— Neue Serica-Arten.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., pp. 339–393, 1915).

——— Neue Melolonthiden aus der Sammlung des Deutschen Entomologischen Museum zu Berlin-Dahlem.
(Stett. Ent. Zeit. LXXIX., pp. 209–247, 1918).

MURAYAMA, J. On the Platypodidae of Formosa.
(Journ. Coll. Agr. Hokkaido, Imp. Univ. Sapporo, Japan, XV., 4, pp. 197–236, 1925).

——— Supplementary Notes on the Platypodidae of Formosa, II.
(Journ. Col. Agr. Hokkaido, Imp. Univ. Sapporo, Japan, XIX., pp. 283–290, 1928).

NAGEL, P. Neue ueber Hirschäfer.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 214, 1928; Stett. Ent. Zeit. 91., p. 90, 1930).
NETOLITZKY, F. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Bembidion; Carabidae*).
Ent. Mitteil. III, pp. 168–169, 1914).
NIIJIMA, Y. et KINOSHITA, E. Die unter suchungen über japanische Melolonthiden, II.
(Res. Bull. Col. Ex. Forest, Col. Agr. Hokkaido, Imp. Univ. Sapporo, Japan, II., No. 2, 1923).
——— Erster Nachtrag der Melolonthiden Japans und ihre verbreitung.
(ibidem, IV., 1927).
NITOBE, I. An investigation on the insects injurious to Citrus (Japanese)
(Bull. Dept. Agr. Govern. Res. Inst. Formosa, 1916).
OBENBERGER, J. Buprestidarum Supplementa, Paraearctica, IV.
(Casopis XXVI., 1-2, pp. 9-14, 1929).
OHAUS, F. Zwei neue Euchiriden Formosa.
(Ent. Rundsch. Stuttgart, XXX., p. 142, 1913).
——— Revision der Adoretini.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., pp. 471-514, f. 38, 1914).
——— Beitrag zur Kenntnis der Paraearkt Anomala-Arten (Col. *Lamell. Rutelin.*).
(Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 326. 1915).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Rutelinae*).
(Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, pp. 1–8, 1917).
——— Nachtrag zur Rutelinenfauna Formosas.
(Arch. Naturg. XCI., A. 5, pp. 122-131, 1926).
OHTA, Y. Beitrag zur Kenntnis der Helotiden-Fauna von Japan, Korea und Formosa.
(Ins. Mats. III., No. 2 & 3, pp. 108-110, 1929).
——— Einige neue Helotidae und Coccinelliden-Arten aus Formosa.
(Ins. Mats. IV., No. 1 & 2, pp. 66-71, 1929).
——— Scymninen Japans.
(Ins. Mats. IV., No. 1 & 2, pp. 1-16, 1929).
——— Beitrag zur kenntnis der Ptiniden Japans.
(Ins. Mats. IV., No. 3, pp. 105-109, 1930).
——— Ueber einigen Coelophoren-und Helotiden-Arten aus Formosa, mit Beschreibungen von 2 neuen Arten.
(Ins. Mats. V., No. 3. pp. 134-136, 1931).
OKUNI, T. An investigation on some noxious beetles in the granary in Formosa, 1 & 2, (Japanese).
(Bull. Dept. Agr. Govern. Res. Inst. Formosa, No. 9, 1924; No. 34, 1928).
OLIVIER, E. Lampyrides rapportes de Formosa par M. Hans Sauter.
(Ann. Mus. Civ. Genova, XLV., pp. 209-210, 1911).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Lampyridae*).
(Ent. Mitteil. II., 9, pp. 269-272, 1913).
d'ORCHYMONT, A. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Hydrophilidae*, I & II).
(Suppl. Ent. II., pp, 1-18, 1913; Ent. Mitteil, III., pp. 222-328, 1914).
PARRY, S. Further descriptions of Lucanid Coleoptera.
(Trans. Ent. Soc. Lond., p. 370, 1874).
PASCOE, F. P. Contribution towards aknowledge of the Curculionidae.
(Journ. Linn. Soc. Zool. X., pp. 434-493, 1870).
PIC, M. Mélanges Exotico-Entomologiques.
(I., p. 7, 11, 1911; II., p. 6, 1912; V., p. 11, 19; VI., p. 17; VII., p. 17, 18, 1913; XI., p. 17, 1914; XII. p. 6, 10, 11; XIII., p. 13, 1915; XVI., p. 2, 6, 21,

1915; XVIII., p. 19, 1916: XX., p. 1; XXI., p. 4, 1916: XXII., p. 5, 20; XXIII., p. 20; XXVI., p. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 1917: XXVII., p. 2, 5; XXVIII., p. 3, 4, 6, 1918: XXX., p. 14, 20, 30; XXXIV., p. 7, 1921: XXXVI., p. 7, 30; XXXVI., p. 4, 1922: XXXVIII., p. 13; XXXIX., p. 31: XL., p. 4, 20, 1923: XLII., p. 30, 1924: XLIV., p. 30, 32, 1925: XLV., p. 24, 32, 1926: LI., p. 32, 34, 35, 1928: LV., p. 8, 1930).

——— l'Echange Moulins.
(XXVI., 1910: XXVII., 1911: XXVIII., 1912: XXIX, 1913: XXXI., 1915: XXXV., 1919: XXXVII, 1921: XLI., 1925).

——— Malacodermes et Heteromeres nouveaux d'Afrique et d'Asie (*Drilidae*).
(Naturaliste XXXIII., p. 259, 1910).

——— Divers Coleopters exotiques nouveaux.
(Naturaliste, XXXII., p. 77, 1910).

——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Cantharidae, Lampyridae, Mordellidae, Melandryae, Oedemelidae*).
(Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., pp. 188–189, 1911).

——— Materiaux pour servir a l'etude des Longicornes.
(VII., p. 20, 1911: VIII, p. 21, 1912: IX, p. 19, 1914: X., p. 16, 17, 1916).

——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Anthicidae, Hylophilidae, Pedilidae*).
(Arch. Naturg. A. II, pp. 129–135, 1913).

——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Ptinidae* et *Anobidae*).
(Suppl. Ent. III, pp. 11–14, 1914).

——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Mordellidae, Lycidae, Cantharidae*).
(Ent. Mitteil. XV., p. 67, 1926).

——— Nouveaux Coleopteres du Globe.
(Bull. Soc. Zool. Fr. LI., pp. 235–238, 1926).

——— Mutations et descriptions de nouveaux Coleopteres.
(Bull. Mus. Paris, pp. 77–80, 1926).

——— Nouveaux Coleopteres Exotiques.
(Ent. Mitteil. XVI., Nr. 4, pp. 246–255, 1927).

PLANET, L. Essai Monographique sur les Coleopteres des genre Pseudolucane et Lucane
(Le Naturaliste 2s.13, p. 36, 1899).

PORTEVIN, G. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Silphidae*).
(Suppl. Ent. III, pp. 5–8, 1914).

POUILLANDE, I. Le genre Dicranocephalus Hope.
(Insecta Rennes, IV., p. 293, 1914).

PRELL, H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Dynastinae*).
(Suppl. Ent. II., pp. 22–23, 1913).

RAFFRAY, A. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Pselaphidae*, I & II.).
(Ent. Mitteil. I, pp. 103–109, 1912: Suppl. Ent. III., pp. 1–4, 1925).

REGIMBART, M. Revision des Dytiscidae de la région Indo Sino-Malaise.
(Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII., pp. 186–367, 1899).

REITTER, E. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Scydmaenidae*).
(Ent. Mitteil. II., pp. 265–268, 1913).

RITSEMA, C. A species of the Coleopterous genus Helota from Formosa.
(Not. Leyd. Mus. XXXIV., pp. 51–53, 1911).

ROELOFS, W. Curculionides recueillis au Japan par M. G. Lewis.
(Ann. Soc. Ent. Belg. XVI., pp. 154–192, 1873).

ROESCHKE, H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Carabini*).
(Suppl. Ent. I., pp. 4–6, 1912).

SCHENKLING, S. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Lymexylonidae*).
(Arch. Naturg, A. 5, p. 118, 1916).

SCHENKLING, S. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Cleridae*).
(Ent Mitteil. I, pp. 321-330, 1912).
SCHILDER, F. A. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Rhypiphoridae*).
(Ent. Mitteil. XVII, Nr. 314, p. 203, 1923).
SCHMIDT, A. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Aphodiinae*).
(Suppl. Ent. II., pp. 21-22, 1913).
von SCHÖNFLDT, H. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Brenthidae*).
(Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., pp. 189-190, 1911).
SCHWARZ, O. Neue Elateriden aus dem tropischen Asien, den Malayischen Inseln und den Inseln der Südsee.
(Deutsch. Ent. Zeitschr. Hefte II. pp. 305-350, (p. 319) 1902).
SCHWARZER, B. H. Sauter's Formosa Ausbeute (*Cerambicydae*).
(Ent. Blätt. XXI., Hefte. 1, pp. 20-30, 58-68; Hefte. 4, pp. 145-154, 1925).
SHIRAKI, T. On a family Paussidae of Coleoptera (Japanese).
(Zool. Mag. Tokyo, XIX, No. 224, pp. 168-176, 1907).
——— An investigation on the injurious insects of Formosa (Japanese).
(Extra Report, Dept. Agr, Gov. Res. Inst. Formosa, Vol I., 1910).
——— An investigation on general injurious insects (Japanese).
(Extra Report, Dept. Agr., Gov. Res. Inst. Formosa, Vol. VIII., 1913).
——— An investigation on the insects injurious to Cotton-plants (Japanese).
(Extra Report, Dept. Agr., Gov. Res. Inst. Formosa Vol. V., 1913).
——— Catalogue Insectorum Noxiorum Formosarum.
(Bull. Dept. Agr., Gov. Res. Inst. Formosa, 1911).
——— Insect pests of the tea-plant in Formosa.
(Proceeding of the Third Entomological Meeting held at Pusa, 1919).
SICARD, A. Descriptions d'espèces et varietes nouvelles de Coccinellides de la collection du Deutsches Entomologisches Museum de Berlin, Dahlem.
(Arch. Naturg. LXXVIII., A. 6, p. 134, 1912).
SONAN, J. An investigation on the injurious insects of tea plant I & II (Japanese).
(Bull. Dept. Agr., Gov. Res. Inst. Formosa, No. 12, 1924; No. 29, 1927).
SPAETH, F. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Cassidinae*).
(Ann. Mus. Nat. Hung. XI., pp. 45-48, 1913).
——— Cassidinae of Formosa, II.
(Suppl. Ent. III., pp. 14-19, 1914).
STROHMEYER, H. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Ipidae, Platypodidae*).
(Ent. Mitteil. I., pp. 38-42, 1912).
——— Neue Platypodiden (India und Formosa).
(Ent. Blätt. 9., pp. 161-165, 1913).
SZOMBÀTHY, C. Elaterides nouveaux au peu connus appartenant au musée national Hongrois.
(Ann. Hist. Nat. Mus. Nat. Hung. VIII pp. 358-359, 1910).
TAKIZAWA, M. The haliplidae of Japan.
(Ins. Mats. V., No. 3, pp. 137-143, 1931).
TAMANUKI, K. A taxonomic study on the Cupedidae of the Japanese Empire, (Japanese).
(Zool. Month. Mag. Tokyo, XL., No. 476, p. 251, 1923).
UCHIDA, T. et TAMANUKI, K. Zwei neue Arten von Acoptolabrus (*Carabidae*).
(Ins. Mats. II., No. 2, pp. 102-104, 1927).
UHMANN, E. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Hispinae*). 5. Beitrag zur kenntnis der Hispinen.
(Suppl. Ent., Nr. 16, pp. 108-116, 1927).

UYTTENBOOGAART, D. L. Description d'une nouvelle espèce de Dineutes (*Gyrinidae*) de elle de Formose.
(Leyd. Zool. Med. I., p. 140, 1914).
VOSS, E. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Curculionidae; Rhynchitinae*).
(Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, pp. 277-286, 1921).
——— Monographische Bearbeitung der Unterfamilie Rhynchitinae (*Nemonychini* et *Auletini*).
(Arch. Naturg. A. 8, pp. 1-113, 1922).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Curculionidae: Attelabinae*).
(Deutsch. Ent. Zeitschr. III., p. 278, 1924).
——— Die unterfamilien Attelabinae und Apoderinae.
(Stett. Ent. Zeit. LXXXV., I und II., p. 1, p. 191, 1924: LXXXVII., I, p. 1; II, p. 141. 1926: LXXXVIII., I, p. 1, 1927: LXL., I, pp. 90-159; II, pp. 161-242, 1929).
——— Die gattungen Euops, Schh.
(Deutsch. Ent. Zeitschr., Hefte I., p. 33, 1924).
——— Einige bisher unbeschriebene Attelabinen aus dem tropischen Asien und Indo-malayischen Archipel.
(Ent. Blätt. II., pp. 34-46, 1924).
——— Kritische Bemerkungen zum Genus Eugnathus, Sch. und verwandte, eine Bestimmungstabelle und Beschreibung neuer Arten.
(Deutsch. Ent. Zeitschr. VI. & VII., p. 210, 1925).
——— Monographie der Rhynchitinen-Tribus Byctiscini.
(Koleopt. Rund. XVI., pp. 191-243, 1930-31).
WAGNER, H. Fünf neue Apionininen der alten welt.
(Soc. Ent. Steglitz, XXIV., pp. 25-28, 1909).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Apioninae*).
(Suppl. Ent. No. 3., pp. 19-29, 1914).
WASMANN, E. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Paussidae*). (Beitrag zru Kenntnis der Myrmekophilen).
(Suppl. Ent. I., pp. 1-4, 1912).
WEISE, J. Chrysomeliden der Indo-Malayischen Region.
(Tijdschr. Ent. Grauenhage 65, pp. 39-130, 1922).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Coccinellidae*).
(Arch. Naturg. LXXXIX, A. (2), pp. 182-188, 1923).
WELLEMAN, C. New species of Lyttidae with notes of Described species.
(Ent. News, XXIII., p. 31, 1912).
WESTWOOD, J. O. Descriptions of some new exotic species of Lucanidae.
(Trans. Ent. Soc. Lond., p. 353, 1871).
WOLFRUM, P. Einige species novae der Anthribiden-Gattung Zygaenodes Pascoe (Col.).
(Ent. Mitteil. XI., No. 3, pp. 56-63, 1922).
ZIMMERMANN, A. H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Gyrinidae*).
(Arch. Naturg. LXXXII., A. 5, p. 122, 1916).
——— H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Haliplidae, Dytiscidae*).
(Ent. Mitteil. 8., pp. 75-77, 1919).
——— Bemerkenswerte Neuerwerbungen des Zoologischen Museum in Hamburg (*Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae*).
(Ent. Blätt. XVI., pp. 224-234, 1920).
——— Die Haliplıden der Welt.
(Ent. Blätt. XX., pp. 1-16, 65-80, 129-144, 193-213, 1924).

II. 臺灣產鞘翅目分科一覽表

	和名	種ノ數	頁
Suborder I. ADEPHAGA	食蟲亞目	165	1
Family 1. Carabidae	步行蟲科	122	1
2. Dytiscidae	龍蝨科	22	16
3. Haliplidae	小頭水蟲科	5	19
4. Gyrinidae	豉豆科	6	20
5. Paussidae	角太步行科	7	20
6. Rhysodidae	背筋蟲科	2	21
7. Cupedidae	長扁蟲科	1	21
Suborder II. POLYCERATA	異角亞目	1814	22
Division I. STAPHYLINOIDEA	隱翅族	301	22
8. Staphylinidae	隱翅蟲科	158	22
9. Pselaphidae	蟻塚蟲科	20	40
10. Scydmaenidae	蘇苔蟲科	7	44
11. Silphidae	埋葬蟲科	14	45
12. Ptiliidae	尤葢蟲科	3	47
13. Orthoperidae	瑣微蟲科	2	48
14. Scaphidiidae	尾葢蟲科	11	48
15. Histeridae	閹鬼蟲科	75	49
16. Niponidae	細閹鬼蟲科	2	58
Division II. CLAVICORNIA	球角族	300	59
17. Ostomidae	穀盜科	4	59
18. Helotidae	大木蝨科	11	59
19. Nitidulidae	尾木蝨科	35	60
20. Cucujidae	扁蟲科	34	65
21. Erotylidae	大葢蟲科	26	69
22. Languriidae	長叩頭科	22	73
23. Cryptophagidae	木蝨蟲科	2	76
24. Diphyllidae	尤木蝨科	9	76
25. Lathridiidae	姬薪蟲科	3	77
26. Mycetophagidae	小葢蟲科	5	78
27. Colydiidae	細堅蟲科	14	78
28. Endomychidae	僞瓢蟲科	20	80
29. Coccinellidae	瓢蟲科	71	83
30. Dermestidae	皮飾蟲科	11	92
31. Byrrhidae	圓剌蟲科	4	94
32. Dryopidae	泥蟲科	2	94
33. Hydrophilidae	牙蟲科	24	95
34. Heteroceridae	長泥蟲科	3	98
Division III. SERRICORNIA	鋸角族	407	98
35. Cantharidae	菊虎科	9	98
36. Lampylidae	螢科	31	99
37. Lycidae	薄翅螢科	32	102
38. Prionoceridae	細翅螢科	5	107
39, Dasytidae	髮螢科	14	107
40. Drilidae	尤螢科	3	109

	和名	種ノ數	頁
41. Dascillidae	長花蚤科	6	110
42. Helodidae	圓花蚤科	5	111
43. Cleridae	郭公蟲科	41	111
44. Lymexylonidae	筒蠹科	1	116
45. Ptinidae	標本蟲科	5	117
46. Anobiidae	番死蟲科	7	117
47. Bostrichidae	長蠹科	10	118
48. Lyctidae	竹蠹科	1	120
49. Cioidae	圓菌蟲科	1	120
50. Buprestidae	吉丁蟲科	63	120
51. Elateridae	叩頭蟲科	153	127
52. Melasidae	僞叩頭科	11	146
53. Rhipiceridae	櫛角蟲科	8	148
54. Cebrionidae	僞櫛角科	1	149
Division IV. HETEROMERA	異節族	256	149
55. Tenebrionidae	僞步行科	136	149
56. Rhysopaussidae	僞背筋科	3	167
57. Lagriidae	僞金花蟲科	13	167
58. Othniidae	僞朽木科	4	169
59. Alleculidae	朽木蟲科	20	169
60. Monommidae	僞吉丁蟲科	2	172
61. Oedemeridae	僞天牛科	7	172
62. Serropalpidae	長朽木蟲科	4	173
63. Mordellidae	花蚤科	13	174
64. Rhipiphoridae	大花蚤科	7	175
65. Meloidae	地膽科	15	176
66. Pyrochroidae	赤翅蟲科	6	178
67. Pedilidae	細頸蟲科	2	179
68. Hylophilidae	僞細頸科	3	179
69. Anthicidae	一角科	20	180
70. Trictenotomidae	鋸銀形科	1	182
Division V. PHYTOPHAGA	食葉族	319	182
71. Bruchidae	豆象科	17	182
72. Chrysomelidae	金花蟲科	89	184
73. Cerambycidae	天牛科	213	195
Division VI. RHYNCHOPHORA	具吻族	247	237
74. Brenthidae	三錐象科	39	237
75. Anthribidae	長角象科	44	242
76. Curculionidae	象鼻蟲科	137	248
77. Platypodidae	長小蠹科	16	266
78. Scolytidae	小蠹科	12	268
Suborder III. LAMELLICORNIA	鰓角亞目	340	270
79. Passalidae	長鍬形科	4	270
80. Lucanidae	鍬形蟲科	38	270
81. Scarabaeidae	金龜蟲科	297	275
	TOTAL	2336	

III. 臺灣產鞘翅目分類目錄

A CATALOGUE OF FORMOSAN COLEOPTERA

Suborder I. ADEPHAGA 食蟲亞目

CARABIDAE 步行蟲科

Subfamily **CICINDELINAE**

Tribe: **COLLYRINI**

Genus **TRICONDYLA,** LATREILLE

aptera, OLIVIER コウトウハネナシハンメウ
Ent. II., Nr. 33, p. 7, t. 1, f. 1, (*Cicindela*) (1790).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Kei, Aru, Timor, Mollucca, Australia, Philippines, Formosa.

Genus **COLLYRIS,** FABRICIUS

Subgenus **NEOCOLLYRIS,** HORN

sauteri, HORN ザウタホソメダカハンメウ
Ent. Mitteil, I., Nr. 5. p. 131, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, BATES ホソメダカハンメウ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 341, (1866).
Loc. Distr.—Taihôrin, Urai, Rimogan, Kayabara, Shinchiku, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

albocyanescens, HORN シロスヂホソメダカハンメウ
in Wytsman, Gen. Ins. Cic., p. 429, (1908-1910).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CICINDELINI**

Subtribe: **PROTHYMINA**

Genus **PROTHYMA,** HOPE

proxima, CHAUDOIR アイイロハンメウ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIII., p. 325, (1860).

Loc. Distr.—Kōtōsho (after Kano).
Gen. Distr.—Formosa, India.

Subtribe: **THERATINA**

Genus **THERATES,** LATREILLE

labiatus, FABRICIUS コウトウメダカハンメウ
Syst. El. I., p. 232, (1801).
Loc. Distr.—Kōtōsho (after Kano).
Gen. Distr.—Java, Celebes, Kei, Aru, Tarant, Philippines, Formosa.

fruhstorferi sauteri, HORN メダカハンメウ
Ent. Mitteil. I., p. 133, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrin, Nishimura, Kobayashi, Nōkō, Hoppo.
Gen. Distr.—Formosa.

obliquefasciatus, HORN ハスオビメダカハンメウ
Ent. Mitteil. I., p. 133, (1912).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

clavicornis alboobliquatus, HORN シロスヂメダカハンメウ
Not. Leyd. Mus. XXXI., p. 186, (1909).
Loc. Distr.—Kōsempo, Taihōrin, Urai, Horisha, Musha, Taitō.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **ODONTOCHILINA**

Genus **ODONTOCHILA,** CASTERNAU

Subgenus **HEPTODONTA,** HOPE

posticalis, WHITE アトモンメダカハンメウ
in Wytsman, Gen. Ins. Cic., p. 204, 420, (1908–1915).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—South China, Formosa.

Subtribe: **CICINDELINA**

Genus **CICINDELA,** LINNÉ

conspicua, SCHAUM コウトウヤツボシハンメウ
Berl. Ent. Zeitschr. VI., p. 178, (1862).
Loc. Distr.—Kōtōsho (after Kano).
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

sauteri, HORN ザウタハンメウ
Ent. Mitteil. I., p. 134, (1912).
Loc. Distr.—Kosempo, Shinten, Urai, Kwarenko, Nōkō, Rimogan, Hinokiyama, Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa.

cylindriformis, HORN タイワンホソハンメウ
Ent. Mitteil. I., 5, p. 135, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihanroku.
Gen. Distr.—Formosa.

psilica, BATES ヒメヤワボシハンメウ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 341, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku, Kagi, Taihôrin, Baibara, Naihunpo, Ranrun, Kanshirei, Yentempo, Gyamma, Kôsempo, Hoozan, Taihanroku, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Loo-Choo (Miyako, Ishigaki).

elisae reducte-lineata, HORN ウスジマヒメハンメウ (エリザハンメウ)
Ent. Mitteil. I., 5, p. 137, (1912).
Loc. Distr.—Koroton, Tainan, Taihoku, Baibara, Akau, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

specularis, CHAUDOIR コハンメウ
Cat. Col. Cic., p. 24, (1895).
Loc. Distr.—Taihoku, Taihôrin, Kôshun.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, Indo-China.

sumatrensis, HERBST ハラビロハンメウ (スマトラハンメウ)
Natursyst. Ins. Käf. X., p. 179, t. 182, f. 1. (1806).
Loc. Distr.—Tainan, Akau, Koroton, Kyukyokudo, Suo, Taihoku, Hôkotô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China, India, Philippines, Sumatra, Borneo.

angulata devastata, HORN カドハンメウ
Syst. Ind. Cic., p. 36, (1905).
Loc. Distr.—Akau, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, India.

decemguttata, FABRICIUS コウトウカハラハンメウ
Syst. El. I., p. 241, (1801).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Celebes, Mollucca, Talant, Kei, Formosa.

dives, GORY ヨコミスヂハンメウ
Mag. Zool., t. 97, (1833).
Loc. Distr.—Kôtôsho. (after Kano).
Gen. Distr.—Formosa, India.

striolata, ILLIGER タテミスヂハンメウ (タテスヂハンメウ)
in Wiedemann, Arch. Zool. & Zootom. I., 2, p. 114, (1800).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kanshirei. Taihanroku, Taihôrin, Yentempo, Gyamma, Kagi, Tainan, Kôshun, Taihoku, Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Indo-china. Sumatra, Java, Celebes, Philippines, China, Formosa, Loo-Choo.

aurulenta batesi, FLEUTIAUX ヤワボシハンメウ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXII., p. 491, (1893).
Loc. Distr.—Kôsempo, Tainan, Taihôrinshô, Fuhôshô, Taihoku, Urai, Rimogan, Kayahara, Akau, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa, China.

sexpunctata, FABRICIUS ムツボシハンメウ
Syst. Ent., p. 226, (1775).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kagi, Takao, Yentempo, Tainan, Horisha.
Gen. Distr.—India, Indo-China, China, Philippines, Formosa.

cancellata subtilesculpta, HORN コシマハンメウ
Ent. Mitteil. I., 5, p. 138, (1912).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

fuliginosa, DEJEAN コウトウコニハハンメウ
Spec. Col. I., 415, (1825).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Borneo, Java, Sumatra, Indo-China, China, India, Formosa.

anchoralis punctatissima, SCHAUM イカリモンハンメウ
Journ. Ent. II., p. 58, (1863).
Loc. Distr.—Anping, Hôkotô.
Gen. Distr.—South China, Formosa, Loo-Choo, Japan proper (Tanegashima, Kagoshima).

psammodroma reductescripta, HORN ホソモンハンメウ
Ent. Mitteil. I., 5, p. 139, (1912).
Loc. Distr.—Anping. Hôkotô.
Gen. Distr.—Formosa, China.

nivicincta, CHEVROLAT シロヘリハンメウ
Rev. Zool. VIII., p. 98, (1845).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Indo-China, China, Formosa, Loo-Choo.

nivicincta inspecularis, HORN
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 87, (1904).
Loc. Distr.—Taihoku, Anping, Gyamma, Hôkotô.
Gen. Distr.—China, Formosa, Loo-Choo (Yayeyama), Korea (Moppo).

kaleea, BATES タイワンヒメハンメウ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 340, (1866).
Loc. Distr.—Horisha. Musha, Kwarenkô, Taitô, Ratô, Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa, China, Indo-China.

shirakii, HORN シラキハンメウ
Wien. Ent. Zeit. XLIV., p. 41, (1927).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Nôkô, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **CARABINAE**

Genus **CALOSOMA,** WEBER

maximoviczi sauteri, BORN タイワンカタビロオサ
Soc. Ent. XXIV., p. 99, (1909).
Loc. Distr.—Sôzan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CARABUS**, Linné

Subgenus **DAMASTER**, Koller

formosanus, Uchida et Tamanuki タイワンカブリ
Ins. Mats. II., No. 2, p. 104, (*Coptolabrus*) (1927).
Loc. Distr.—Funkiko.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **COPTOLABRUS**, Solsky

elysii, Thomson カブリモドキ
Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV., p. 337, t. 9, f. 2, (1856).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Korea, China, Formsa.

Subgenus **APOTOMOPTERUS**, Hope

sauteri, Roeschke ザウタオサ
Suppl. Ent. I., p. 4, (1912).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **LEPTOCARABUS**, Géhin

vanvolxemi, Putzeys オホアカガネオサ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. 2. (1875).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

Genus **NEBRIA**, Latreille

macrogona, Bates オホマルクビゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 235, (1873).
Loc. Distr.—Numanohira in Arisan (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

purcherrima, Bates フタモンマルクビゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 236, (1873).
Loc. Distr.—Taipin (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

niitakana, Kano ニイタカマルクビゴミ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 25, (1930).
Loc. Distr.—Hattsukan (Niitaka).
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **OMOPHRON**, Latreille

limbatus var. **aequalis**, Morawitz カハラゴミ
Mém. Acad. Sc. St. Pétersb. (7), VI., Nr. 3, p. 6, (1863).
Loc. Distr.—Kanshirei, Heitō.
Gen. Distr.—East Asia, Japan proper, Korea, Formosa.

brettinghamae, Pascoe コウトウカハラゴミ
Journ. Ent. I., p. 38, (1860).
Loc. Distr.—Kōtōsho (after Kano).
Gen Distr.—India, Formosa.

Genus **PSEUDOZAENA**, Casternau

orientalis, Klug コウトウエグリゴミ
Jahrb. Ins. I., p. 81, t. 1, f. 8, (*Ozaena*) (1834).
Loc. Distr.—Kōtōsho (after K o).
Gen. Distr.—Java, Borneo, Malacca, Formosa.

Genus **EUSTRA**, Schmidt-Goebel

japonica, Bates エグリゴミ
Ann. Mus. Civ. Genova, (2), XII., p. 270, (1892).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

plagiata, Schmidt-Goebel フタスヂエグリゴミ
Fauna Col. Birm., p. 66, t. 3, f. 1, (1856).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Burma, Formosa, Japan proper (Nagasaki).

Genus **SCARITES**, Fabricius

sulcatus, Olivier オホヘウタンゴミ
Ent. III., Nr. 36, p. 7, f. 1, f. 11, (1795).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper (Oshima, Wakayama), Korea (Quelpart island), Formosa, China, Manchuria, India, Java.

terricola, Bonneli ナガヘウタンゴミ
Mém. Acad. Turin, p. 471, (1813).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—North Africa, South Europe, Balkan, South Russia, Caucasus, Asia minor, Transbaikal, Turkestan, Mongolia, North China, Manchuria, Ussuri, Korea, Japan proper, Formosa.

Genus **CLIVINA**, Latreille

castanea, Westwood オホヒメヘウタンゴミ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 128, (1837).
Loc. Distr.—Kuraru Rengechi, Baibara.

Gen. Distr.—India, Ceylon, Philippines, China, Burma, Japan proper, Loo-Choo, Formosa.

Subfamily **HARPALINAE**

Genus **CRASPEDONOTUS,** Schaum

tibialis, Schaum キスネムナビロゴミ
Berl. Ent. Zeitschr. VII., p. 87, (1863).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Manchuria, China, Formosa.

Genus **BROSCOSOMA,** Putzeys

dönitzi, Harold ミヤマヘウタンゴミ
Mitth. Münch. Ent. Ver. V., p. 5, (*Miscodera*) (1881).
Loc. Distr.—Numanohira in Arisan (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **MECODEMA,** Blanchard

? sculpturatum, Blanchard サビバネオホバゴミ
Voy. Pole Sud. p. 35, t. 2, f. 14, (1853).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—New Zealand, Formosa.

Genus **BEMBIDION,** Latreille

Subgenus **CHRYSOBRACTEON,** Netolitzky

fusiforme, Netolitzky バイワンミヅギハゴミ
Ent. Mitteil III., Nr. 6, p. 168, (Subg. *Bracteon*) (1914).
Loc. Distr.—Botanwan in Paiwan District.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **ARMATOCILLENUS,** Dupuis

formosanus, Dupuis タイワンミヅギハゴミ
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 334, (*Cellenus*) (1912).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TACHYS,** Stephens

triangularis, Nietner ミツカドミヅギハゴミ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 422, (1858).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Extending from Japan to Australia and westwards as far as Egypt.

plagiatus var. **sexmaculatus,** ANDREWS ムツテンミヅギハゴミ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova LI., p. 371, (1925).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

quadrillum, SCHAUM ヨツテンミヅギハゴミ
Berl. Ent. Zeitschr., p. 201, (1860).
Loc. Distr.—Anping, Alikang.
Gen. Distr.—Celebes, Newguinea, Ceylon, Annam, Batjan, China, Formosa.

quadrillum var. **languidus,** ANDREWS
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, LI., p. 369, 374, 1923-25, (1925).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

brachys var. **decolor,** ANDREWS シミコミヅギハゴミ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, LI., p. 378, (1925).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

comptus, ANDREWS タイワンコミヅギハゴミ
Ann. Mag. Nat. Hist. (9), X., p. 161, (1922).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—India, Formosa.

comptus var. **borealis,** ANDREWS
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, LI., p. 462, (1925).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

bifoveatus, MAC LEAY オビミヅギハゴミ
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, p. 117, (1871).
Loc. Distr.—Taihoku (after Kano).
Gen. Distr.—Eastern Siberia, Japan proper, Formosa, Australia.

nanophyes, ANDREWS タカオミヅギハゴミ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, LI., p. 481, (1925).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

ovatus, MOTSCHULSKY マルミヅギハゴミ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXIV., IV, p. 509, (1851).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Ceylon, Assam, Philippines, Formosa.

eucides, BATES コウトウミヅギハゴミ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII., p. 153, (*Barytrachys*) (1886).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **LIMNASTIS.** MOTSCHULSKY

pilosus, BATES ケブカゴモク
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova. XXXII., p. 296, (1892).

Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Bengal, Burma, Malay, Tonkin, Philippines, Java, Borneo, Celebes, New Guinea, Australia, Formosa.

Genus **LESTICUS**, DEJEAN

sauteri, KUNTZE ザウタヒメゴミ
Ent. Rundsch. XXVIII., p. 175, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TRIGONOTOMA**, DEJEAN

dohrnii, CHAUDOIR アヲムネクロゴミ
Bull. Soc. Nat. Mosc. I., p. 69, (1852).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

Genus **ZUPHIUM**, LATREILLE

siamense, CHAUDOIR アンピンヒメゴミ
Rev. Zool., p. 104, (1872).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MASTAX**, FISCHER

formosanus, DUPUIS タイワンゴモク
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 282, (1912).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HEXAGONIA**, KIRBY

sauteri, DUPUIS ザウタホソヒラタゴモク
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 308, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

elongata, DUPUIS ホソヒラタゴモク
Ann. Soc. Ent. Belg. LVII., p. 263, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

bowringi, SCHAUM ボウリングホソヒラタゴモク
Berl. Ent. Zeitschr., p. 73, pl. 73, f. 3, (1863).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Penang, Formosa.

Genus **PENTAGONICA**, SCHMIDT-GOEBEL

biangulata, DUPUIS カンカウウスバアトキリゴミ
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 312, (1912).

Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

semisuturalis, DUPUIS スヂウスバアトキリゴミ
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 314, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Aen. Distr.—Formosa.

formosana, DUPUIS タイワンウスバアトキリゴミ
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 316, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DESERA,** HOPE

Subgenus **DENDROCELLUS,** SCHMIDT-GOEBEL

gilsoni, DUPUIS ギルソンヒメゴモク
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 319, (1912).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

geniculata, KLUG コウトウヒメゴモク
Jahrb. I., p. 152, (1834).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—India, Philippines, Formosa.

Genus **PHEROPSOPHUS,** SOLIER

fuscicollis var. **formosanus,** DUPUIS タイワンクサゴモク
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 322, (1912).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

javanus, DEJEAN ジヤバノコゴモク
Spec. Gen. I., p. 305, (1825).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Philippines, Loo-Choo, Formosa, Java.

kunzeni, DUPUIS タカサゴミイデラ
Ann. Soc. Ent. Belg. LVIII., p. 29, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DIORYCHE,** MAC LEAY

formosana, DUPUIS カラカネゴモク
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 325, (1912).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **COPTODERA**, DEJEAN

formosana, DUPUIS ヨツボシヒラタアトキリゴミ
Ann. Soc. Ent. Belg. LVI., p. 328, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **BRACHICHILA**, CHAUDOIR

hypocrita, CHAUDOIR ヨツモンヒメアトキリゴミ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. 123, (1868).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa, Hongkong.

Genus **ANCHISTA**, NIETNER

binotata, DEJEAN フタモンヒメゴミ
Spec. Gen. I., p. 252, (1825).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Hindustan, Philippines, Formosa.

Genus **BRACHYNUS**, WEBER

scotomedes, REDTENBACHER ビロドムナボソゴミ
Reise Novara II., p. 5, (1867).
Loc. Distr.—Shanpin.
Gen. Distr.—Japan proper, Hongkong, Formosa.

sexmaculatus, DEJEAN ムツボシムナボソゴミ
Spec. Gen. I., p. 312, (1825).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **CATASCOPUS**, KIRBY

aequatus, DEJEAN オホバキンゴミ
Spec. Gen. V., p. 452, (1831).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **CHLAENIUS**, BONELLI

swinhoei, BATES スキンホルリムネゴミ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 342, (1866).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

femoratus, DEJEAN オホキアシルリムネゴミ
Spec. Gen. I., p. 328, (1826).

Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Java, Formosa.

monogramus, LAFÉRTE ムネキベリキボシゴミ
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 240, (1851).
Loc. Distr.—Kôtôsho, Taiboku (after Kano).
Gen. Distr.—India, Formosa.

abstersus, BATES アトマルルリムネゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 247, (1873).
Loc. Dist.—Taihoku (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

circumdactus, MORAWITZ クマドリルリムネゴミ
Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 246, (1863).
Loc. Distr.—Ratô (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Siberia, Formosa.

culminatus, BATES オホキベリルリムネゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 251, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

deliciolus, BATES キムネキボシゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 248, (1873).
Loc. Distr.—Ratô (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

pictus, CHAUDOIR オホアトボシゴミ
Bull. Soc. Nat. Mosc., p. 22, (1856).
Loc. Distr.—Taipin (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

praefectus, BATES オホルリムネゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 253, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **DOLICHOCTIS,** SCHMIDT-GOEBEL

striata, SCHIDT-GOEBEL ヨツモンマルケシゴミ
Fauna Col. Birm., p. 62, (1846).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **HELLUODES,** WESTWOOD

taprobanae, WESTWOOD セイロンゴモク
Trans. Ent. Soc. Lond. IV., p. 279, pl. f. B, (1847).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **HOLOLIUS**, LAFERTÉ

nitidulus, DEJEAN ミヅモグリゴミ
Spec. Gen. II., p. 341, (1826).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano), Kôshun, Hôkotô.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Philippines, Formosa.

Genus **HOMALOSOMA**, BOISDUVAL

? capito, WHITE クビブトクロゴモク
Voy. Ereb. Terr. Ins., p. 4, (1846).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—New Zealand, Formosa?

Genus **MORIO**, LATREILLE

japonicus, BATES ヤマトクロゴモ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 242, (1883).
Loc. Distr.—Taipin (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

orientalis, DEJEAN コウトウクロゴモク
Spec. Gen. I., p. 432, (1825).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Java, Philippines, Formosa.

Genus **PHYSODERA**, ESCHSCHOLTZ

dejeani, ESCHSCHOLTZ デヂヤンゴモク
Zool. Atl. II., p. 8, pl. 8, f. 6, (1829).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

fumatus, SCHAUM ウスグロゴモク
Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I., p. 440, (1853).
Loc. Distr.—Shinten (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, China, Philippines, Formosa.

Genus **DISCHISSUS**, BATES

quadrinotatus, MOTSCHULSKY ヨツモンゴモク
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVII., II, p. 333, (*Pernomerus*) (1864).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, India.

Genus **BADISTER**, CLAIRVILLE

pictus, BATES ヨツモンキイロゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 257, (1873).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **IRIDESSUS,** BATES

relucens, BATES ツヤイクビゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 264, (*Harpalus*) (1873).
Loc. Distr.—Ratô.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus **BRADYCELLUS** ERICHSON

laeticolor, BATES クビアカチビゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 267, (1873).
Loc. Distr.—Shikikun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CREPIDACTYLA,** MOTSCHULSKY

nitida, MOTSCHULSKY クロツヤムネミゾゴミ
Etud. Ent. X., p. 5, (1861).
Loc. Distr.—Baron.
Gen. Distr.—Papan proper, Formosa.

Genus **COLPODES,** MAC LEAY

coelestinus, MOTSCHULSKY ルリツヤゴミ
Bull. Soc. Nat. Mosc. IV., p. 310, (1864).
Loc. Distr.—Shinsuiei (after Kano).
Gen. Distr.—Formosa, Burma.

Genus **STOMONAXUS,** MOTSCHULSKY

striaticollis, DEJEAN ムネミゾマルゴミ
Spec. Gen. V., p. 747, (1831).
Loc. Distr.—Urai (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus **CYRTONOTUS,** STEPHENS

giganteus, MOTSCHULSKY オホムナビロゴミ
Ins. Sit., p. 173, pl. 8, f. 1, (1839).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **GALERITA,** FABRICIUS

formosana, KANO タイワンナガクビアカゴミ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, IX., No. 106, p. 29, (1930).
Loc. Distr.—Urai.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MACROCHILUS,** HOPE

tripustulatus, FABRICIUS ミツコブヒメゴミ
Ent. Syst. I., p. 145, (*Carabus*) (1792).
Loc. Distr.—Naifunpo.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

Genus **CYMINDIS,** LATREILLE

pictula, BATES ヨツモンホソケシゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 310. (1873).
Loc. Distr.—Doba.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CROSSOGLOSSA,** CHAUDOIR

luticincta, BATES チヤバネアトキリゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 315, (1873).
Loc. Distr.—Kuraru, Sōzan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **DRYPTA,** FABRICIUS

lineola, DEJEAN アヲスヂカタビロゴミ
Spec. ins., p. 184, (1825).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **OPHIONEA,** ESCHSCHOLTZ

cyaneocephala, FABRICIUS クビナガゴミ
Suppl. Ent. Syst. p. 60, (*Cicindela*) (1798).
Loc. Distr.—Taihoku, Musha.
Gen. Distr.—India, Formosa.

cyclops, MATSUMURA ナガヒトツメゴミ
Schädl. u. Nützl. Ins. Zuckerrohl Formosas, p. 48, pl. XXX, f. 6. (1910).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LEBIDIA,** MORAWITZ

octoguttata, MORAWITZ ヤホシアトキリゴミ
Bull. Acad. St. Petersb. IV., p. 239, (1862).
Loc. Distr.—Horisha (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

bioculata, MORAWITZ フタツメアトキリゴミ
Mem. Soc. Acad. Petersb., p. 29, 1, f. 12, (1863).
Loc. Distr.—Musha (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper. Formosa.

formosana, KANO タイワンフタツメアトキリゴミ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 524, (1929).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LEBIA,** LATREILLE

idae, BATES カタモンアトキリゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 318, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku (after Kano).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

comitata, BATES ヒメアトキリゴミ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 319, (1873).
Loc. Dist.—Taiheizan (after Kano).
Gen. Distr.—Japan preper, Formosa.

DYTISCIDAE 龍蟲科

Subfamily **NOTERINAE**

Tribe: **HYDROCANTHINI**

Genus **CANTHYDRUS,** SHARP

flavus, MOTSCHULSKY キイロコツブゲンゴロウ
Etud. Ent. IV., p. 83, (*Hydrocanthus*) (1855).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—China, India, Java, Sumatra, Formosa.

nitidulus, SHARP ツヤコツブゲンゴロウ
Sc. Trans. Roy. Dubl. Soc. II., p. 278, (1880).
Loc. Distr.—Horisha, Nichigetsutan, Kôshun.
Gen. Distr.—Tonkin, Annam, China, Formosa.

Subfamily **LACCOPHILINAE**

Genus **LACCOPHILUS,** LEACH

chinensis, BOHEMAN ウスチャツブゲンゴロウ
Eugen. Resa., p. 21, (1858).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo, Kôtôsho, Nichigetsutan.
Gen. Distr.—China, Formosa.

sharpi var. **similis** REGIMBART シャープツブゲンゴロウ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX., p. 150, (1889).
Loc. Distr.—Pilam, Lhihunkoki, Hori, Jitsugetsutan, Kôtôsho, Hôkotô.
Gen. Distr.—Cochin-China, China, Formosa.

Subfamily **HYDROPORINAE**

Tribe: **HYDROVATINI**

Genus **HYDROVATUS,** MOTSCHULSKY

acuminatus, MOTSCHULSKY セマルケシゲンゴロウ
Etud. Ent. VIII., p. 42, (1859).

Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Burma, Malacca, Sumatra, Formosa.

Tribe: **HYPHYDRINI**

Genus **HYPHYDRUS**, ILLIGER

japonicus, SHARP ケシゲンゴロウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 54, (1873).
Loc. Distr.—Pilam, Shôkei.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

lyratus, SWARZ ヒメケシゲンゴロウ
in Schoenh. Syn. Ins. II., p. 29, t. 4, f. 1, (1808).
Loc. Distr.—Kwarenkô, Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa, Java, Annam, Sumatra, India, Newguinea, Australia.

orientalis, CLARK ホリケシゲンゴロウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 419, (1863).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **BIDESSUS**, ZIMMERMANN

antennatus, REGIMBART アンピンケシゲンゴロウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI., p. 118, (1892).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Tonkin, Formosa.

megacephalus, GSCHWENDTNER コウトウケシゲンゴロウ
Ent. Anzeig., No. 1, p. 21, (1931).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HYPHOPORUS**, SHARP

rotundatus, GSCHWENDTNER コタマゲンゴロウ
Ent. Anzeig., No. 1, p. 21, (1831).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Dist.—Formosa.

Subfamily **COLYMBETINAE**

Tribe: **COPELATINI**

Genus **COPELATUS**, ERICHSON

subfasciatus, ZIMMERMANN タイワンセスヂゲンゴロウ
Ent. Mitteil. VIII., p. 76, (1919).
Loc. Distr.—Akau, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **AGABINI**

Genus **PLATYNECTES,** REGIMBART

decempunctatus var. **semperi,** RÉGIMBART アトホシマメゲンゴロウ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII., p. 285, (1899).
Loc. Distr.—Arisan, Kwarenkō.
Gen. Distr.—Philippines, Celebes, New Guinea, Formosa.

Genus **AGABUS,** LEACH

Subgenus **GAURODYTES,** THOMSON

japonicus, SHARP マメゲンゴロウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 50, (1873).
Loc. Distr.—Takao, Kammon.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, North India.

Subfamily **DYTISCINAE**

Tribe: **ERETINI**

Genus **ERETES,** GASTERNAU

sticticus, LINNÉ ハイイロゲンゴロウ
Syst. Nat. ed. XII., I, II, p. 666, (*Dytiscus*) (1767).
Loc. Distr.—Anping, Chip-Chip, Taihanroku.
Gen. Distr.—Africa, Asia, Australia, America, South Europe.

Genus **HYDATICUS,** LEACH

fabricii, MAC LEAY ウスチャゲンゴロウ
Ann. Jav., p. 134, (1833).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Madagascar, India, Sunda Islands, Philippines, South China, Formosa.

vittatus, FABRICIUS スヂゲンゴロウ
Syst. Ent. App., p. 825, (*Dytiscus*) (1775).
Loc. Distr.—Anping, Kōsempo, Hōkotō.
Gen. Distr.—South Asia, Australia.

Tribe: **THERMONECTINI**

Genus **RHANTATICUS,** SHARP

congestus, KLUG ナツゲンゴロウ
Ins. Madag., p. 136, (*Hydaticus*) (1832).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Madagascar, India, South China, Sunda Islands, Philippines, Formosa.

Tribe: **CYBISTERINI**

Genus **CYBISTER,** CURTIS

limbatus, FABRICIUS フチトリゲンゴロウ
Syst. Ent., p. 230, (*Dytiscus*) (1775).

Loc. Distr.—Tainan, Anping.
Gen. Distr.—India, Cochin-China, China, Japan proper, Formosa, Philippines.

sugillatus, ERICHSON シビイロゲンゴロウ
Nova Acta Halle, XVI., p. 227, (1838).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Tibet, India, Siam, Cochin-China, Sunda Islands, Ceylon, Philippines, Formosa.

tripunctatus, OLIVIER コガタノゲンゴロウ
Ent. III., Nr. 40, p. 14, t. 3, f. 25, (*Dytiscus*) (1785).
Loc. Distr.—Taihōrin, Tainon.
Gen. Distr.—Asia, Africa, South Europe, Australia.

japonicus, SHARP ゲンゴロウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 45, (1873).
Loc. Distr.—Kōshun, Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, Manchuria.

HALIPLIDAE 小頭水棲科

Genus **PELTODYTES,** REGIMBART

intermedius, SHARP コガシラミヅムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 55, (*Cnemidotus*) (1873).
Loc. Distr.—Kankau, Lake Candidius (Nichigetsutan).
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sinensis, HOPE シナコガシラミヅムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 15, (*Cnemidotus*) (1845).
Loc. Distr.—Kōshun, Taitō.
Gen. Distr.—Formosa, China, Tonkin.

Genus **HALIPLUS,** LATREILLE

sharpi, WEHNEKE シャープコガシラミヅムシ
Stett. Ent. Zeit. XLI., p. 74, (1880).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

sauteri, ZIMMERMANN ザウタコガシラミヅムシ
Ent. Blätt. XX., p. 130, (1924).
Loc. Distr.—Horisha, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

simplex, CLARK チョウセンコガシラミヅムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 419, (1863).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

GYRINIDAE 鼓豆科

Subfamily ENHYDRINAE

Genus DINEUTES, Mac Leay

australis, Fabicius コクロミヅスマシ
Syst. Ent., p. 235, (*Gyrinus*) (1775).
Loc. Distr.—Kôtôsho, Hôkotô.
Gen. Distr.—Malay, Sunda Islands, Philippines, Australia, New Zealand, New Caledonia, Formosa.

indicus, Aube オキナワオホミヅスマシ
Spec. Col. p. 772, (1838).
Loc. Distr.—Ratô, Urai, Heitô.
Gen. Distr.—India, Formosa, Loo-Choo.

mellyi, Regimbart クロヒラタミヅスマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II., p. 390, (1882).
Loc. Distr.—Hoozan, Heitô, Anping.
Gen. Distr.—Formosa, China, India.

marginatus, Sharp オホミヅスマシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 56, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Japan proper, Manchuria, China, India, Java, Formosa.

Genus PORRHYNCHUS, Casternau

landaisi, Regimbart ランダイスミヅスマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. LX., p. 667, (1891).
Loc. Distr.—Tainan, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Tonkin, Hainan, South-China, Formosa.

Subfamily GYRININAE

Genus GYRINUS, Geoffroy

orientalis, Regimart ツヤホソミヅスマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III., p. 167. (1883).
Loc. Distr.—Hoozan, Jitsugetsutan, Taihoku.
Gen. Distr.—China, Formosa.

PAUSSIDAE 角太歩行科

Genus PLATYRHOPALUS, Westwood

paussoides, Wasmann イヅホシヒゲブトオサ
Not. Leyd. Mus. XXV., p. 20, t. 3, f. 3, (1904).
=*5-punctata,* Shiraki, Monthl. Mag. Zool. Tokyo, Japan, XIX., 224, p. 195, pl. 5. f. A. (*Pseudorhopalus*) (1907).
Loc. Distr.—Taihoku, Daiton, Kappanzan.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **PAUSSUS**, LINNÉ

elongatus, KANO ナガヒゲブトオサ
Kontyû, IV, No. 2, p. 96, (1930).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

horikawae, KANO ホリカハヒゲブトオサ
Kontyû, IV, No. 2, p. 97, (1930).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

jousselini, GUERIN-MÉNÉVILLE ジュセリンヒゲブトオサ
Rev. Zool., p. 27, (1838).
Loc. Distr.—Kusukusu.
Gen. Distr.—Burma, Hongkong, Formosa.

sauteri, WASMANN ザウタヒゲブトオサ
Suppl. Ent. No. 1., p. 1, t. , f. 6, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

formosus, WASMANN タイワンヒゲブトオサ
Suppl. Ent. No. 1., p. 3, t. 1, f. 7, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin, Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

minor, SHIRAKI ヒメヒゲブトオサ
Month. Mag. Zool. Tokyo, Japan, XIX., p. 174, pl. 5, f. B, (1907).
Loc. Distr.—Shirin.
Gen. Distr.—Formosa.

RHYSODIDAE 背筋蟲科

Genus **RHYSODES**, DALMAN

taprobanae, FAIRMAIRE セイロンセスヂムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, p. 389, (1873).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Ceylon.

cervifrons, GROUVELLE エグリセスヂムシ
Arch. Naturg., A. 11, p. 33, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Formosa.

CUPEDIDAE 長扁蟲科

(*Cupesidae*)

Genus **CUPES**, FABRICIUS

formosanus, TAMANUKI タイワンナガヒラタムシ
Month. Mag. Zool. Tôkyô XL., No. 476, p. 251, f. 4, (1928).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Suborder II. POLYCERATA 異角亞目

Division I. STAPHYLINOIDEA 隱翅族

STAPHYLINIDAE 隱翅科

Subfamily OXYTELINAE

Tribe: PIESTINI

Subtribe: ELEUSII

Genus ELEUSIS, CASTERNAU

humilis, ERICHSON ウスバハネカクシ
Gen. Spec. Staph., 1839-40, p. 839, (1840).
Loc. Distr.—Suisharyō.
Gen. Distr.—Sunda Islands, East India, Ceylon, California, Mexico, Columbia, Venezuela, Brasil, Japan proper, Formosa.

kraatzi, FAUVER キウスバハネカクシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XII., p. 207, (1878).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Nias, Formosa.

Subtribe: LEPTOCHIRI

Genus BOROLINUS, BERNHAUER

minutus, CASTERNAU オニハネカクシ
Hist. Nat. I., p. 186, (1840).
Loc. Distr.—Taihōrin, Hoozan, Fuhōshō, Suisharyō.
Gen. Distr.—East India, Sunda Islands, Malacca, Sumatra, Borneo, Formosa.

Genus PRIOCHIRUS, SHARP

tonkinensis, BERNHAUER トンキンオニハネカクシ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 148, (1903).
Loc. Distr.—Hoozan, Banshoryō, Kōsempo, Alikang, Fuhōshō, Taihōrin, Suisharyō.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa.

Genus THORACOCHIRUS, BERNHAUER

variolosus, FAUVER コオニハネカクシ
Rev. d'Ent. XIV., p. 183, (1895).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Subtribe: LISPINI

Genus HOLOSUS, MOTSCHULSKY

densus, BERNHAUER フトハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 221, (1922).
Loc. Distr.—Taihōrin, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LISPINUS,** Erichson

impressicollis, Motschulsky ムネモンメダカ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXX., 4, p. 495, (1857).
Loc. Distr.—Taihôrin, Suisharyô, Kankau, Akau.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Hongkong, Hawaii, Madeira, Africa, Comoro, Formosa.

quadrinotatus, Fauver ヨツモンメダカ
Rev. d'Ent. XXIII., p. 80, (1904).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo, Suisharyô.
Gen. Distr.—East India, Sunda Islands, Formosa.

longipennis var. **formosae,** Bernhauer タイワンメダカ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 222, (1922).
Loc. Distr.—Suisharyô, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **OXYTELINI**

Genus **TROGOPHLOEUS,** Mannerheim

globicollis, Eppelsheim マルムネメダカ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIX., p. 145, (1885).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—West Africa, Formosa.

silvestris, Cameron シルベストリメダカ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 61, (1918).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Singapore, Formosa.

Genus **OXYTELOPSIS,** Fauver

cimicoides, Fauver ノミガタメダカ
Rev. d'Ent. XIV., p. 200, (1895).
Loc. Distr.—Kankau, Alikang, Pilam.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **OXYTELUS,** Gravenhorst

crassicornis, Sharp ヒゲブトホソメダカ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 92, (1874).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

ferrugineus, Kraatz アカゲホソメダカ
Arch. Naturg. XXV., I, p. 173, (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Hawaii, Ceylon, East India, Sunda Islands, Antilles, Seychelles, Madagascar, Comoro, Zanzibar, Columbia, Panama, Japan proper, Formosa.

latiusculus, KRAATZ ホソメダカ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 176, (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—India, Sunda Islands, Madagascar, Africa, Australia, Formosa.

lewisius, SHARP レビスケシメダカ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 95, (1874).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

megaceros, FAUVER カギメダカ
Rev. d'Ent. XIV., p. 201, (1895).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—East India, Sumatra, Formosa.

micans, KRAATZ ツヤケシメダカ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 175, (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Madagascar, Abyssinia, Capland, Formosa.

nigriceps, KRAATZ クロアシアカメダカ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 171. (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—East India, Sunda Islands, Ceylon, South China, Formosa.

sauteri, BERNHAUER ザウタメダカ
Verh. Zool-Bot. Ges. Wien, LVII., p. 375, (1907).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

thoracicus, MOTSCHULSKY ムナビロメダカ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXX., 4, p. 504, (1857).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—East India, Sunda Islands, Formosa.

amicus, BERNHAUER アツメダカ
Kol. Rundsch. X., p. 122, (1922).
Loc. Distr.—Akau, Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Korea, Manchuria, Formosa.

Genus **PLATYSTETHUS,** MANNERHEIM

crassicornis, MOTSHULSKY フトヒゲコハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXX., 4, 506, (1857).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—East India, Philippines, Formosa.

operosus, SHARP タイホリンコハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 91, (1874).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **BLEDIUS**, Mannerheim

formosae, Bernhauer タカサゴツツハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 223, (1922).
Loc. Distr.—Anping, Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

gigantulus, Bernhauer オホツツハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 224, (1922).
Loc. Distr.—Anping, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Bernhauer ザウテルツツハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 224, (1922).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

bicornis, Germar ムネアカツツハネカクシ
Fn. Ins. Eur. VI., nr. 15, (1822).
Loc. Distr.—Alikang, Suisharyô.
Gen. Distr.—Middle Europe, Trans-Caspia, Turkey, Formosa.

orphanus, Sharp ツツハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 91, (1874).
Loc. Distr.—Chikutôki.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

kosempoensis, Bernhauer コウセンツツハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 225, (1922).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

lucidus, Sharp タイホリンツツハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 90, (1874).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, China, East India, Sunda Islands, Madagascar, Australia, Formosa.

helferi, Fauvel チビツツハネカクシ
Rev. d'Ent. XXIII., p. 122, (1904).
Loc. Distr.—Suisharyô, Taihorin, Anping.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

fragilis, Sharp ヒメツツハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 90, (1874).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

albomarginatus, Bernhauer シロヘリツツハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 225, (1922).
Loc. Distr.—Alikang, Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **OSORIINI**

Genus **PARAGONUS**, FAUVER

sauteri, BERNHAUER オシバハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 225, (1922).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MIMOGONUS**, FAUVER

microps, SHARP ケシチビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III., p. 412, (1889).
Loc. Distr.—Alikang, Kankau, Akau.
Gen. Distr.—Japon proper, Formosa.

Genus **OSORIUS**, LATREILLE

formosae, BERNHAUER オホヅブトハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 226, (1922).
Loc. Distr.—Suisharyō, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

punctus, BERNHAUER モンマダラヅブトハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 226, (1922).
Loc. Distr.—Suisharyō, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

mortuorum, BERNHAUER ヅブトハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 226, (1922).
Loc. Distr.—Suisharyō.
Gen. Distr.—Formosa.

tonkinensis, BERNHAUER トンキンヅブトハネカクシ
Verh. Zool.-Bot. Gest. Wien, LXIV., p. 87, (1914).
Loc. Distr.—Kōsempo, Suisharyō, Taihōrin, Hoozan.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa.

Subfamily **STENINAE**

Tribe: **STENINI**

Genus **STENUS**, LATREILLE

submarginatus, BERNHAUER コブメダカ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 227, (1922).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **PAEDERINAE**

Tribe: **PAEDERINI**

Genus **PAEDERUS**, FABRICIUS

kosempoensis, BERNHAUER アカムネアリガタハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 228, (1922).

Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

fuscipes, CURTIS アカアシアリガタハネカクシ
Ent. Brit. III., 108, (1823-40).
Loc. Distr.—Suisharyô, Tairan, Taihôrin, Kankau, Kôsempo, Anping.
Gen. Distr.—Europe, Asia, Africa, Australia.

piliferus, MOTSCHULSKY アヲバアリガタハネカクシ
Etud. Ent. VIII., p. 74, (1859).
Loc. Distr.—Anping, Tainan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, East India.

coxalis, FAUVEL クロマルムネアリガタハネカクシ
Rev. d'Ent. XIV., p. 232, (1895).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **DIBELONETES,** SAHLBERG

palaeotropicus, BERNHAUER イトハネカクシ
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, LXVI., p. 419, (1916).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Philippines, Borneo, Queensland, Formosa.

formosae, BERNHAUER コイトハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 228, (1922).
Loc. Distr.—Anping, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ASTENUS,** STEPHENS

indicus, KRAATZ インドイトハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 148, (1859).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, East India, Philippines, Sunda Islands, Sardinia, Sicilia, Madagascar, Abyssinia.

chroloticus, SHARP ヤマトイトハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 74, (1874).
Loc. Distr.—Hoozan, Alikang.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

concolor, KRAATZ チヤイロイトハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 149, (1859).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

bimaculatus, ERICHSON フタモンイトハネカクシ
Gen. Spec. Staph., p. 641, (1849-50).

Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—South Europe, Egypt, Syria, South Russia, Turkey, Madeira, Formosa.

bicolor, SHARP シリグロイトハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 72, (1874).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China.

brevipes, SHARP コアシイトハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 71, (1874).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, BERNHAUER ザウタイトハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 229, (1922).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

parvipennis, BERNHAUER コバネイトハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 229, (1922).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STILICOPSIS,** SACHSE

setigera, SHARP ムナグリハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 67, (1874).
Loc. Distr.—Alikang, Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **ECHIASTER,** ERICHSON

japonicus var. **unicolor,** BERNHAUER チヤイロムナグリハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 230, (1922).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STILICUS,** LATREILLE

velutinus, FAUVEL アリダマシ
Rev. d'Ent. XIV., p. 226, (1895).
Loc. Distr.—Kankau, Taihôrin.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

ceylanensis KRAATZ セイロンアリダマシ
Arch. Naturg. XXV., I, p. 126, (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin, Pilam.
Gen. Distr.—Ceylon, Java, Philippines, Singapore, Japan proper, Formosa.

rufescens, SHARP アカアリダマシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 61, (1874).

Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, East Siberia, Korea, Formosa.

Genus **MEDON**, Stephens

confertus, Sharp ダンダラトガリハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III., p. 265, (1889).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Japa proper, Formosa.

lewisius, Sharp レビストガリハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 65, (1874).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

debilicornis, Wollaston ムネウストガリハネカクシ
Cat. Col. Mader., p. 194, (1857).
Loc. Distr.—Akau, Anping, Kôsempo, Alkang.
Gen. Distr.—France, Madeira, Argentin, Peru, Brasil, Africa, Persia, East India, Japan proper, Formosa, Mexico, Antilles, South Caloline, Texas, Hawaii, Australia.

staphylinoides, Kraatz ニセトガリハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 134. (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Madagascar, Ceylon, East India, Formosa.

ochraceus, Gravenhorst ヅグロトガリハネカクシ
Col. Micr. Brunsv., p. 59, (1802).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

chinensis, Boheman ツマアカバトガリハネカクシ
Resa Eugen., p. 32, (1858).
Loc. Distr.—Taihôrin, Pilam.
Gen. Distr.—China, East India, Ceylon, Sunda Islands, Formosa, Japan proper.

uvidus, Kraatz サビトガリハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 138, (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

vilis, Kraatz チヤイロトガリハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 139, (1859).
Loc. Distr.—Suisharyô, Anping.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Sunda Islands, Madagascar, Canara Islands, Peru, Brasil, Guadeloupe, Formosa, Hawaii.

Genus **SCOPAEUS**, Erichson

testaceus, Motschulsky キイロホソハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI., 2, p. 642, (1858).

Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Sumatra, Java, Formosa.

dilutus, Motschulsky ウスバホソハネカクシ
Bull. Mosc. XXXI., 2, p. 642, (1858).
Loc. Distr.—Anping, Kankau.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Philippines, Formosa.

velutinus, Motschulsky アンピンホソハネカクシ
Bull. Mosc. XXXI., 2, p. 642, (1858).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Borneo, Formosa.

pallidulus, Kraatz キイロホソハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 131, (1859).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **LATHROBIUM,** Gravenhorst

unicolor, Kraatz ムナボソハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., p. 117, (1859).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—East India, Sunda Islands, Philippines, Formosa, Japan proper.

Genus **DOLICAON,** Casternau

indicus, Kraatz インドムナボソハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 118, (1859).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, China, Formosa, Madagascar, Africa.

Genus **CRYTOBIUM,** Mannerheim

japonicum, Sharp ヤマトムナボソハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 60, (1874).
Loc. Distr.—Kôsempo, Pilam.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

marginatum, Motschulsky ヘリアカムナボソハネカクシ
Bull. Mosc. XXXI., 2, p. 652, (1858).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Java, Formosa.

ceylanense, Kraatz セイロンムナボソハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 119, (1859).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

abdominale var. **rufipenne,** Motschulsky アカバムナボソハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI., 2, p. 651, (1858).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Malay, India, Ceylon, Africa.

Subfamily **STAPHYLININAE**

Tribe: **XANTHOLININI**

Genus **LEPTACINUS,** Erichson

parumpunctatus var. **flavipennis,** Kraatz キバネナガムナボソハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 111, (1858).
Loc Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Formosa, Japan proper.

Genus **MITOMORPHUS,** Kraatz

indicus, Kraatz ツマグロナガハネカクシ
Arch. Naturg XXV., p. 107 t. 2, f. 5a-b, (1859).
Loc. Distr.—Kankau, Taihôrin, Alikang.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Genus **XANTHOLINUS,** Serville

metallicus, Fauver ツヤナガハネカクシ
Rev. d'Ent. XIV., p. 243, (1895).
Loc. Distr.—Hokuto, Taihôrin.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **DIOCHUS,** Erichson

conicollis, Motschulsky ミツカドコガシラハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI., 2, p. 658, t. 1, f. k, (1858).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—East. India, Formosa.

antennatus, Motschulsky ヒゲコガシラハネカクシ
Bull. Soc. Naa. Mosc. XXXI., 2, p. 659, (1858).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Genus **PLATYPROSOPUS,** Mannerheim

aequalis, Bernhauer (nom. nov.) ホソコガシラハネカクシ
=*parallelus,* Bernhauer, Ent. Blätt. VII., p. 86, (1911).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Tribe : STHAPHYLININI

Genus ACTOBIUS, FAUVER

basalis, MOTSCHULSKY インドコガシラハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIII., 2, p. 664, (*Neobisnius*) (1858).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Formosa.

horni, BERNHAUER ホルンコガシラハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., 7, p. 231, (1922).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus PHILONTHUS, CURTIS

formosae, BERNHAUER タイワンコガシラハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., 7, p. 232, (1922).
Loc. Distr.—Kankau, Pilam, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

thermarum, AUBÉ アカバネコガシラハネカクシ
Ann. Soc Ent. Fr. (2) VIII., p. 316, (1850).
Loc. Distr.—Taihôrin, Alikang.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

sulcifrons, SHARP マエミゾコガシラハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III., p. 39, (1889).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

flavocinctus, MOTSCHULSKY キアシコガシラハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI., 2. p. 663, (1858).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Formosa, East India, Ceylon, Mauritius, Reunion.

quisquiliarius, GYLLENHAL アンピンコガシラハネカクシ
Ins. Suec. II., p. 335, (1810).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

lewisius, SHARP レビスコガシラハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 42, (1874).
Loc. Distr.—Kankau, Pilam.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

aeneipennis, BOHEMAN カラカネコガシラハネカクシ
Resa. Eugen., p. 30, (1858).
Loc. Distr.—Chikutôki, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa, India, Malay, New-Guinea, Mauritius, Reunion.

agilis, GRAVENHORST イクビコガシラハネカクシ
Mon. Col. Micr., p. 77, (1806).

Loc. Distr.—Pilam.
Gen. Distr.—Palaearctic Region, North America, Africa.

minutus, Boheman シヤチホココガシラハネカクシ
Ins. Caffr. I., p. 279, (1848).
Loc. Distr.—Taihôrin, Suisharyô, Anping.
Gen. Distr.—Africa, Spain, East India, Ceylon, Sunda Islands, New Guinea, China, Japan proper, Formosa.

logicornis, Stephens クロフヤコガシラハネカクシ
Ill. Brit. V., p. 237, (1832).
Loc. Distr.—Anping, Kôsempo, Pilam, Taihôrin.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

tardus, Kraatz ハバビロコガシラハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 84, (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

rectangulus, Sharp カクムネコガシラハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 42, (1874).
Loc. Distr.—Taihôrin, Pilam.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

madurensis, Bernhauer インドクロコガシラハネカクシ
Ent. Blätt. XI., p. 255, (1915).
Loc. Distr.—Kankau, Taihôrin.
Gen. Distr.—East-India, Formosa,

notabilis, Kraatz オホコガシラハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 79, (1859).
Loc. Distr.—Anping, Kankau.
Gen. Distr.—Philippines, East-India, Ceylon, Formosa.

Genus **BELONUCHUS,** Nordmann

rufoniger var. **nigripes,** Bernhauer アカグロコガシラハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., 7, p. 233, (1922).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STAPHYLINUS,** Linné

plagiicollis, Fairmaire サビイロオホハネカクシ
Compt. R. Soc. Ent. Belg. XXXV., 191, (1891).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

circumcinctus, Bernhauer ミヤマオホハネカクシ
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, LXIV., p. 102, (1914).
Loc. Distr.—Mt. Morrison (Niitaka.).
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Tribe: **QUEDIINI**

Genus **ACYLOPHORUS**, NORDMANN

furcatus, MOTSCHULSKY カンカウオホハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI, 2, p. 657, (1858).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—East-India, Formosa.

Subfamily **TACHYPORINAE**

Tribe: **BOLITOBIINI**

Genus **MYCETOPORUS**, MANNERHEIM

discoidalis, SHARP ヤマトイクビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 463, (1888).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, For sa.

Genus **BOLITOBIUS**, MANNERHEIM

pallidiceps, SHARP カクモンツヤイクビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. His. (6) II., p. 459, (1888).
Loc. Distr.—Kôsempo, Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **TACHYPORINI**

Genus **CONOSOMA**, KRAATZ

pedicularium, GRAVENHORST チヤバネイクビハネカクシ
Col. Micr. Brunsv., p. 133, (1802).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Palaearctic region.

fimbriatum, SHARP クロイクビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, p. 454, (1888).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

humerale, EPPELSHEIM カタウスイクビハネカクシ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 36, (1886).
Loc Distr.—Hoozan, Pilam.
Gen. Distr.—Amur, Formosa.

Genus **TACHYPORUS**, GRAVENHORST

flavopictus, FAUVEL キイロイクビハネカクシ
Rev. d'Ent. XIV., p. 282, (1895).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **COPROPORUS**, KRAATZ

bivittatus, BERNHAUER フタホシケシイクビハネカクシ
Ann. Mus. Nat. Hung. XIII., p. 155, (1915).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—East Africa, Formosa.

flavicornis, KRAATZ キヒゲケシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., 1, p. 56, (1859).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

latus, MOTSCHULSKY ウスイロケシイクビハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI, 3, p. 219, t. 1, f. 9, (1858).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

minimus, MOTSCHULSKY ツヤケシイクビハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI, 3, p. 220, (1858).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa, Indian-Malay archipelago, Seychelles, Reunion.

formosae, BERNHAUER タカサゴケシイクビハネカクシ
Percy Seaden Trust. Exp. XXIII., p. 178, (1921).
Loc. Distr.—Kanku.
Gen. Distr.—Formosa.

rufopiceus, BERNHAUER アカチヤケシイクビハネカクシ
Col. Rundsch., p. 44, (1917).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

subglaber, BERNHAUER ケナシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., 7, p. 234, (1922).
Loc. Distr.—Hoozan, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

horni, BERNHAUER ホルンケシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., 7, p. 234, (1922).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

immaturus, BERNHAUER キイロツヤケシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., A. 7, p. 235, (1922).
Loc. Distr.—Kôsempo, Akau, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, BERNHAUER タイワンツヤケシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., A. 7, p. 235, (1922).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LEUCOPARYPHUS,** KRAATZ

silphoides var. **marginicollis,** KRAATZ モンクロキイクビハネカクシ
Naturg. Ins. Deutschl. II., p. 394, (1856-58).
Loc. Distr.—Widely distributed.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Subfamily **ALEOCHARINAE**

Tribe: **LEUCOCRASPEDINI,** FENYES

Genus **LEUCOCRASPEDUM,** KRAATZ

dilutum, BERNHAUER ウスバケシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 236, (1922).
Loc. Distr.—Shis, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

minutum, BERNHAUER ケシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 236, (1922).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **MYLLAENINI,**

Genus **MYLLAENA,** ERICHSON

insularis, FENYES タイワンイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 45, (1914).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **OLIGOTINI**

Genus **OLIGOTA,** MANNERHEIM

formosae, BERNHAUER ホウライイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 237, (1922).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **BOLITOCHARINI**

Subtribe: **GYROPHAENAE**

Genus **BRACHIDA,** MULSANT et REY

crassiuscula, KRAATZ チビイクビハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., p. 41, (1859).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, East India, Philippines, Formosa.

Genus **PLAGIUSA,** BERNHAUER

ceylonica, KRAATZ セイロンイクビハネカクシ
Linn. Ent. XI., p. 8, (1857).

Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Subtribe: **HOMALOTAE**

Genus **HOMALOTA,** Mannerheim

opaca, Fenyes ワヤケシイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 46, (1914).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

granigera, Sharp サメハダイクビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 375, (1888).
Loc. Distr.—Aaku, Taihôrin, Suisharyô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

fraterna, Sharp タイホリンイクビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 376, (1888).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Farmosa.

Genus **ANOMOGNATHUS,** Gemminger et Harold

armatus, Sharp ホソイクビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 294, (1888).
Loc. Distr.—Taihôrin, Lambeh.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subtribe: **PHYTOSI**

Genus **PHYTOSUS,** Curtis

schenklingi, Bernhauer アリカンイクビハネオクシ
Arch. Naturg. LXXXVIII., p. 236, (1922).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **BOLITOCHARAE**

Genus **TACHYUSIDA,** Mulsant et Rey

luteipennis, Fenyes ウスバネイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 47, (1914).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **MYRMEDONIINI**

Subtribe: **FALAGRIAE**

Genus **FALAGRIA,** Mannerheim

concinua, Erichson コウセンイクビハネカクシ
Gen. Spec. Staph., p. 51, (1849).

Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Cosmopolite (ex. Africa).

simplex, SHARP ヒトリイクビハネカクシ
Trans. Ent. Soc. Lond. p. 2. (1874).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

dimidiata, MOTSCHULSKY シヤカイクビハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXI., 3, p. 260, (1858).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Formosa.

madurensis, BERNHAUER インドイクビハネカクシ
Ent. Blätt. XI., p. 256, (1915).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Genus **GNYPETA,** C. G. THOMSON

inducta, FENYES アカウイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 49, (1914).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **ATHETAE**

Genus **ATHETA,** C. G. THOMSON

annuliventris, KRAATZ クラツイクビハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., p. 40, (1849).
Loc. Distr.—Alikang, Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

dilutipennis, MOTSCHULSKY ウスイロイクビハネカクシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. III., p. 252, (1858).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa, Indian-Malay archipelago, Africa.

sordida, MARSHAM ウスグロイクビハネカクシ
Col. Brit., p. 514, (1802).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa, Europe, Caucasus, Egypt, North America, Chile.

fungi, GRAVENHORST キノコイクビハネカクシ
Mon. Col. Micr., p. 157, (1806).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kankau.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

vexans, FENYES フエニスイクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 50, (1914).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **SCHISTOGENIAE**

Genus **SCHISTOGENIA,** KRAATZ

bicolor, FENYES フタイロハバビロハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 47, (1914).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

dubia, FENYES ハバビロハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 48, (1914).
Loc. Distr. Shis, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **MYRMEDONIAE**

Genus **ASTILBUS,** STEPHENS

ocularis. FENYES カンカウハバビロ ネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 50, (1914).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ZYRAS,** STEPHENS

compressicornis, FAUVEL ヒラヒゲハラビロハネカクシ
Rev. d'Ent. XXIV., p. 143, (1905).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Pilam.
Gen. Distr.—China, Borneo, Sumatra, Java, Formosa.

abbreviatus, FENYES フトハラビロハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 52, (1914).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

nigrescens, MOTSCHULSKY クロハラビロハネカクシ
Bull. Mosc. XXXI., p. 262, (1858).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

hirtus, KRAATZ ケブカハラビロハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., p. 25, (1859).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Subtribe: **HOPLANDRIAE**

Genus **HOPLANDRIA,** KRAATZ

fuscipennis, KRAATZ アカチャヅヤコクビハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., p. 9, (1859).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Tribe: **ALEOCHARINI**

Subtribe: **CALODERAE**

Genus **CALODERA**, MANNERHEIM

coccinea, MATSUMURA ベニコクビハネカクシ
Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII., p. 146, (1911).
Loc. Distr.– Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **ALEOCHARAE**

Genus **ALEOCHARA**, GRAVENHORST

postica, WALKER アトモンコクビハネカクシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 205, (1858).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

nigra, KRAATZ クロコクビハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., p. 13, (1859).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

insularis, FENYES タイワンコクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXXX., p. 54, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

puberula, KLUG ケブカコクビハネカクシ
Abh. Ak. Wiss. Berl., p. 139, (1832–33).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

asiatica, KRAATZ アジアコクビハネカクシ
Arch. Naturg. XXV., p. 15, (1859).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, China, Japan proper, Formosa, Philippines.

antennalis, FENYES アンビンコクビハネカクシ
Arch. Naturg. LXX., p. 54, (1914).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

PSELAPHIDAE 蟻塚科

Subfamily **PSELAPHINAE**

Tribe: **PYXIDICERINI**

Genus **ZETHOPSUS**, REITTER

nitidulus, REITTER ツヤアリヅカ
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXXII, p. 382, (1882).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Tribe: **BATRISINI**

Genus **DIAUGIS**, Raffray

plagiata, Raffray ヘチアリヅカ
Ent. Mitteil. I., 4, p. 103, (1912).
Loc. Distr.—Kôsemp.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **BATRISODES**, Reitter

semipunctatus, Raffray タカオアリヅカ
Ent. Mitteil. I., 4, p. 104, (1912).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TRISOCENUS**, Raffray

siamensis, Raffray シヤムアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII., p. 43, (1904).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Siam, Formosa.

singhalensis, Raffray セイロンアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXX., p. 27, (1901).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

sauteri, Raffray ザウタアリヅカ
Ent. Mitteil. I., 4, p. 105, (1912).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

schenklingi, Raffray シェンクリングアリヅカ
Ent. Mitteil. I., 4, p. 105, (1912).
Loc. Distr.—Akau, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

crurulis, Raffray カタアリヅカ
Suppl. Ent. III., p. 1, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

trilobatus, Raffray ベニケシアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII., p. 50, (1904).
Loc. Distr.—Tansui.
Gen. Distr.—China, Formosa.

sauciipes, Raffray クリイロツヤアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII., p. 50. (1904).
Loc. Distr. Tansui.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **BATRIBOLBUS,** RAFFRAY

palpator, RAFFRAY ベニバヒメアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXII., p. 451, (*Eubatrinus*) (1893).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **ARNYLLIUM,** REITTER

peotinatum, REITTER クシアリヅカ
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXXIII., p. 392, t. 20, f. 9, (1883).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Sumatra, Formosa.

ciliatum, RAFFRAY マレイアリヅカ
Rev. d'Ent. XIII., p. 279, (1894).
Loc. Distr.—Takao, Kôsempo, Hoozan.
Gen. Distr.—Singapore, Penang, Formosa.

scopula, RAFFRAY タカサゴアリヅカ
Suppl. Ent. III., p. 2, (1914).
Loc. Distr.—Takao, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SATHYTES,** WESTWOOD

rufus, RAFFRAY アカアリヅカ
Rev. d'Ent. XIII., p. 281, (1894).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Penang, Formosa.

Tribe: **PRACHYGLUTINI**

Genus **PATRAXIS,** REITTER

obesa, RAFFRAY フイリプピンアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII., p. 120, (1904).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **ATENISODUS,** RAFFRAY

gracilicornis, RAFFRAY キヒゲアリヅカ
Ent. Mitteil. I., 4, p. 107, (1912).
Loc. Distr.—Akau, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **REICHENBACHIA,** LEACH

coelestis, RAFFRAY シヨウテンアリヅカ
Ent. Mitteil. I., 4, p. 108, (1912).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

implicita, RAFFRAY マキバアリヅカ
Ent. Mitteil. L, 4, p. 103, (1912).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

mamilla, SCHAUFUSS ダルマアリヅカ
Psel. Siams., p. 9, (1877).
Loc. Distr.—Rōnō.
Gen. Distr.—Siam, Formosa.

Genus **TRIMIOMICRUS,** SHARP

cavernosus, RAFFRAY コケムシガタアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII, p. 147, (1904).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **PROSTHECARTHRON,** RAFFRAY

sauteri, RAFFRAY アンピンアリヅカ
Suppl. Ent. III., p. 3, (1914).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **HYBOCEPHALINI**

Genus **APHARINA,** REITTER

conicicollis, SCHAUFUSS タマヒゲケシアリヅカ
Psel. Siam., p. 17, (1877).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Siam, Formosa.

Tribe: **CTENISTINI**

Genus **PORODERUS,** SHARP

siamensis, SCHAUFUSS シヤムヒゲナガアリヅカ
Nunq. ot. III., p. 511, (*Enoptostomus*) (1879).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Siam, Formosa.

Genus **CTENISOPHUS,** RAFFRAY

bowringi, RAFFRAY ボウリングアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII., p. 343, (1904).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Siam, Formosa.

Tribe: **TYRINI**

Genus **CENTROPHTHALMUS,** SCHMIDT-GOEBER

punctipennis, SCHAUFUSS ホソクビヒゲナガアリヅカ
Psel. Siam., p. 21, (1877).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Siam, Formosa.

sinensis, RAFFRAY シナヒゲナガアリヅカ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIII., p. 374, (1904).
Loc. Distr.—Takao, Kôsempo, Akau.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **DURBOS,** SHARP

punctulatus, RAFFRAY テンマダラアリヅカ
Suppl. Ent. III., p. 4, (1914).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **CLAVIGERINAE**

Genus **ANACLASIGER,** RAFFRAY

sinuaticollis, RAFFRAY ヒゲブトアリヅカ
Rev. d'Ent. IX., p. 216, t. 3, f. 21, 21', (1891).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Singapore, Formosa.

SCYDMAENIDAE 蘚苔蟲科

Tribe: **NEURAPHINI**

Genus **EUCONNUS,** C. G. THOMSON

Subgenus **NAPOCHUS,** REITTER

sauteri, REITTER ザウタコケムシ
Ent. Mitteil. II., p. 265, (1913).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

schenklingi, REITTER シェンクリングコケムシ
Ent. Mitteil. II., p. 266, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **MICROSCYDMUS,** SAULCY et CRAISS

akauensis, REITTER アカウコケムシ
Ent. Mitteil. II., p. 267, (1913).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, REITTER タイワンコケムシ
Ent. Mitteil. II., p. 266, (1913).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **SCYDMAENINI**

Genus **SCYDMAENUS,** LATREILLE

Subgenus **SCYDMAENUS,** s. str.

vestitus, SHARP ムクゲコケムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 126, (1874).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

vestitoides, REITTER タカオコケムシ
Ent. Mitteil. II., p. 268, (1913).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **EUSTEMMUS,** REITTER

taihorinus, REITTER タイホリンコケムシ
Ent. Mitteil. II., p. 268, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

SILPHIDAE 埋葬蟲科

Subfamily **SILPHINAE**

Tribe: **SILPHINI**

Genus **SILPHA,** LINNÉ

Subgenus **THANATOPHILUS,** LEACH

auripilosa, PORTÉVIN キンケヒラタシデムシ（ヒメヒラタシデムシ）
Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, p. 421, (1905).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Eastern Siberia, Kuriles, Saghalien, Japan proper, Korea, Formosa. Yunnan.

minuta, KRAATZ ヒメヒラタシデムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XX., p. 374, (1876).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Tibet, Assam, Punjub, Formosa.

Subgenus **OICEOPTOMA,** LEACH

thoracica, LINNÉ ビロドヒラタシデムシ
Syst. Nat. X., p. 360, (1758).
Loc. Distr.—Arisan. Niitaka, Nôkô.
Gen. Distr.—Europe, Siberia, Saghalien, Mongolia, China, Japan proper, Formosa.

Subgenus **EUSILPHA,** SEMENOV

cyaneocincta, FAIRMAIRE アヲヒラタシデムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII., p. 92, (1878).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

japonica, MOTSCHULSKY オホヒラタシデムシ
Etud. Ent. IX., p. 12, (1860).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subgenus **CALOSIRPHA,** PORTÉVIN

brunneicollis, KRAATZ ベヲコウヒラタシデムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXI., p. 106, (1877).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Arisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

cyaneocephala, PORTÉVIN アヲクビヒラタシデムシ
Suppl. Ent. III., p. 6, (1914).
Loc. Distr.—Banshoryō.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **NECRODINI**

Genus **NECRODES,** LEACH

Subgenus **PROTONECRODES,** PORTÉVIN

nigricornis, HAROLD モモブトシデムシ
Abh. Nat. Ver. Bremen, IV, p. 286, (1875).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—North China, Japan proper, Formosa.

Genus **DIAMESUS,** HOPE

osculans, VIGORS アカモンオホモモブトシデムシ
Zool. Journ. I., p. 537, pl. 20, f. 2, (1825).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—India, Ceylon to New Guinea, Queensland, Woodlark Island, Formosa.

bimaculatus, PORTÉVIN フタモンオホモモブトシデムシ (ホシモモブトシデムシ)
Suppl. Ent. III., p. 6, (1915).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **NICROPHORINI**

Genus **NICROPHORUS,** FABRICIUS

nepalensis, HOPE ネパールシデムシ
Zool. Misc., p. 21, (1831).

Loc. Distr.—Taihoku, Arisan, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Central China, Nepal, Sikkim, Bengal, Tonkin, Sumatra, Java, Borneo, Formosa.

concolor, KRAATZ クロシデムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXI., p. 105, (1877).
Loc. Distr.—Taihoku, Musha, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, North China, Formosa.

japonicus, HAROLD シデムシ（ヤマトシデムシ）
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXI., p. 345, (1877).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Monglia, Central China, Formosa.

Genus **PTOMASCOPUS,** KRAAT

morio, KRAATZ コクロシデムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXI., p. 102, 104, (1877).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, China, Formosa.

Subfamily **CATOPINAE**
Tribe: **CATOPINI**
Genus **PTOMAPHAGUS,** ILLIGER

sauteri, PORTÉVIN ザウタシデムシ
Suppl. Ent. III., p. 5, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

PTILIIDAE 危翅蟲科
(*Trichopterigidae*)
Genus **MIKADO,** MATTHEWS

japonicus, MATTHEWS ヤマトムクゲキノコムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III., p. 183, (1889).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **ACROTRICHIS,** MOTSCHULSKY

ceylonica, MOTSCHULSKY セイロンムクゲキノコムシ
Etud. Ent. VII., p. 32, (1858).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

cursitans, NIETNER ムクゲキノコムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX., p. 378, (1856).

Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Ceylon.

ORTHOPEPRIDAE 頂微蟲科

(*Corylophidae*)

Genus **ANISOMERISTES,** Matthews

castaneus, Reitter クリイロミヂンムシ
Mitth. Münch. Entom. Ver. I., p. 126, (*Sericoderus*) (1877).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Ceylon.

Genus **SERICODERUS,** Stephens

lateralis, Gyllenhal ホリミヂンムシ
Ins. Suec. IV. p. 516, (*Cossyphus*) (18).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

SCAPHIDIIDAE 尾蕈蟲科

Genus **DIATELIUM,** Pascoe

wallacei, Pascoe ワレスオキノコ
Journ. Ent. II., p. 27, t. 2, f. 2, (1863).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Sumatra, Borneo, Formosa.

Genus **EPISCAPHIUM,** Lewis

semirufum var. **ruficolle,** Lewis ムネアカオキノコ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI., p. 291, (1893).
Loc. Distr.—Shinten, Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **SCAPHIDIUM,** Olivier

sinuatum, Csiki フチナミオキノコ
Ann. Mus. Nat. Hist. Hung. XXI., p. 32, (1924).
Loc. Distr.—Kôsempo, Fuhôshô, Gyochi, Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

castanicolor, Csiki クリイロオキノコ
Ann. Mus. Nat. Hung. XXI., p. 32, (1924).
Loc. Distr.—Kôsempo, Gyochi, Rônô.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanum, Pic タイワンオキノコ
Echange, XXXI., p. 36, (1915).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Rônô.
Gen. Distr.—Formosa.

fainanense, Pic タイナンオホノコ
Echange, XXXI., p. 43, (1915).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

grande, Gestro オホオキノコ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XV., p. 50, (1880).
Loc. Distr.—Kōsempo, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Sarawak, Formosa.

nigrocinctulum, Olerthur クロオキノコ
Coleopt. Novit. I., p. 7, (1884).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Andaman, Formosa.

longipenne, Achard ナガバネオキノコ
Zool. Med. VI., p. 85, (1921)
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

vicinum, Pic ビワクオキノコ
Mélanges, XVI., p. 2, (1915).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SCAPHOSOMA,** Leach

semiglobosum, Achard マルオキノコ
Zool. Med. VI., p. 87, (1921).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

HISTERIDAE 閃腹蟲科

Subfamily HOLOLEPTINAE

Genus **HOLOLEPTA,** Paykull

depressa, Lewis コヒラタエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5), XIII., p. 132, (1884).
Loc. Distr.—Shinten.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

elongata, Erichson ナガヒラタエムマ
in Klug, Jarb. Ins. I., p. 92, (1834).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—India, Java, Formosa.

higoniae, Lewis ヒゴヒラタエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV., p. 174, (1894).
Loc. Distr.—Horish.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Tonkin.

indica, ERICHSON インドヒラタエムマ
in Klug, Jahrb. Ins. I., p. 90, (1834).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Taihōrinshō.
Gen. Distr.—India, Java, New Guinea, Formosa.

Subfamily **TRIPETICINAE**

Genus **TRIPETICUS**, MARSEUL

canalifrons, BICKHARDT マエミゾツツエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 167, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin, Fuhōshō, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, BICKHARDT ザウタツツエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 167, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

venator, LEWIS ヤマトツツエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII., p. 138, (1884).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subfamily **TERETRIINAE**

Genus **TERETRIOSOMA**, G. HORN

formosum, LEWIS コウトウツツマルエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. XVI., p. 54, (1915).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **ABRAEINAE**

Genus **ONTHOPHILUS**, LEACH

ostreatus, LEWIS ホリシヤツブエムマ
Ent. Monthl. Mag. XVI., p. 78, (2879).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Japan proper, Formosa.

Genus **BACANIUS**, LE CONTE

niponicus, LEWIS ツブエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV., p. 461, (1879).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **ANAPLEUS**, G. HORN

cyclonotus, LEWIS マルムネツブエムマ
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2) XII., p. 35, (*Tribalus*) (1891).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Birma, Perak, Formosa.

Genus **ABRAEUS,** LEACH

bonzicus, MARSEUL マージュールツブエムマ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 226, (1873).
Loc. Distr.—Ritōzan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

indicus, LEWIS インドツブエムマ
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, (2) VII., p. 665, (1888).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Subfamily **SAPRININAE**

Genus **SAPRINUS,** ERICHSON

optabilis, MARSEUL クロツヤエムマ
Monogr. Hister., p. 438, t. 17, f. 65, (1855).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—East-India, Formosa.

quadriguttatus, FABRICIUS ヨツテンツヤエムマ
Ent. Suppl., p. 39, (1798).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen Distr.—India, Formosa.

semistriatus, SCRIBA オホツヤエムマ
Journ. f. d. Liebhab. Ent. Frankfurt, I., p. 72, (1790).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Europe, North Asia, India, Formosa.

speciosus, ERICHSON ルリエムマ
in Klug, Jahrb. Ins. I., p. 179, (1834).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—East-Asia, Australia.

Genus **HYPOCACCUS,** THOMSON

sinae, MARSEUL マメエムマ
Mongr. Hister., p. 496, t. 17, f. 52, (*Saprinus*) (1862).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Formosa, China, Ceylon, Australia.

varians, SCHMIDT コウシュンマメエムマ
Ent. Nachr. XVI., p. 55, (1890).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China, Ceylon, Australia.

Genus **GNATHONCUS,** JACQUELIN DUVAL

rotundatus, KUGELANN マルマメエムマ
in Schneider, Mag., p. 304, (1792).

Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—North Hemisphare.

Subfamily **DENDROPHILINAE**

Genus **DENDROPHILUS**, Leach

xavieri, Marseul ザビエルマメエムマ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 226, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CARCINOPS**, Marseul

quattuordecimstriata, Stephens ジウヨスヂマメエムマ
Ill. Brit. Ins. V., p. 412, (1832).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **PACHYLOMALUS**, Schmidt

musculus, Marseul ホソマメエムマ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 225, (1873).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PAROMALUS**, Erichson

mendicus, Lewis ウスチビエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX., p. 33, (1892).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Java.

niponensis, Lewis ニホンウスチビエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist (7) IV., p. 21, (1899).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

oceanitis, Marseul タイヨウウスチビエムマ
Monogr. Hister., p. 110, t. 8, f. 4, (1855).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Malacca, Philippines, Formosa.

sauterj, Bickhardt ザウタウスチビエムマ
Ent. Blätt. VIII., p. 125, (1912).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

viaticus, Lewis ブチウスチビエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX., p. 33, (1892).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **MICROLOMALUS**, Lewis

vernalis, Lewis チビエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX., p. 35, (1892).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subfamily **HISTERINAE**
Tribe: **TRIBALINI**
Genus **EPIERUS**, Erichson

sauteri, Bickhardt ザウタマグソエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 173, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PAREPIERUS**, Bickhardt

lewisi, Bickhardt レビスマグソエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 173, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TRIBALUS**, Erichson

colombius, Marseul マルマグソエムマ
L'Abeille, I., p. 335, (1864).
Loc. Distr.—Taihōrin, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

punctillatus, Bickhardt ルリマグソエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 174, (1913).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **PLATYSOMINI**
Genus **PLATYSOMA**, Leach
Subgenus **PLATYSOMA**, s. str.

celatum, Lewis コエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII., p. 134, (1884).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

confucii, Marseul コウシコエムマ
Monogr. Hister., p. 404, t. II, f. 9, (1857).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa, China, Philippines, Sumatra, Ceylon.

cribropygum, MARSEUL コウトウコエムマ
L'Abeille, I., p. 302 (1864).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—New Guinea, Formosa.

lewisi, MARSEUL レビスコエムマ
Ann. Soc. Ent. Fr. III., p. 222, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

schenklingi, BICKHARDT シェンクリングコエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 170, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

silvestre, SCHMIDT シルベストリコエムマ
Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, XXXVII., p. 291, (1897).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Sumatra, Formosa.

unicum BICKHARDT タカサゴコエムマ
Ent. Blätt. VIII., p. 124, (1912).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Kôsempo.
Gen. Distr.—Distr.—Formosa.

Subgenus **PLATYLISTER,** LEWIS

atratus, ERICHSON インドコエムマ
in Klug, Jahrb. Ins., p. 110, (1834).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—India, Formosa.

cambodjensis, MARSEUL カンボヂヤコエム
L'Abeille, I., p. 300, (1864).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo, Hoozan, Fuhôshô.
Gen. Distr.—India, Formosa.

horni, BICKHARDT マホルンコエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 169, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu, Taihôrin, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

niponensis, LEWIS ニホンコエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII., p. 398, (1906).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

pini, LEWIS マツコエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII., p. 133, (1884).
Loc. Distr.—Kiirun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subgenus **CYLISTOSOMA,** LEWIS

lineicolle, MARSEUL セスヂコエムマ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 223, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **STERNAULAX,** MARSEUL

? zealandica, MARSEUL ハバビロツヤコエムマ
Monogr. Hister., p. 236 t. 6, f. I, (*Aulacosternus*) (1843).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, New Zealand.

Genus **APOBLETES,** MARSEUL

cerylonoides, BICKHARDT ツヤコエムマ
Ent. Blätt. VIII., p. 123, (1912).
Loc. Distr.—Fuhôshô
Gen. Distr.—Formosa.

schaumi, MARSEUL シヤウムコエムマ
Monogr. Hister., p. 857, t. 2, f. 4, (1860).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

tener, MARSEUL コウシユンコエムマ
Monogr. Hister., p. 859, t. 15, f. 5, (1860).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Philippines, Formosa.

Genus **PLAESIUS,** ERICHSON

javanus, ERICHSON ジヤバエムマ
in Klug, Jahrb. Ins., p. 102, t. 2, f. 1. (1834).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

Tribe: **HISTERINI**

Genus **NICOTIKIS,** MARSEUL

pagana, LEWIS トンキンオホエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X., p. 229, (*Elbisia*) (1902).
Loc. Distr.—Hoosan.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa.

pygmaea, BICKHARDT ホウザンオホエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 170, (1913).

Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Bickhardt ザウタオホエムマ
Ent. Blätt. VIII., p. 124, (*Eblisia*) (1912).
Loc. Distr.—Taihōrinshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PACHYLISTER,** Lewis

chinensis, Quenstedt シナオホエムマ
in Schönherr, Syn. Ins. I., p. 88, t. 2, f. 2. (1806).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

lutarius, Erichson オホオニエムマ
in Klug, Jahrb. Ins., p. 133, (1834).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **SANTALUS,** Lewis

orientalis, Paykull ホリオホエムマ
Monogr. Histeroid., p. 17, t. 13, f. 7, (*Hister*) (1811).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Formosa.

Genus **HISTER,** Linné
Subgenus **ZABROMORPHUS,** Lewis

punctulatus, Wiedemann テンマダラオホエムマ
Zool. Mag. (3) I., p. 162, (1817).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Java, India, Formosa, Japan proper.

Subgenus **HISTER,** s. str.

boleti, Lewis ボレツトオホエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII., p. 135, (1884).
Loc. Distr.—Shinten.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

congener, Schmidt シユミツトオホエムマ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 242, (*Pachylister*) (1885).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

multidens, Schmidt ビルマオホエムマ
Ent. Nachr. XV., p. 94, (1889).

Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

thibetanus, MARSEUL チベツトオホエムマ
Monogr. Hister., p. 412, t. 10, f. 29, (1857).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen Distr.—Assam, Formosa.

Subgenus **MEROHISTER,** REITTER

jekeli, MARSEUL ジエケルオホエムマ
Monogr. Hister., p. 417, t. 10, f. 62, (1857).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Subgenus **GRAMMOSTETHUS,** LEWIS

curvicollis, BICKHARDT ムネマルオホエムマ
Ent. Mitteil. II., p. 172, (1913).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

niponicus, LEWIS ヤマトホエムマ
Ent. Monthl. Mag. XXXI., p. 188, (1895).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper, Amur.

Subgenus **PERANUS,** LEWIS

depistor, MARSEUL マシユールオホエムマ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 224, (1873).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subgenus **ATHOLUS,** THOMSON

coelestis, MARSEUL シヨウテンオホエムマ
Monogr. Hister., p. 416, t. 10, f. 59, (1857).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, China, India, Ceylon.

duodecimstriatus, SCHRANK ジウニスヂオホエムマ
Enum. Ins. Austr., p. 39, (1781).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Europe, Siberia, Japan proper, Formosa.

philippinensis, MARSEUL フイリツピンオホエムマ
Monogr. Hister., p. 547, t. 9, f. 118, (1854).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihôrin.
Gen. Distr.—Philippines, Borneo, Formosa.

pirithous, MARSEUL ヒゼンオホエムマ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 224, (1873).
Loc. Distr.—Taihôrin, Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **EXOSTERNINI**

Genus **NOTODOMA,** LACORDAIRE

bullatum, MARSEUL セマルエムマ
Ann. Soc. Ent. Belg. XIII., p. 103, (1870).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Malacca, Formosa.

formosanum, BICKHARDT チヤイロセマルエムマ
Ent. Blätt. VIII., p. 126, (1912).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Taihôrinsho.
Gen. Distr.—Formosa.

fungorum, LEWIS キノコセマルエムマ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII., p. 136, (1884).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **ANAGLYMMA,** LEWIS

circularis, MARSEUL チビセマルエムマ
L'Abeille, L., p. 286, (*Macrosternus*) (1864).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa

Genus **CYPTURUS,** ERICHSON

aenescens, ERICHSON カラカネセマルエムマ
in Klug, Jahrb. Ins. L., p. 126, t. 2, f. 3, (1834).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—India, Formosa.

NIPONIDAE 細閉鬼蟲科

Genus **NIPONIUS,** LEWIS

impressicollis, LEWIS エグリホソエムマ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 333, T. VIII, f. 1-11, (1885).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

canalicollis, LEWIS ムネミゾホソエムマ
Ann. Nat. Hist. VIII., p. 370, (1901).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Division II. CLAVICORNIA 球角族

OSTOMIDAE 穀盜科

(*Trogositidae*)

Genus **TENEBRIOIDES,** PILLER

mauritanicus, LINNÉ コクヌスツト
Syst. Nat. X., 1, p. 417, (*Trogosita*) (1758).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **LOPHOCATERES,** OLLIFF

pusillus, KLUG インドコクヌスツト
Akad. Wiss. Berl., p. 159, (*Pe[illegible]*) (1832).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, India, Madagascar.

Genus **ANCYRONA,** REITTER

marginata, GROUVELLE フチトリコクヌスツト
Arch. Naturg., A. 11, p. 46, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LFPERINA,** ERICHSON

regularis, GROUVELLE セマダラサビコクヌスツト
Aach. Naturg., A. 11, p. 46, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

HELOTIDAE 大木吸科

Genus **HELOTA,** MAC LEAY

helleri, RITSEMA ヘレルオホキスヒ (ホシミドリオホキスヒ)
Not. Leyd. Mus. XXXIV., p. 51, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

feae ab. **mushana,** OHTA ムシヤオホキスヒ
Ins. Mats. III., Nos. 2 & 3, p. 109, (1929).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwana, OHTA タイワンオホキスヒ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 66, (1929).

Loc. Distr.—Musha, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

sonani, OHTA ソナンオホキスヒ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 67, (1929).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.– Formosa.

montana, OHTA ミヤマオホキスヒ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 68, (1929).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

semifulva, RITSEMA キバラオホキスヒ
Not. Leyd. Mus. III., p. 80, (1881).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

sinensis, OLIFF シナオホキスヒ
Cist. Ent. III., 54, t. 3, f. 3, (1883).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

thoracica, RITSEMA ヘイトウオホキスヒ
Not. Leyd. Mus. XVII., p. 49, (1896).
Loc. Distr.—Heitô.
Gen. Distr.—Thibet, Formosa.

oberthuri, RITSEMA オベルチユールオホキスヒ
Not. Leyd. Mus. XI., p. 100, (1889).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—Formosa, Darjeeling.

Genus **NEOHELOTA,** OHTA

tumaaka, OHTA ツマアカオホキスヒ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 62, (1929).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

miwai, OHTA ミワオホキスヒ
Ins. Mats. V., No. 3, p. 136, (1931).
Loc. Distr.—Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa.

NITIDULIDAE 尾木吸科

Subfamily **NELIGETHINAE**

Genus **PRIA,** STEPHENS

elegans, GROUVELLE カバイロケシヲキスヒ
Arch. Naturg., LXXIX., A. 11, p. 37, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **CARPOPHILINAE**

Genus **BRACHYPEPLUS**, Erichson

amplus, Grouvelle オホヒラタデヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 34, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ITHYPHENES**, Murray

sauteri, Grouvelle ザウタヒラタデヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 35, (1913).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ARPOPHILUS**, Stephens

humeralis var. **foveicollis**, Murray カタアカデヲキスヒ
Monogr. Nitid., p. 344, (1864).
Loc. Distr.—Hokuto, Kôsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Tropical Africa, Madagascar, Seychelles, India, Formosa.

marginellus, Motschulsky ヘリウスデヲキスヒ
Etud. Ent., p. 40, (1858).
Loc. Distr.—Hokuto.
Gen. Distr.—Formosa, China, India, Madagascar.

funereus, Murray インドデヲキスヒ
Monogr. Nitid., p. 358, (1864).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, India.

calybaeus, Murray ヴグロデヲキスヒ
Monogr. Nitid., p. 369, (1864).
Loc. Distr.—Kôsempo, Shis.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper, Siberia.

obsoletus, Erichson コメノケシキスヒ
Germ. Zeitschr. IV., p. 259, (1843).
Loc. Distr.—Banshoryô.
Gen. Distr.—Madagascar, India, China, Formosa.

hemipterus, Linné ツマアカデヲキスヒ
Syst. Nat. ed. XII, I., 2, p. 565, (*Dermestes*) (1767).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Europe, Formosa, North America.

dimidiatus var. **mutilatus**, Erichson ホソバデヲキスヒ變種
Germ. Zeitschr. IV., p. 258, (1843).
Loc. Distr.—Anping, Tainan.
Gen. Dist.—Cosmopolite.

dimidiatus var. **contingens,** WALKER

Ann. Nat. Hist. (3) II., p. 206, (*Nitidula*) (1858).

Loc. Distr.—Anping.

Gen. Distr.—Cosmopolite.

pilosellus, MOTSCHULSKY ムクゲデヲキスヒ

Etud. Ent. VII., p. 4 , (1858).

Loc. Distr.—Anping.

Gen. Distr.—Formosa, India, Tonkin, Japan proper, New Caledonia.

Subfamily **NITIDULINAE**

Genus **TRIMENUS,** MURRAY

adpressus, MURRAY カバイロヒラタヲキスヒ

Monogr. Nitid., p. 406, ♂, t. 36, f. 4, (1864).

Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Lokkiri.

Gen. Distr.—Formosa, Malay archipelago, India, Indo-China, Japan proper.

Genus **HAPTONCUS,** MURRAY

luteolus, ERICHSON キイロケシヲキスヒ

Germ. Zeitschr. IV., p. 272, (*Epuraea*) (1843).

Loc. Distr.—Anping, Hokuto, Kôsempo.

Gen. Distr.—Tropical and Subtropical region.

motschulskyi, REITTER モヲチユルスキイケシヲキスヒ

Syst. Einteil. Nitid., p. 29, (1873).

Loc. Distr.—Kôsempo.

Gen. Distr.—China, India, Indo-China, Formosa.

oculalis, FAIRMAIRE モンケシヲキスヒ

Rev. Zool. (2) I., p. 363, sep. cal. Polynésie. p. 28, (*Epuraea*) (1849).

Loc. Distr.—Taihoku.

Gen. Distr.—East Africa, Madagascar, India, Ceylon, Indo-China, Formosa, Japan proper, Hawaii.

Genus **AMYSTROPS,** GROUVELLE

epuraeoides, GROUVELLE コウセンヲキスヒ

Arch. Naturg., A. 11, p. 38, (1913).

Loc. Distr.—Kôsempo.

Gen. Distr.—Formosa.

formosana, GROUVELLE タイワンケシヲキスヒ

Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 39, (1913).

Loc. Distr.—Kôsempo.

Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EPURAEA,** ERICHSON

paulula, REITTER ウスキケシヲキスヒ
Syst. Eintheil. Nitid., p. 26, et 36, (1873).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

consanguinea, GROUVELLE クロアカケシヲキスヒ
Arch. Naturg., A. 11, p. 41, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Shis.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STELIDOTA,** ERICHSON

multiguttata, REITTER セマダラヲキスヒ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXI., p. 110, (1877).
Loc. Distr.—Koroton, Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, India.

Genus **IPIDIA,** ERICHSON

variolosa var. **latior,** GROUVELLE セスヂウスバヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 41, (1913).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PROMETOPIA,** ERICHSON

quadrimaculata, MOTSCHULSKY ヨツモンツヤヲキスヒ
Bull. Moscou, XXXVI., I. p. 440, (1863).
Loc. Distr.—Anping, Taihôrin.
Gen. Distr.—India, Burma, Cochin-China.

Genus **PARAMETOPIA,** REITTER

rotundata REITTER マルツヤヲキスヒ
Not. Leyd. Mus., p. 75, (*Prometopia*) (1881).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Sumatra, Formosa.

x-rubrum, REITTER ハスモンツヤヲキスヒ
Wien. Ent. Zeit. III., p. 262, (1884).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

Genus **MEGAUCHENIA,** MAC LEAY

quadricollis, REITTER ツツガタヲキスヒ
Not. Leyd. Mus. V., p. 10, (*Ischaena*) (1883).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—India, Burma, Formosa.

angustata, Erichson マルクビヲキスヒ
in Germ. Zeitschr. IV., p. 288, (1843).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa, India.

Genus **AMPHICROSSUS,** Erichson

discolor, Erichson ムモンヲキスヒ
in Germ. Zeitschr. IV., p. 348, (1843).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **POCADITES,** Reitter

sauteri, Grouvelle ザウタヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 43, (1913).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CYLLODES,** Erichson

dorsalis, Reitter フタモンセマルヲキスヒ
Wien. Ent. Zeit. III., p. 268, (*Strongylus*) (1884).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

trigrinus, Grouvelle タイワンセマルヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 44, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

multimaculatus, Grouvelle クロモンベニセマルヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 45, (1913).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TRICANUS,** Erichson

sauteri, Grouvelle キムネキノコヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 46, (1913).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LASIODACTYLUS,** Perty

pictus, Mac Leay セマダラヲキスヒ
Annulosa Javanica, p. 40, (*Nitidula*) (1825).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Madagascar, Bourbon, India, Malay, Sunda Islands, Formosa.

inaequalis, Grouvelle コブバネヲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 42, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **CRYPTARCHINAE**

Genus **GLISCHROCHILUS,** Reitter

japonius, Motschulsky タイシヨウヲキスヒ (タイシヨウムシ, ヨヲボシケシキスヒ)
Etud. Ent. VI., p. 28, (1857).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper, China.

CUCUJIDAE 扁蟲科

Subfamily **CUCUJINAE**

Tribe: **ULEIOTINI**

Genus **ULEIOTA,** Latreille

crenicollis, Grouvelle フチバヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 57, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CUCUJINI**

Genus **CUCUJUS,** Fabricius

imperialis, Lewis アヲサムヒラタムシ
Ent. Monthl. Mag. XV., p. 234, (1879).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Assam.

coccinatus, Lewis ベニヒラタムシ
Ent. Monthl. Mag. XVII., p. 198, (1881).
Loc. Distr.—Nôkô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **INOPEPLINI**

Genus **INOPEPLUS,** Smith

sauteri, Grouvelle コバネヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 58, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin, Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **LAEMOPHLOEINI**

Genus **LAEMOPHLOEUS,** Castelnau

admotus, Grouvelle ホソケシヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 59, (1913).

Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, GROUVELLE タイワンケシヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 60, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

ferrugineus, STEPHENS アカケシヒラタムシ
Ill. Brit. Ent. Mand. IV., p. 223, (1831).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

humeralis, GROUVELLE カタウスケシヒラタムシ
Ann. Mus. Genova, XVIII., p. 283, t. 7, f. 10, (1883).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—New Guinea, Aru, [illegible]kan, Salvatty, Formosa.

foveolatus, REITTER エクボケシヒラタムシ
Col. Hefte VI., p. 52, (1876).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

laevior, REITTER コウシュンケシヒラタムシ
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXIV., p. 518, (1874).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

minutus, OLIVIER チビケシヒラタムシ
Encycl. Méth. VI., p. 243, (*Cucujus*) (1791).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

subtestaseus, GROUVELLE ウスキケシヒラタムシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Genova, XVIII., p. 284, t. 7, f. II. (1883).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—New Guinea, Ceylon, Singapore, Sumatra, Formosa.

testaceus, FABRICIUS キイロケシヒラタムシ
Mant. Ins. I., p. 166, (*Cucujus*) (1787).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Subfamily **PASSANDRINAE**

Genus **HECTARTHRUM,** NEWMAN

tenuicorne, GROUVELLE アカツヤホソヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 53, (1913).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

rhizophagoides, WALKER ニセコクヌスヴト
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 53, (*Trogosita*) (1858).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—East Africa, Ceylon, Celebes, Timor, New Guinea, Formosa.

Subfamily **ANCISTRIINAE**

Genus **ANCISTRIA,** ERICHSON

emarginata, GROUVELLE エグリホソヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 56, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, GROUVELLE ザウタホソヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 54, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin, [illegible]hōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **SILVANINAE**

Tribe: **SILVANINI**

Genus **SILVANUS,** LATREILLE

bidentatus, FABRICIUS フタバコナヒラタムシ
Ent. Syst. I., p. 233, (*Dermestes*) (1792).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Africa, Palaearctic Region, East India, Formosa, North America.

birmanicus, GROUVELLE ビルマコナヒラタムシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2) XII, (XXXII)., p. 863, (1892).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Burma, Sumatra, Formosa.

lateritius, REITTER フトヘリコナヒラタムシ
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXVIII., p. 194, (1876).
Loc. Distr.—Taihōrin, Sokutsu, Suisharyō.
Gen. Distr.—Sumatra, Burma, Ceylon, Annan, Andaman, India, Formosa.

lewisi, REITTER レビスコナヒラタムシ
Col., Hefte XV., p. 57, (1876).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Japan, China, Formosa, East India, Tennasserim, Madagascar.

Genus **SILVANOPHUS,** REITTER

javanicus, GROUVELLE ジャバコナヒラタムシ
Not. Leyd. Mus. VII., p. 48, t. 4, f. 2, (*Silvanus*) (1885).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—East Africa, Madagascar, Assam, Malay, Malacca, China, Formosa.

fagi, GUÉRIN-MÉNÉVILLE アカコナヒラタムシ
Icon. Reg. Anim., p. 127, (1829-44).
=*similis*, ERICHSON, Naturg. Ins. Deutschl. III., p. 339, (1845).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—Europe, East Siberia, Formosa.

longicollis, REITTER ..ネナガコナヒラタムシ
Col., Hefte XV. p. 60, (*Silvanus*) (1876).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, East India, China, Java, Formosa.

scuticollis, WALKER ミヅカドコナヒラタムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III., p. 53, (*Silvanus*) (1859).
=*triangulus*, REITTER, Col. Hefte, XV., p. 60, (1876).
Loc. Distr.—Akau, Taihôrin.
Gen. Distr.—East Africa, Madagascar, East India, Ceylon, Maley archipelago, Sumatra, Formosa Japan, Antill, Grenada, Guadeloupe, St. Vincent.

Genus **AHASVERUS,** GOZIS

advena, WALTL セマルコナヒラタムシ
Faunus I., p. 169, (*Caihartus*) (1832).
Loc. Distr.—Anping, Kôsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **ORYZAEPHILUS,** GANGLBAUER

surinamensis, LINNÉ コナヒラタムシ
Syst. Nat. Ed. X., p. 357, (*Dermestes*) (1758).
Loc. Distr.—Taihôku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **MONANUS,** SHARP

concinnulus, WALKER ホソクビマルヒラタムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 207, (*Monotoma*) (1858).
=*signatus*, FRAUENFELD, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XVIII., p. 438, t, 12, f. 28, (*Silvanus*) (1867).
Loc. Distr.—Anping, Kôsempo.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

discoidalis, GROUVELLE フイリヅビンマルヒラタムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXI., p. 366, 370, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Tribe: **PSAMMOECINI**

Genus **PSAMMOECUS,** LATREILLE

stultus, GROUVELLE クロオビセマルヒラタムシ
Not. Leyd. Mus. XXXIV., p. 81, (1912).

Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

x-notatus, GROUVELLE ハスモンセマルヒラタムシ
Not. Leyd. Mus. XXXIV., p. 84, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **MONOTOMINAE**

Genus **MONOTOMA,** HERBST

picipes, HERBST サビアシコナヒラタムシ
Käf. V., p. 24, t. 46, f. 2, (1793).
Loc. Distr.—Kamagawa.
Gen. Dist.—Europe, Asia, North America, Canaly Island, St. Helena.

Genus **MIMEMODES,** REITTER

carenifrons, GROUVELLE トサカヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 62, (1913).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

proximus, GROUVELLE カマガワヒラタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 63, (1913).
Loc. Distr.—Kamagawa.
Gen. Distr.—Formosa.

EROTYLIDAE 大蕈食科

Tribe: **EROTYLINI**

Genus **AULACOCHILUS,** LACORDAIRE

janthinus, LACORDAIRE ルリオホキノコムシ
Mon. Erotyl., p. 250, (1842).
Loc. Distr.—Arisan, Kôshun, Horisha.
Gen. Distr.—Java, Malacca, Formosa.

luniferus, GUÉRIN-MÉNÉVILLE ハスヂオホキノコムシ
Rev. Zool., p. 156, (1841).
Loc. Distr.—Gyochi, Shinchiku, Kwarenkô, Baibara, Horisha, Arisan.
Gen. Distr.—Java, Sumatra, Borneo, Penang, Formosa.

quadripustulatus, FABRICIUS タイワンヨツボシオホキノコムシ
Syst. El. II., p. 6, (1801).
Loc. Distr.—Kôshun (after Kano).
Gen. Distr.—Sumatra, Java, Ceylon, Malacca, Burma, Formosa.

Tribe: **ENCAUSTINI**

Genus **ENCAUSTES,** Lacordaire

montana, Schenkling ミヤマオホキノコムシ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 2, p. 83, (1919).
Loc. Distr.—Takao, Baibara, Rengechi.
Gen. Distr.— Formosa.

cruenta, Mac Leay ムネモンオホキノコムシ
Ann. Javan., p. 42, (1825).
Loc. Distr.—Koshun (after Kano).
Gen. Distr.—Cambodja, Penang, Burma, North Borneo, Sumatra, Java, Formosa.

Genus **MICRENCAUSTES,** Crotch

lunulata, Mac Leay
Ann. Javan., p. 42, (*Engis*) (1825).
Loc. Distr.—Koshun (after Kano).
Gen. Distr.—Java, Borneo, Sumatra, Burma, Formosa.

Tribe: **TRIPLACINI** Crotch

Genus **AMBLYOPUS,** Lacordaire

vittatus, Olivier コウシュンオホキノコムシ
Entom. V., p. 490, t. I, f. 2, (*Triplax*) (1807).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara, Kuraru, Kuraru, Garambi, Taihoku.
Gen. Distr.—Bengal, Burma, Penang, Ceylon, Borneo, Sumatra, Java, Formosa.

vittatus var. **interruptus,** Miwa
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., 101, p. 124, (1929).
Loc. Distr.—Horisha, Tainan, Musha, Baibara.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **PETALOSCELIS,** Gorham

rubens, Hope アシグロアカオホキノコムシ
in Gray's Zool. Misc., p. 31, (*Erotylus*) (1831).
Loc. Distr.—Ako (after Kano).
Gen. Distr.—Java, Darjeeling, Bengal, Nepaul, Tonkin, Formosa.

Genus **CYRTOMORPHUS,** Lacordaire

bengalensis, Guérin-Méneville ベンガルオホキノコムシ
Rev. Zool., p. 153, (1841).
Loc. Distr.—Kôtôsho?
Gen. Distr.—Bengal, Java, West Borneo, Formosa.

moultoni, Kuhnt ムルトンオホキノコムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 234, f. 6, (1910).

Loc. Distr.—Kōtōsho?
Gen. Distr.—West Borneo, Formosa.

Genus **TRITOMA,** FABRICIUS

atripennis, KUIENT クロバネオホキノコムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 631, (1908).
Loc. Distr.—Taitō.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa.

Genus **TRIPLAX,** HERBST

apicata, CROTCH シリゲロキイロオホキノコムシ
Rev. Fam. Erotyl., p. 91, (1876).
Loc. Distr.—Makazaya[illegible]a (after Kano).
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **NEOTRIPLAX,** LEWIS

arisana, MIWA アリサンオホキノコムシ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa XIX., 101. p. 124, (1929).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SPONDOTRIPLAX,** CROTCH

endomychoides, CROTCH テントウガタオホキノコムシ
Rev. Fam. Erotyl., p. 94, (1876).
Loc. Distr.—Kōtōsho?
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

Tribe: **DACNINI**

Genus **COPTENGIS,** CROTCH

melvillei, WATERHOUSE メルビユオホキノコムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX., p. 383, (1887).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—New Guinea, Formosa.

Genus **TRICHUOLUS,** BEDEL

pubescens, CROTCH ニジウニホシクリイロオホキノコムシ
Rev. Fam. Erotyl., p. 30, (*Triplatoma*) (1876).
Loc. Distr.—Arisan (after Kano).
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **HYBOSOMA**, Gorham

striatus, Gorham セスヂオホキノコムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 78, (1883).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **TRIPLATOMA**, Westwood

macleayi, Lacordaire マヅクリイオホキノコムシ
Mon. Erotyl., p. 47, (1842).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Celeves, Borneo, Malacca, Sumatra, Penang, Formosa.

Genus **EPISCAPHA**, Lacordaire

fortunei, Crotch フオルチユンオホキノコムシ
Ent. Monthl. Mag. IX., p. 188, (1873).
Loc. Distr.—Taihôku, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Chiua, Himalaya, Formosa.

taishoensis, Lewis タイシヨウオホキノコムシ
Ent. Monthl. Mag. XI., p. 79, (1874).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Funkiko.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

quadrimacula, Wiedeman コウトウヨツボシオホキノコムシ
Zool. Mag. II., 1, p. 132, (*Engis*) (1823).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—Java, Borneo, Sumatra, Formosa.

quadrimacula septentrionus, Heller
Arch. Naturg. LXXXIV., p. (1920).
Loc. Dister.—Banshyoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EPISCAPHULA**, Crotch

andamanensis, Gorham アンダマンオホキノコムシ
Not. Leyd. Mus. X., p. 141, (1888).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Andaman, Formosa.

hislopi, Crotch ヒスロプオホキノコムシ
Rev. Fam. Erotyl., p. 36, (1876).
Loc. Distr.—Tainan, Rônô.
Gen. Distr.—India, Perak, Burma, Formosa.

philippinarum, Lacordaire フイリツピンオホキノコムシ
Mon. Erotyl., p. 55, (1842).

Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Manila, Penang, Malacca, Sarawak, Formosa.

Genus **MEGALODACNE**, Crotch

bellula, Lewis ヒメオホキノコムシ
Ent. Monthl. Mag. (5) XX., p. 139, (1883).
Loc. Distr.—Taipin, Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

luteoguttata, Crotch ウスモンヒメオホキノコムシ
Rev. Fam. Erotyl., p. 41, (1876).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Sumatra, Formosa.

LANGURIIDAE 擬叩頭科

Subfamily LANGURIINAE

Genus **PACHYLANGURIA**, Crotch

collaris, Crotch ミツテンコメツキモドキ
Cist. Ent. I., 1869-76, p. 377, (1876).
Loc. Distr.—Very Common.
Gen. Distr.—Darjiling, Assam, Burma, Formosa.

elongata, Fabricius クビアカコメツキモドキ
Sist. El. I., p. 152, (*Trogosita*) (1801).
Loc. Distr.—Taito, Arisan, Raisha, Kappanzan.
Gen. Distr.—Singapore, Penang, Bengal, Java, Assam, Formosa.

elongata pyramidata, Mac Leay
Anul. Javan., p. 44, (*Languria*) (1825).
Loc. Distr.—Kwarenko, Musha, Shinchiku, Ryohen, Taiheizan, Kôshun, Kusukusu, Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Singapore, Penang, Bengal, Assam, Java, Formosa.

paivae, Wollaston ヨツテンコメツキモドキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV., p. 430, (*Languria*) (1895).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—North China, Formosa.

milis, Fowler ホソコメツキモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 7, p. 134, (*Tetralanguria*) (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PENTALANGURIA**, Crotch

notopedalis, Crotch オホルリコメツキモドキ
Cist. Ent. I., 1869-76, p. 380, (1876).

Loc. Distr.—Rōnō.
Gen. Distr.—Himalaya, Formosa.

Genus **TETRALANGUROIDES**, Fowler

sauteri, Fowler ルリコメツキモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 7, p. 133, (1913).
Loc. Distr.—Funkiko, Rantaizan, Taiheizan, Kyuhabon, Rokkiri, Musha, Horisha, Arisan, Shinchiku, Kwarenkō.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri var. **simplex**, Fowler
Arch. Naturg. LXXIX., A. 7, 134, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin, Taihōrinshō, Suisha.
Gen. Distr.—Formosa.

mouhoti, Crotch ツマグロコメツキモドキ
Cist. Ent. I., 1869-76, p. 379, (*Languriosoma*) (1876).
Loc. Distr.—Rōnō.
Gen. Distr.—Laos, Sikkim, Burma, Tenasserim, Penang, Borneo, Formosa.

viator, White ヒラアシコメツキモドキ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 13, (1850).
Loc. Distr.—Rōnō.
Gen. Distr.—Sikkim, Assam, Burma, Tenasserim, Siam, Andaman, Nicobar, Sumatra, Formosa.

Genus **CALLILANGURIA**, Crotch

luzonica, Crotch マルムネコメツキモドキ
Cist. Ent. I., 1869-76, p. 381, (1876).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Luzon, Formosa.

Genus **PERILANGURIA**, Fowler

sauterana, Fowler ヒメコメツキモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., A, 7, p. 135, (1913).
Loc. Distr.—Kōshun, Taihōrin, Suisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ANADASTUS**, Gorham

angustior, Fowler ホソヒメコメツキモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., p. 137, (1913).
Loc. Distr.—Shinchiku, Musha, Horisha, Akau, Kankau,
Gen. Distr.—Formosa.

filiformis, FABRICIUS キイロコメツキモドキ
Syst. El. I., p. 152, (*Trogosita*) (1801).
Loc. Distr.—Musha, Horisha, Kwarenkō, Taitō, Kōshun.
Gen. Distr.—Burma, Siam, Tonkin, South China, Philippines, Java, Borneo, Sumatra, Japan proper, Formosa.

formosanus, FOWLER タカサゴコメツキモドキ
Arch. Natur. LXXIX., A. 7, p. 136, (1913).
Loc. Distr.—Shinchiku, Musha, Horisha, Raisha, Kwarenkō, Kanshirei, Rōnō, Taitō, Tompo, Kizan, Kōshun, Garampi, Chikutōki, Suisharyō, Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

robustior, FOWLER フトヒメコメツキモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 7, p. 136, (1913).
Loc. Distr.—Shinchiku, Tompo, Musha, Sokutsu, Banshoryō, Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

insularis, HAROLD コガタノコメツキモドキ
Mitth. Munch. Ent. Ver. III., p. 86, (*Languria*) (1879).
Loc. Distr.—Shinchiku, Tabo, Arisan, Horisha, Musha, Kwarenkō.
Gen. Distr.—New Guinea, Formosa.

kankaui, FOWLER チビコメツキモドキ
Arch. Naturg. LXXIX, A. 7, p. 138, (1913).
Loc. Distr.—Shinchiku, Musha, Kwarenkō, Taitō, Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa.

melanosternus, HAROLD コチビコメツキモドキ
Mitth. Münch. Ent. Ver. III., p. 82, (*Languria*) (1879).
Loc. Distr.—Shinchiku, Musha, Kōshun, Taitō.
Gen. Distr.—Ceylon, Assam, Burma, Siam, Tenasserim, Singapore, Formosa.

Genus **CAENOLANGURIA,** GORHAM

capitalis, HAROLD ヴグロツヤコメツキモドキ
Mitth. Münch. Ent. Ver. III., p. 87, (*Languria*) (1879).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Formosa, Celebes.

nilgirensis, GORHAM クビアカツヤコメツキモドキ
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII., p. 340, (1903).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Nilgiri, Formosa.

Genus **MACROMELA,** HOPE

longicornis, WIEDEMANN ヒゲナガコメツキモドキ
Zool. Mag. II., p. 48, (*Languria*) (1823).
Loc. Distr.—Kanshirei.
Gen. Distr.—South India, Ceylon, Cambodja, Penang, Formosa.

Subfamily **CLADOXENINAE**

Genus **MICROLANGURIA**, Lewis

jansoni, Crotch ケシコメツキモドキ
Ent. Monthl. Mag. IX., 1872-72, p. 185, (*Languria*) (1873).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.— South India, China, Ceylon, Borneo, Formosa, Japan proper.

Genus **PARACHADOXENA**, Fowler

trifoliata, Fowler チヤイロハナコメツキモドキ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 311, t. 3, f. 10, a. (1886).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, South India, Formosa.

CRYPTOPHA[illegible]DAE 木吸蟲科

(*Telmatophilidae*)

Genus **LOBERUS**, Le Conte

marginicollis, Grouvelle フチトリキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 64, (*Glisonotha*) (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TORAMUS**, Grouvelle

formosianus, Grouvelle タイワンキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 66. (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

DIPHYLLIDAE 菌木吸科

Genus **DIPHYLLUS**, Stephens

flexuosus, Reitter ホウザンムクゲキスヒ
Wien. Ent. Zeit. VIII., p. 300, (1889).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

formosianus, Grouvelle ウスキムクゲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 67, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

schenklingi, Grouvelle シエンクリングムクゲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 68, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, GROUVELLE ザウタムクゲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 70, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

medius, GROUVELLE タイホリンムクゲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 72, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CRYPTOPHILUS,** REITTER

ceylonicus, MOTSCHULSKY セイロンケシムクゲキスヒ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX., p. 396, (1866).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

propinquus, REITTER キナガケシムクゲキスヒ
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXIV., p. 382, (1874).
Loc. Distr.—Alikang, Taihôrin, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

minimus, GROUVELLE コウセンケシムクゲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 72, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

mirus, GROUVELLE ハナケシムクゲキスヒ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 73, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

LATHRIDIIDAE 姫蕈蟲科

Genus **CORTICARIA,** MARSHAM

fasciata, REITTER オビヒメマキムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXII., p. 115, (1877).
Loc. Distr.—Kamagawa.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **MELANOPHTHALMA,** MOTSCHULSKY

americana, MANNERHEIM ケシヒメマキムシ
Germ. Zeitschr. Ent. V., p. 50, (*Corticaria*) (1844).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—North America, Formosa.

fuscula, GYLLENHAL ウスグロヒメマキムシ
Ins. Suec. IV., p. 133, (*Lathridius*) (1827).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Palaearctic region, Venezuela, Columbia, Usambara, Formosa.

MYCETOPHAGIDAE 小蕈蟲科

Genus **LITARGUS**, Erichson

lewisi, Reitter レビスコキノコムシ
Wien. Ent. Zeit. VIII., p. 246, (1889).
Loc. Distr.—Taihoku, Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **MYCETOPHAGUS**, Hellwig

hilleriana, Reitter アカマダラコキノコムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXI., p. 116, (*Tritoma*) (1877).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, Grouvelle フタオビコキノコムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 75, (1913).
Loc. Distr.—Hoozan, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TYPHAEA**, Stephens

haagi, Reitter ハーグコキノコムシ
Verhand. Zool.-Bot. Ges. Wien, XXIV., p. 527, (1874).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Siam, Formosa.

stercorea, Linné コキノコムシ
Syst. Nat. ed. 10., p. 357, (*Dermestes*) (1758).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

COLYDIIDAE 細堅蟲科

Subfamily **COLYDIINAE**

Tribe: **SYNCHITINI**

Genus **BITOMA**, Herbst

parallera, Sharp ホソカタムシ
Journ. Linn. Soc. XIX., p. 70, 122, t. 6, f. 5, (1885).
Loc. Distr.—Suisharyo, Hoozan, Kankau, Taihorin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Philippines, Ceylon, Reunion, Margueas Islands, Madagascar, Nossi-Be, Spain, Guinea.

Genus **COLOBICUS**, Latreille

parilis, Pascoe タイワンホソカタムシ
Journ. Ent. I., p. 202, (1860).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Tainan, Kōshun.
Gen. Distr.—Tropical Asia (Oriental region), Hawaii.

Tribe: **COXELINI**

Genus **TRACHYPHOLIS**, Erichson

ornata, Grouvelle コブスヂオホホソカタムシ
Not. Leyd. Mus. XXXIII., p. 132, 156, (1911).
Loc. Distr.—Sokutsu, Taihōrin, Kōsempo, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MICROVONUS**, Sharp

sauteri, Grouvelle ザウタヒメホソカタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 47, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **PYCNOMERINI**

Genus **PYCNOMERUS**, Erichson

sculpturatus, Sharp エグリホソカタムシ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XIX., p. 77, (1885).
Loc. Distr.—Taihōrin, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **GEMPYLODINI**

Genus **GEMPYLODES**, Pascoe

lewisi, Sharp クロナガホソカタムシ
Journ. Linn. Soc. Lond. XIX., p. 72, t. 3, f. 5, (1885).
Loc. Distr.—Taihōrin, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subfamily **CERYLONINAE**

Tribe: **DERETAPHRINI**

Genus **ASOSYLUS**, Grouvelle

sauteri, Grouvelle ザウタナガホソカタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 50, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **METOPIESTES**, Pascoe

striolatus, Grouvelle スヂホソカタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 49, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **BOTHRIDERINI**

Genus **BOTHRIDERES,** ERICHSON

bituberculatus, REITTER フタコブホソカタムシ
Stett. Ent. Zeit. XXXVIII., p. 347, (1877).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

bifossulatus, GROUVELLE コウセンホソカタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 52, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, GROUVELLE ホウザンホソカタムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 51, (1913).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EROTYLATHRIS,** MOTSCHULSKY

costatus, SHARP セスヂホソカタムシ
Journ. Linn. Soc. Lond. XIX., p. 75, t. 3, f. 8, (1885).
Loc. Distr.—Sokutsu, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PSEUDOBOTHRIDES,** GROUVELLE

velatus, GROUVELLE ニセホソカタムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXVII., p. 441, 443, t. 9, f. 6, (1908).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Subfamily **EUXESTINAE**

Genus **EUXESTUS,** WOLLASTON

parki, WOLLASTON パークホソカタムシ
Ann. Mat. Nat. Hist. (3) II., p. 413, (1858).
Loc. Distr.—Taihôrin, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, Madeira.

ENDOMYCHIDAE 偽瓢蟲科

Subfamily **MYCETAEINAE**

Tribe: **MYCETAEINI**

Genus **ASYMBIUS,** GORHAM

crinipes, GORHAM ケアシテントウダマシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XVI., p. 299, (1896).
Loc. Distr.—Kôsempo, Hoozan, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Burma.

Subfamily **TROCHOIDEINAE**

Genus **TROCHOIDES**, Westwood

desjardinsi, Guérin-Méneville シロアリチビテントウダマシ
Rev. et Mag. Zool., p. 22, (1838).
Loc. Distr.—Kôtôsho (after Kano).
Gen. Distr.—South Asia, East Africa.

Subfamily **ENDOMYCHINAE**

Tribe: **EUMORPHINI**

Genus **EUMORPHUS**, Weber

marginatus, Fabricius コウトウセダカテントウダマシ
Syst. El. II., p. 12, (1801).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, J[illegible], Sumatra, Borneo, Malay, Tenasserim.

pulchripes, Gerstäcker ヨツボシセダカテントウダマシ
Arch. Naturg. XXIII., p. 228, (1857).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

4-guttatus var. **formosanus**, Pic ヨツモンセダカテントウダマシ
Mélanges, LV., p. 8, (1930).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **BRACHYTRYCHERUS**, Arrow

madurensis, Arrow インドヨツボシテントウダマシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 14, (1920).
Loc. Distr.—Taiheizan (after Kano).
Geu. Distr.—India, Formosa.

Genus **PEDANUS**, Gerstäcker

gerstaeckeri, Gorham ヨツマルモンオホテントウダマシ
Endomycici recit., p. 37, f. 5, (1873).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Malacca.

Tribe: **LYCOPERDININI**

Genus **INDALMUS**, Gerstäcker

kirbyanus, Latreille コウシュンヨツボシテントウダマシ
Gen. Crust. et Ins. III., p. 72, (*Eumorphus*) (1807).
Loc. Distr.—Kuraru (after Kano).
Gen. Distr.—India, Burma, Timor, Formosa.

Genus **ANCYLOPUS,** COSTA

indicus, GORHAM クビアカテントウダマシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 312, (1875).
Loc. Distr.—Baibara (after Kano).
Gen. Distr.—India, Formosa.

melanocephalus, OLIVIER カメノコテントウダマシ (ヨツボシテントウダマシ)
Ent. VI., p. 1073, nr. 3, t. I, f. 3, ♂, (*Endomychus*) (1808).
Loc. Distr.—Taihōku.
Gen. Distr.—South Asia, East Africa, Sicilia, Italia.

melanocephalus var. **pictus,** WIEDEMAN
Zool. Mag. II., 1, p. 78, (1823).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—South Asia.

Genus **LYCOPER[illegible]NA,** LATREILLE

mandarinea, GERSTÄCKER セグロホソテントウダマシ
Monogr. Endomych., p. 212, (1858).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—China, Formosa.

dux, GORHAM フチトリホソテントウダマシ
Ent. Monthl. Mag. IX., p. 205, (1873).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **SAULA,** GERSTÄCKER

japonica, GORHAM ヤマトキイロテントウダマシ
Ent. Monthl. Mag. X., p. 224, (1874).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

nigripes, GERSTÄCKER アシグロキイロテントウダマシ
Monogr. Endomych., p. 224, t. 3, f. 2, (1858).
Loc. Distr.—Rokkiri, Paiwan.
Gen. Distr.—Formosa, Borneo, Burma, India, Ceylon.

Genus **DANAE,** REICHE

orientalis, GORHAM トウヨウテントウダマシ
Ent. Monthl. Mag. IX., p. 205, (*Coniopoda*) (1873).
Loc. Distr.—Shirin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **STENOTARSINI**

Genus **ATRICHONOTA,** ARROW

flavipes, ARROW クビグロキイロテントウダマシ
Fauna Brit. Ind. Col. Endomych., p. 387, f. 71, (1925).

Tribe: **ENDOMYCHINI**

Genus **EUCTEANUS,** GERSTÄCKER

Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

hardwickeri, HOPE ヨツボシムラサキテントウダマシ
in Gray's Zool. Misc. I., p. 22, (*Eumorphus*) (1831).
Loc. Distr.—Arisan (after Kano).
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **CYCLOTOMA,** MULSANT

coccinellina, GERSTÄCKER テントウダマシ
Archiv. Naturg. XXIII., 1, p. 242, (*Panomoea*) (1857).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

indiana, GORHAM ナナホシテントウダマシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 462, t. 32, f. 5, (*Panomoea*) (1897).
Loc. Distr.—Alikang, Kyūhabon.
Gen. Distr.—East India, Burma, Formosa.

Genus **PHAEONYCHUS,** GORHAM

rufipennis, MOTSCHULSKY ベニバテントウダマシ
Etud. Ent. IX., p. 18, (*Endomychus*) (1860).
Loc. Distr.—Chip-Chip.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

COCCINELLIDAE 瓢蟲科

Genus **HIPPODAMIA,** MULSANT

variegata, GOEZE ジウサンホシテントウ
Ent. Beytr. I., p. 246, (*Coccinella*) (1777).
Loc. Distr.—Taihōku, Shinchiku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **COCCINELLA,** LINNÉ

septempunctata, LINNÉ ナナホシテントウ
Syst. Nat. Ed. X., p. 365, (1758).
Loc. Distr.—Rōpi, Heitō.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

septempunctata var. **brucki,** MULSANT コモンナナホシテントウ
Monogr. Coccinell., p. 90, (1866).
Loc. Distr.—Chōsokei, Heitō.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

octomaculata, FABRICIUS ヤホシテントウ
Spec. Ins. I., p. 97, (1781).
Loc. Distr.—Garambi, Kôshuun, Kusukusu.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

octomaculata var. **arcuata,** FABRICIUS
Mant. I., p. 55, (1787).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

transversalis, FABRICIUS メンガタテントウ
Spec. Ins. I., p. 97, (1781).
=*repauda,* THUNBERG, Nov. Ins. Spec., p. 18, f. 25, (1781).
Loc. Distr.—Taihôku, Rokkiri, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, China, Java, New Guinea, Australia.

Genus **HALYZIA,** MULSANT

albolineata, GYLLENHAL シロスヂテントウ
in Schönh. Syn. Ins. I., 2, p. 158, (1808).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—China, Formosa.

quindecimguttata var. **septenaria,** MULSANT ジウゴホシテントウ
Monogr. Coccinell., p. 176, (1866).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **THEA,** MULSANT

cincta, FABRICIUS ウスヂヤテントウ
Suppl. Ent. Syst., p. 77, (*Coccinella*) (1798).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper (Kiushiu), Hainan, India, Formosa.

Genus **PROPYLEA,** MULSANT

conglobata, LINNÉ ヒメカメノコテントウ
Syst. Nat. Ed. X., p. 366, (1758).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Asia, Europe.

conglobata var. **dionea,** MULSANT
Opusc. Ent. VII., p. 740, (1856).
=*japonica* ab. *dionea,* MULSANT
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **CHILOMENES,** CHEVROLAT

teretus, OHTA ヒメフタホシテントウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 69, (1929).
Loc. Distr.—Tainan, Shinkwa, Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

quadriplagiata, SWARZ ジウジテントウ
in Schönh. Syn. Ins. I., p. 2, (1808).
Loc. Distr.—Taihoku, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

sexmaculata, FABRICIUS ダンダラテントウ
Spec. Ins. I., p. 96, (*Coccinella*) (1781).
Loc. Distr.—Taihoku, Hoozan, Akau, Koroton, Nantô.
Gen. Distr.—Philippines, Celebes, Java, India, Formosa.

Genus **ITHONE,** SOLSKY

hexaspilota, HOPE オホカメノコテントウ
in Gray's, Zool. Misc., p. 30, (1831).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan pro[illegible], Korea, Tibet, China, Nepal, Burma, Formosa.

Genus **SYNONYCHA,** CHEVROLAT

kikuchii, OHTA キクチオホテントウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 70, (1829).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara, Kyuhabon.
Gen. Distr.—Formosa.

grandis, THUNBERG オホテントウ
Nov. Ins. Spec., p. 12, f. 13, (*Coccinella*) (1781).
Loc. Distr.—Pilam, Taihorin, Takao, Heitô.
Gen. Distr.—Asia.

Genus **COELOPHORA,** MULSANT

biplagiata, SWARZ トンキンアカホシテントウ
in Schönh. Syn. Ins. I., 2, p. 196, (1808).
Loc. Distr.—Shinkwa.
Gen. Distr.—Formosa, China, Indo-China.

swinhoei, CROTCH タイワンアカホシテントウ
Revis. Coccinell., p. 149, (1874).
=*Chilomenes takanonis,* OHTA, Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 69, (1929).
Loc. Distr.—Chôsokei, Taihôrin, Tainan, Shinkwa, Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

vidua, MULSANT トビイロテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 393, (1851).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

mouhoti, CROTCH ムホウトテントウ
Revis. Coccinell., p. 149, (1874).

Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Indo-China, Formosa.

melanota, MULSANT カタモンテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 387, (1850).
=*Ptychanathis axyridis,* MATSUMURA, SCHÄDL. u. NÜTZL. Ins. Zuckerrohr Formosas, p. 47, pl. XXVIII., f. 6, (1910).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—India, Thibet, Formosa.

circumusta, MULSANT ハチノジテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 389, (1851).
=*mandarina,* MULSANT, ibidem, p. 389, (1850).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—China, Formosa.

chinensis, WEISE モンキテントウ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. (6). p. 133, (1912).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—China, Formosa.

ishidae, OHTA イシダテントウ
Ins. Mats. V., No. 3, p.. 135, (1931).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, Tonkin.

insularis, SICARD ニダンテントウ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 6. p. 134, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrinsho.
Gen. Distr.—Formosa.

weisei, MIWA (nom. nov.) ワイゼテントウ
=*insularis,* WEISE (nec. SICARD).
Arch. Naturg. LXXIX., A. (2), p. 184, (1923).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus NEDA, MULSANT

sedecimnotata, FABRICIUS コモンウスキテントウ
Syst. El. I., p. 370, (*Coccinella*) (1801).
Loc. Distr.—Kanetoan, Arisan, Kôshun.
Gen. Distr.—Hongkong, Borneo, Java, Formosa.

Genus LEIS, MULSANT

axyrides, PALLAS クロマダラテントウ (テントウムシ)
Reis. Russl., II., p. 726, (*Coccinella*) (1773).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Siberia, Mongolia, Japan, China, Celebes, Java, Formosa.

quindecimmaculata, Hope オホジウゴホシテントウ
in Gray's Zool. Misc., p. 30, (1837).
Loc. Distr.—Nepal, India, Formosa.
Gen. Distr.—Nepal, Formosa.

Genus **SYNIA,** Mulsant

rougeti, Mulsant ムネアカマクロテントウ
Monogr. Coccinell., p. 175, (1866).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **ALESIA,** Mulsant

discolor, Fabricius チヤイロテントウ
Suppl. Ent. Syst., p. 77, (*Coccinella*) (1798).
=*Coelophora calypso,* Matsumura, Schäd. u. Nützl. Ins. Zuckerrhor Formosas, p. 31, (1910).
Loc. Distr.—Anping, Paroe.
Gen. Distr.—Japan proper, China, India, Ceylon, Siam, Java, Borneo, Philippines, Formosa.

Genus **CHILOCORUS,** Leach

politus, Mulsant ベニイロテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., 455 et 1033, (1850).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Nepal, Formosa, China, Malacca, India, Java.

Genus **PLATYNASPIS,** Redtenbacher

lewisi, Crotch レビスアカマダラテントウ
Revis. Coccinell., p. 198, (1874).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus **STICHOLOTIS,** Crotch

formosana, Weise タイワンテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 185, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ASPIDIMERUS,** Mulsant

quadriguttatus, Weise ヨツモンクロテントウ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 6, p. (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

orbiculus, GYLLENHAL フタモンクロテントウ
in Schönh. Syn. Ins. I., 2, p. 205, (1808).
Loc. Distr.—Kankau, Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

orbiculus var. **nigripennis,** WEISE
Arch. Naturg. LXXXIX., A. p. (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CRYPTOLAEMUS,** MULSANT

montrouzieri, MULSANT クマキクロバテントウ
Opusc. Ent. III., p. 140, (1853).
Loc. Distr.—Taihoku, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, Australia, Africa, Central America, South Europe, Hawaii, Java.

Genus **SCYMNUS,** KUGELANN

horishanus, OHTA ホリシヤヒメテントウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 12, (1929).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

patagiatus, LEWIS セスヂヒメテントウ
Ann. Mag. Nat. Hist. XVII., No. 97, p. 39, (1896).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **NEPHUS,** MULSANT

sauteri, WEISE ザウタヒメテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 187, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

parenthesis, WEISE アカヒメテントウ
Arch. Natur. LXXXIX., A. 2., p. 187, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

5-punctatus, WEISE イツホシヒメテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2., p. 188, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

patagiatus, LEWIS フチトリヒメテントウ
Ann. Mag. Nat. Hist. XVII., No. 97, p. 36, (*Scymnus*) (1896).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PULLUS**, MULSANT

brunnescens, MOTSCHULSKY カバイロヒメテントウ
Bull. Mosc. 2., p. 425, (1866).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

nubilus, MULSANT ケシツブテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 972, (1850).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—India, Formosa.

quadrillum, MOTSCHULSKY ヨツモンツブテントウ
Bull. Mosc. II., p. 425, (1866).
Loc. Distr.—Heitô.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

paganus, LEWIS トビイロヒメテントウ
Ann. Mag. Nat. Hist. XVII., No. 97, p. 38, (*Scymnus*) (1896).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Japan prper, Formosa.

niponicus, LEWIS アカスヂヒメテントウ
Ann. Mag. Nat. Hist. XVII., No. 97, p. 37, (*Scymnus*) (1896).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

vilis, WEISE クロツブヒメテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 186, (1923).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

sodalis, WEISE キアシツブテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 186, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

contemtus, WEISE キムネツブテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 186, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

tainanensis, OHTA ヒメテントウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 7, (1929).
Loc. Distr.- Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwanus, OHTA ヨツモンヒメテシトウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 6, (1929).
Loc. Distr.—Hokuto, Kôshun, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwanus ab. **zugronis,** OHTA
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 7, (1929).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

akonis, OHTA アコウヒメテントウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 5, (1929).
Loc. Distr.—Akau, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

akonis ab. **rufus,** OHTA
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 6, (1929).
Loc. Distr.—Kwouri, Akau, Kuyaniya.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PARALITHETHUS,** OHTA

ovatus, OHTA マルヒメテントウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 2, (1929).
Loc. Distr.—Kôshun, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

ovatus ab. **kokuronis,** OHTA
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 2, (1929).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DIOMUS,** MULSANT

futahoshii, OHTA オホフタホシヒメテントウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 9, (1929).
Loc. Distr.—Tappan.
Gen. Distr.—Formosa.

futahoshii ab. **koshunus,** OHTA
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 10, (1929).
Loc. Distr.—Shisha, Tappan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **AMIDA,** LEWIS

tricolor ab. **formosana,** WEISE サンショクテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 185, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STETHORUS,** WEISE

rotundulus, MOTSCHULSKY ケシテントウ
Bull. Soc. Nat. Mosc. IL, p. 426, (1866).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **RODOLIA**, Mulsant

cardinalis, Mulsant ベダリヤテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 906, (*Vedalia*,) (1850).
Loc. Distr.—Taihoku, Kagi, Heitō, Tainan, Inrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Australia, America, Africa, South Europe, Java.

Genus **RHIZOBIUS**, Stephens

formosanus, Weise ツマキチビテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 188, (1923).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EPILACHNA**, Chevrolat

wissmanni var. **processa**, Weise オホホシマダラテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 182, (1923).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

subfasciata, Weise ホシオビテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 182, (1923).
Loc. Distr.—Kankau, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

macularis, Mulsant カメノコマダラテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 797, (1851).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Japan, China, India, Celebes, Formosa.

indica, Mulsant コモンマダラテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 776, (1850).
Loc. Distr.—Nanto.
Gen. Distr.—China, Philippines, Sumatra, Maley, India, Nocobar.

indica var. **ceylonica**, Weise
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 418, (1900).
Loc. Distr.—Taihorin.
Gen. Distr.—Formosa, Ceylon.

vigintioctopunctata, Fabricius ニジウヤホシマダラテントウ
Syst. Ent., p. 87, (*Coccinella*) (1775).
Loc. Distr.—Teraso, Kankau, Anping, Taihōrin, Nantō, Tainan, Shinko, Horisha, Taipin.
Gen. Distr.—China, India, Philippines, Formosa, Australia.

grayi, Mulsant オホダンダラテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 774, (1850).
Loc. Distr.—Horisha, Arisan.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **SOLANOPHILA**, WEISE

incauta, MULSANT コウシュンダンダラテントウ
Spec. Col. Trim. Secur., p. 803, (*Epilachna*) (1851).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

admirabilis, CROTCH タイホリンダンダラテントウ
Revis. Coccinell., p. 81, (*Epilachna*) (1873).
Loc. Distr.—Taihorin.
Gen. Distr.—Formosa.

octomaculata, THUNBERG ヤツボシセダカテントウ
Nov. Ins. Spec., p. 13, f. 75, (*Coccinella*) (1781).
=*alternans,* MULSANT, Spec. Col. Trim. Secur., p. 767, (*Epilachna*) (1850).
Loc. Distr.—Suisharyô, Taihorin.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

fallax, WEISE ジウニホシセダカテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 183, (1923).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, WEISE タイワントホシセダカテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 183, (1923).
Loc. Distr.—Suisharyô, Taihorin.
Gen. Distr.—Formosa.

decemguttata, WEISE ジュウテンセダカテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 183, (1923).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, WEISE ザウタセダカテントウ
Arch. Naturg. LXXXIX., A. 2, p. 182, (1923).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

DERMESTIDAE 鰹節蟲科

Subfamily **DERMESTINAE**

Genus **DERMESTES,** LINNÉ

carnivorus, FABRICIUS ホシカカツヲブシムシ
Syst. Ent., p. 55, (1775).
Loc. Distr.—Taihoku, Anping.
Gen. Distr.—India, Formosa, Europe, America.

pervianus, CASTERNAU アンピンカツヲブシムシ
Hist. Nat. Col. II., p. 33, (1840).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Central and South America, Europe, Capland, Formosa.

vulpinus, FABRICIUS ハラジロカツヲブシムシ
Spec. Ins. I., p. 64, (1781).
Loc. Distr.—Anping, Kōsempo, Banshōryō, Nantō, Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

cadaverinus, FABRICIUS カツヲブシムシ
Syst. Ent., p. 55, (1775).
Loc. Distr.—Taihoku, Tansui.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Subfamily **ANTHRENINAE**

Genus **ANTHRENUS,** FABRICIUS

multimaculatus, PIC セマダラカツヲブシムシ
Mélanges, XXVII., p. 2, (1918).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

museorum, LINNÉ チビマルカツヲブシムシ
Fn. Suec. Ed. II., p. 145, (*Dermestes*) (1761).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Palaearctic Region, North America, Formosa.

verbasci, LINNÉ ヒメマルカツヲブシムシ
Syst. Nat. Ed. XII., p. 568, (*Dermestes*) (1767).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Subfamily **TRINODINAE**

Genus **TRINODES,** LATREILLE

niger, MATSUMURA et YOKOYAMA クロカツヲブシムシ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 53, (1928).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **ORPHILINAE**

Genus **ORPHINUS,** MOTSCHULSKY

formosanus, PIC タイワンカツヲブシムシ
Mélanges, XXVII., p. 2, (1918).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ORPHILOIDES,** MATSUMURA et YOKOYAMA

ovivarius, MATSUMURA et YOKOYAMA カマキリタマゴカツヲブシムシ
Ins. Mats. II., No. 3, p. 131, (1928).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

bimaculatus, MATSUMURA et YOKOYAMA フタモンカワラブシムシ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 54, (1928).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

BYRRHIDAE 圓刺蟲科

Genus **BYRRHINUS,** LINNÉ

orientalis, SHARP コウシュンマルトゲムシ
Ent. Monthl. Mag. XXXVIII., p. 63, (*Cyphonichus*) (1902).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

Genus **CHELONARIUM,** FABRICIUS

indicum, GROUVELLE インドマルトゲムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII., p. 464, (1894).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Borneo, Burma, Tenasserim, India, Formosa.

Genus **CHELONARIUM,** FABRICIUS

obscuripenne, PIC チャバネマルトゲムシ
Mélanges, XXVI., p. 63, (1917).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CEPHALOBYRRHUS,** PIC

latus, PIC タイナンマルトゲムシ
Mélanges, XI., p. 4, (1923).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

DRYOPIDAE 泥蟲科

(*Parnidae*)

Genus **HELICHUS,** ERICHSON

dicksoni, WATERHOUSE デイクソンドロムシ
Ann. Mag. Nat. Hist., (5) I, p. 491, (1878).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PACHYPARNUS,** FAIRMAIRE

indicus, WATERHOUSE インドドロムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 19, (*Parygrus*) (1876).
Loc. Distr.—Heitô.
Gen. Distr.—India, Formosa.

HYDROPHILIDAE 牙蟲科

Subfamily HYDRAENINAE

Genus HYDRAENA, KUGELANN

sauteri, ORCHYMONT ザウタマルガムシ
Suppl. Ent. II., p. 1, t. 1, f. 1, (1913).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily SPHAERIDIINAE

Tribe: SPHAERIDIINI

Genus COELOSTOMA, BRULLÉ

stultum, WALKER セマルガムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 209, (1858).
Loc. Distr.—Anping, Kōtōsho, Garambi.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Indo-China, Sumatra, Japan proper, Formosa.

Genus DACTYLOSTERNUM, WOLLASTON

abnormale, ORCHYMONT タカサゴセマルガムシ
Suppl. Ent. II., p. 10, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

hydrophiloides, MAC LEAY アカアシセマルガムシ
Annal. Javan., p. 26, et 2, (*Sphaeridium*) (1852).
=*rubripes*, BOHEMANN, Eugen. Resa., p. 24, (1859).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa, Indo-China.

Genus SPHAERIDIUM, FAIRMAIRE

dimidiatum, GORY ツマキハバビロガムシ
in Guérin, Icon. Regne Anim. VII., Ins. p. 73, t. 20, f. 15, (1834).
Loc. Distr.—Tainan, Anping.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

quinquemaculatum, FABRICIUS イツモンハバビロガムシ
Syst. Ent. Suppl., p. 39, (1798).
Loc. Distr.—Anping, Taihōrin, Kwoshōtō, Tainan.
Gen. Distr.—Ceylon, China, Formosa.

seriatum, ORCHYMONT シナハバビロガムシ
Suppl. Ent. II., p. 12, 14, t. 1, f. 8, 11, (1913).
Loc. Distr.—Kōsempo, Taihōrin.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Tribe: **CERCYONINI**

Genus **CERCYON,** LEACH

nigriceps, MARSHAM クロアシケシガムシ
Ent. Brit. I., p. 72, (1802).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Africa, Formosa.

schenklingi, ORCHYMONT ツマキケシガムシ
Ent. Mitteil. III., p. 323, (1914).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

uniformis, SHARP ヒメケシガムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 357, (1890).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Ceylon, India, Sunda Islands, Formosa.

ustus, SHARP ケシガムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 418, (1874).
Loc. Distr.—Kamagawa.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

vicinalis, WALKER セマダラケシガムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III., p. 258, (1859).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping.
Gen. Distr.—Ceylon, India, Sunda Islands, Formosa.

Genus **OOSTERNUM,** SHARP

horni, ORCHYMONT ホルンケシガムシ
Ent. Mitteil. III., p. 326, f. 2, p. 327, (1914).
Loc. Distr.—Taihôrin, Tappan.
Gen. Distr.—Ceylon, Hongkong, Formosa.

Tribe: **MEGASTERNINI**

Genus **PERATOGONUS,** SHARP

reversus, SHARP コウセンセマルケシガムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 461, (1884).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CRYPTOPLEURUM,** MULSANT

ferrugineum, MOTSCHULSKY アカセマルケシガムシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI., (2), p. 448, (1863).
Loc Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Ceylon, Indo-China, Sumatra, Formosa.

pygmaeum, Orchymont セマルケシガムシ
Suppl. Ent. II., p. 15, 17, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **HYDRPHILINAE**

Tribe: **HYDROBIINI**

Genus **HELOCHRES,** Mulsant

lentus, Sharp ウスキヒラタガムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 352, (1890).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Ceylon, India, Indo-China, Formosa.

Genus **ENOCHRUS,** Thomson

flavicans, Regimbart キイロヒラタガムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXII., p. 56, (1903).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Annan, Formosa.

sauteri, Orchymont クロツヤヒラタガムシ
Suppl. Ent. II., p. 6, (1913).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STERNOLOPHUS,** Solier

rufipes, Fabricius ヒメガムシ
Ent. Syst. I., p. 183, (*Hydrophilus*) (1792).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Tropical and subtropical Asia.

Genus **HYDROUS,** Leach

acuminatum, Motschulsky ガムシ
Etud. Ent. II., p. 44, (1853).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Tibet, Burma, Java, Sumatra, Formosa.

Tribe: **BEROSINI**

Genus **BEROSUS,** Leach

fairmairei, Zaitzev ゴマフナガガムシ
Hor. Soc. Ent. Ross. XXXVIII., p. 355, (1908).
Loc. Distr.—Kankau, Anping.
Gen. Distr.—Indo-China, Formosa.

indicus, Motschulsky ウスチヤナガガムシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIV., (1), p. 110, (1861).
Loc. Distr.—Anping, Kankau.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **REGIMBARTIA,** Zaitzev

attenuata, Fabricius クロヲヤナガガムシ
Syst. El. I., p. 253, (1801).
Loc. Distr.—Kankau, Anping.
Gen. Distr.—Ceylon, Sunda Islands, Philippines, Australia, Formosa.

HETEROCERIDAE 長泥蟲科

Genus **HETER[illegible]ERUS,** Fabricius

tonkinensis, Grouvelle ウスモンナガドロムシ
Not. Leyd. Mus. XVIII., p. 5, (1896).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—China, Siam, Tonkin, Formosa.

philippinensis, Grouvelle アヤフナガドロムシ
Not. Leyd. Mus. XVIII., p. 4, (1896).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

sauteri, Grouvelle ザウタナガドロムシ
Not. Leyd. Mus. XXXIII., p. 109, (1911).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Division III, SERRICORNIA 鋸角族

CANTHARIDAE 葉虎科

Genus **PODABRUS,** Westwood

curvatipes, Pic ユミアシジヨウカイ
Mélanges, XXVII., p. 4, (1922).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CANTHARIS,** Linné

fainana, Pic オホアヲジヨウカイ
Echange, XXVI., p. 77, (1910).
Loc. Distr.—Taihorin, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Pic キベリオホジョウカイ
Ent. Mitteil. XV., p. 68, (1926).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

limbolaria var. **tainanensis,** Pic タイナンオホジョウカイ
Mélanges, XXI., p. 4, (1916).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

explanaticollis, Pic ムナビロオホジョウカイ
Mélanges XXVI., p. 5, (1917).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

subopacipennis, Pic ウスグモオホジョウカイ
Naturaliste, p. 77, (1910).
Loc. Distr.—Shisha.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, Pic ウスバクビナガジョウカイ
Naturaliste, p. 291, (1911).
Loc. Distr.—Hokuto.
Gen. Distr.—Formosa.

obscurioripes, Pic クロアシヒメジョウカイ
Bull. Soc. Zool. Fr. LI., p. 235, (1926).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

gracilitarsis, Pic キアシヒメジョウカイ
Mélanges, XXXIII., p. 30, (1921).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

LAMPYRIDAE 螢科

Subfamily LAMPYROCERINAE

Genus VESTA, Castelnau

chevrolati, Castelnau オホヒゲヒラタホタル
Ann. Soc. Ent. Fr. II., p. 33, (1833).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Java.

impressicollis, Fairmaire ヒラタホタル
Bull. Soc. Ent. Belg., p. 15, (1891).
Loc. Distr.—Kôsempo, Shisha, Alikang, Nôkô, Urai.
Gen. Distr.—China, Formosa.

rufiventris, Motschulsky アカハラヒラタホタル
Etud. Ent. II., p. 43, (1853).
Loc. Distr.—Sokutsu, Horisha, Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Subfamily **LUCIDOTINAE**

Genus **LUCIDINA,** Gorham

accensa, Gorham フトヒゲヒラタホタル
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 408 t. 17, f. 9, (1883).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

biplagiata, Motschulsky ムネクロスヂヒラタホタル
Bull. Soc. Nat. Mosc. I., p. 167, (*Lucid[illegible]a*) (1866).
Loc. Distr.—Taihôku, Shinten.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

roseonotata, Pic ベニムネヒラタホタル
Mélanges, XXII., p. 5, (1917).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PYROCOELIA,** Gorham

analis, Fabricius タイワンマドボタル
Syst. El. II., p. 100, (1801).
Loc. Distr.—Takao, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, China.

praetexta, E. Olivier セイバンマドボタル
Rev. Soc. Bour. bonnais, p. 66, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

sanguiniventer, E. Olivier アカハラマドボタル
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, p. 145, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, E. Olivier タイワンヒメマドボタル
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, p. 146, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

lampyroides, E. Olivier ニセマドボタル
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XXX., p. 593, (1891).
Loc. Distr.—Suisharyô, Rokkiri.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Subfamily **LAMPYRINAE**

Genus **LAMPROPHORUS**, Gemminger et Harold

yunnanus, Fairmaire ウンナンボタル
Not. Leyd. Mus. XIX., p. 216, (1897).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Yunnan, Formosa.

Genus **DIAPHANES**, Motschulsky

exsanguis, E. Olivier ムナビロボタル
Bull. Mus. Paris, XV., p. 248, (1909).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—China, Formosa.

citrinus, E. Olivier ウスキムナビロボタル
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, p. 147, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo, Suisharyô, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

formosus, E. Olivier タイワンムナビロボタル
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 286, (1910).
Loc. Distr.—Kaukau, Kôsempo, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **LUCIOLINAE**

Genus **LUCIOLA**, Casternau

formosana, Pic ホウライボタル
Mélanges, XVIII., p. 9, (1916).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

anceyi, E. Olivier アンセイホタル
Rev. d'Ent. II., p. 330, f. (1883).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Kankau.
Gen. Distr.—Burma, Tonkin, China, Formosa.

mundula, E. Olivier ホソホタル
Ent. Mitteil. II., p. 271, (1913).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

impolita, E. Olivier カンカウホタル
Ent. Mitteil. II., p. 271, (1913).
Loc. Dister.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

chinensis, Linné ツマグロホタル
Syst. Nat. I., 2, p. 645, (*Lampyris*) (1767).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo, Horisha, Taihoku, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, India, Tonkin, China.

cerata, E. OLIVIER タイワンホタル
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, p. 147, (1911).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

filiformis, E. OLIVIER モンクロホタル
Ent. Mitteil. II., p. 271, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

gorhami, RITSEMA ゴルハムホタル
Not. Leyd. Mus., V., p. 4, (1883).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, India.

ovalis, HOPE キベリホタル
in Gray's Zool. Misc., p. 26, (1831).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Horisha, Taihoku, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Tonkin, Burma, Nepal.

costipennis, GORHAM スヂバネボタル
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 102, (1880).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—China, Formosa.

substriata, GORHAM セスヂボタル
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 100, (1880).
Loc. Distr.—Kosempo, Kankau, Taihanroku, Kanshirei.
Gen. Distr.—Formosa, Rangoon.

Genus **CURTOS,** MOTSCHULSKY

sauteri, E. OLIVIER ザウタホタル
Ent. Mitteil. II., p. 272, (1913).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

松村松年著"蛍の話、教育報書"(1918)及"面白き農界の教材"(1928)に掲載す
Luciola japonica, THUNBERG キイロボタル
Luciola kagiana, MATSUMURA カギボタル
Curtos koshunensis, MATSUMURA コウシュンスヂボタル
Lampyris watanabei, MATSUMURA ワタナベボタル

LYCIDAE 薄翅螢科

Genus **CALOCHROMUS,** GUÉRIN-MÉNÉVILLE

subparallelus, PIC ヒラウスバボタル
Echange, XLI., p. 17, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LYCOSTOMUS**, Motschulsky

honestus, Bourgeois ハバビロウスバボタル
Ann. Soc. Ent. Fr. V., p. 73, (1885).
Loc. Distr.—Taihōrin, Kōsempo, Kankau.
Gen. Distr.—India, Butan, Formosa.

similis, Hope ヒメハバビロウスバボタル
in Gray's Zool. Misc., p. 26, (1831).
Loc. Distr.—Kōshun, Fuhōshō, Kōsempo, Paroe.
Gen. Distr.—Nepal, Formosa.

crassus, Kleine タイホリンハバビロウスバボタル
Stett. Ent. Zeitg. LXXXVII., I, p. 97, f. 1, 2, (1926).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

davidis, Fairmaire タビドハバビロウスバボタル
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 118, (1878).
=*debilis*, Waterhouse, Illustr. Typ. Spec. Coleopt. I., p. 15, pl. III, f. 8, (1879).
Loc. Distr.—Taipin, Taihoku, Horisha, Arisan.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **MACROLYCUS**, Waterhouse

flabellatus, Motschulsky ムナグロヒラヒゲウスバボタル
Schrenk's Reisen, p. 114, t. 7, f. 19, (1860).
Loc. Distr.—Teraso.
Gen. Distr.—Amur, Japan proper, Formosa.

dominator, Kleine ヒメヒラヒゲウスバボタル
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 327, (1925).
Loc. Distr.—Hoozan, Kosempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LYPONIA**, Waterhouse

delicatulus, Kiesenweiter ホソヒゲウスバボタル
Berl. Ent. Zeit. XVIII., p. 254, (1874).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

dolosa, Kleine ホウザンホソヒゲウスバボタル
Ent. Blätt. XX., Nr. 3, p. 173, (1924).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Kleine タカサゴホソヒゲウスバボタル
Ent. Blätt. XX., Nr. 3, p. 174, (1924).
Loc. Distr.—Kōsempo, Hoozan, Taihōrin, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PONYALIS**, Fairmaire

gestroi, Pic クシヒゲウスバボタル
Mélanges, III., p. 2, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PLATYCIS**, Thomson

nasutus, Kiesenwetter ホソウスバボタル (テングベニボタル)
Berl. Ent. Zeitschr. XVIII., p. 255, (1874).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PLATEROS**, Bourgeois

formosanus, Pic ムナキホソウスバボタル
Echange, XXXVII., p. 7, (1921).
Loc. Distr.—Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus var. **nigrolineatus**, Pic
Echange, XXXVII., p. 7, (1921).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

brevinotatus, Pic モンホソウスバボタル
Echange, XXXVII., p. 6, (1921).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

rubripennis, Pic アカバネホソウスバボタル
Echange, XXXVII., p. 5, (1921).
Loc. Distr.—Hoozan, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

brevilineatus, Pic スヂホソウスバボタル
Ann. Soc. Linn. Lyon. LXIX., p. 73, (1922).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

purus, Kleine クロホソウスバボタル
Stett. Ent. Zeit. LXXXVII., I, p. 99, f. 5, 6, (1926).
Loc. Distr.—Taihôrin, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DIHAMMATUS**, Waterhouse

atricolor, Pic カタアカホソウスバボタル
Echange, XXXL., p. 1, (1921).

Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DITONECES,** WATERHOUSE

laeticeps, PIC クスアカヒメウスバボタル
Echange, XXXI., p. 4, (1921).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo, Taihanroku.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, PIC ザウタヒメウスバボタル
Echange, XLI., p. 19, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

maculatithorax, PIC ムネモンヒメウスバボタル
Echange, XXXI., p. 4, (1921).
Loc. Distr.—Taihôrin, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

griseostriatus, KLEINE キスヂヒメウスバボタル
Stett. Ent. Zeit. LXXXVII., I, p. 101, f. 13, 14, (1926).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **BULENIDES,** WATERHOUSE

purpureus, PIC ムラサキヒメウスバボタル
Ann. Soc. Linn. Lyon. LXIX., p. 74, (1922).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CAUTIRES,** WATERHOUSE

fainanensis, PIC タイナンヒメウスバボタル
Echange, XLI., No. 419, p. 8, (1925).
Loc. Distr.—Horisha, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

fainanensis var. **inlimbatus,** PIC
Echange, XLI., p. 8, (1925).
Loc. Distr.—Takao, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

fainanensis var. **diversicollis,** PIC
Echange, XLI., p. 8, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **XYLOBANUS,** WATERHOUSE

nigrimembris, PIC クロハラナガウスバボタル
Echange, XLI., No. 407, p. 16, (1921).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa, Tonkin.

Genus **CLADOPHORUS,** GUÉRIN-MÉNÉVILLE

singularicollis, PIC コガシラナガウスバボタル
Echange, XLI., p. 18, (1925).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

certus, KLEINE ムナビロナガウスバボタル
Stett. Ent. Zeit. LXXXVII., I, p. 103, f. 20, 21, (1926).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PARAPYROPTERUS,** KLEINE

nigrostriatus, KLEINE クロスヂナガウスバボタル
Stett. Ent. Zeit. LXXXVII., I, p. 104, f. 22, 23, 24, (1926).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PROCAUTIRES,** KLEINE

socius, KLEINE ホウザンウスバボタル
Stett. Ent. Zeit. LXXXVII., I, p. 104, (1926).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **METANEUS,** WATERHOUSE

formosanus, PIC タイワンウスバボタル
Ent. Mitteil. XV., Nr. 1, p. 67, (1926).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DILOPHOTES,** WATERHOUSE

atricollis, PIC クロムネウスバボタル
Ent. Mitteil. XV., Nr. 1, p. 68, (1926).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LIBNETIS**, WATERHOUSE

opacus, PIC クロチビウスバボタル
Mélanges, XXXII., p. 14, (1921).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

PRIONOCERIDAE 細翅螢科

Genus **PRIONOCERUS**, PERTY

bicolor, REDTENBACHER キイロホソバネホタル
Reise Novara, II., p. 109, t. 3, (1868).
Loc. Distr.—Pilam.
Gen. Distr.—India, Malay, Indo-China, Formosa.

Genus **IDGIA**, CASTERNAU

foveifrons, FAIRMAIRE アヲホソバネホタル
Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII., p. 624, (1899).
Loc. Distr.—Hokuto, Shisha, Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

deusta, FAIRMAIRE ツマグロホソバネホタル
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII., p. 118, (1878).
Loc. Distr.—Taihôrin, Fuhôshô, Kôsempo, Hoozan.
Gen. Distr.—China, Formosa.

flavicollis, REDTENBACHER キムネホソバネホタル
Reise Novara, II., p. 111, (1868).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

bimaculata, PIC フタモンホソバネホタル
Echange, XXVI., p. 75, (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

DASYTIDAE 擬螢科

Genus **LAJUS**, GUÉRIN-MÉNÉVILLE

latifasciatus, PIC セアカチビホタルモドキ
Mélanges, XXX., p. 12, (1919).
Loc. Distr.—Anping, Bakurasu, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

6-maculatus, PIC ムツモンホタルモドキ
Mélanges, XXX., p. 12, (1919).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

pici, MIWA (nom. nov.) ビヲクホタルモドキ
=*sexmaculatus,* PIC, Bull. Mus. Paris, p. 73, (1926).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

javanus, PIC ジヤバノホタルモドキ
Bull. Soc. Zool. Fr., p. 61, (1906).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

Genus **ATTALUS,** ERICHSON

rufoapicalis, PIC ツマアカホタルモドキ
Mélanges, XXVI., p. 6, (1917).
Loc. Distr.—Hokuto, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MALACHIUS,** FABRICIUS

lineaticollis, PIC ムネスヂアヲホタルモドキ
Mélanges, XXVI., p. 6, (1917).
Loc. Distr.—Hokuto, Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MALTHINUS,** LATREILLE

atripennis, PIC ウスクロバネホタルモドキ
Mélanges, XXXVI., p. 30, (1922).
Loc. Distr.—Hokuto, Taihoku, Shichiseiton.
Gen. Distr.—Formosa.

reductelineata, PIC ウスキメダカホタルモドキ
Mélanges, XXXVI., p. 30, (1922).
Loc. Distr.—Hokuto, Buttshaho, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ICHTHYURUS,** WESTWOOD

bilineatus, PIC フタスヂコバネホタルモドキ
Mélanges, XVI., p. 6. (1915).
Loc. Distr.—Rinkiho, Hoisha.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, GESTRO ザウタコバネホタルモドキ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XLV., p. 50, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrinshō.
Gen. Distr.—Formosa.

nigripennis, Pic クロコバネホタルモドキ
Mélanges, VII., p. 17, (1913).
Loc. Distr.—Maruyama, Arisan, Kôsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

apicipennis, Pic タイナンコバネホタルモドキ
Mélanges, VII., p. 18, (1913).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TRIPHERUS,** ?

m-signatus, Pic ウスキコバネホタルモドキ
Echange, XXXV., p. 24, (1919).
Loc. Distr.—Horisha, Hokuto, Chôsokei, Taihôrin, Kanmutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

m-signatus var. **bimaculatus,** Pic
ibidem.

Genus **CARPHURUS,** Erichson

rufifrons, Pic マエアカホタルモドキ
Mélanges, XXXIII., p. 20, (1921).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

DRILIDAE 姫螢科

Genus **LAEMOGLYPTUS,** Fairmaire

subspinosus, Pic ホソヒゲヒメホタル
Naturaliste, p. 259, (1911).
Loc. Distr.—Sokutsu, Taihôrin, Kôshun, Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DRILOSILIS,** Pic

sauteri, Pic ザウタヒメホタル
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl., p. 188, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo, Suisharyô, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

rufithorax, Pic ムネアカヒメホタル
Mélanges, II., p. 13, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

DASCILLIDAE 長花蚤科

Subfamily DASCILLINAE

Tribe: CNEGLOSSINI

Genus EPILICAS, WHITE

candezei, WHITE カンデズナガハナノミ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III., p. 289, (1859).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus PARALICHAS, WHITE

bicoloripes, PIC アシマダラナガハナノミ
Echange, XXVII., p. 143, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

guerini, WHITE ゲエリンナガハナノミ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) III., p. 287, t. 7, f. 9, (1859).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus EULICHAS, JACOBSON

funebris, WESTWOOD コウセンナガハナノミ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II., p. 237, t. 12, f. 3-9, (1853).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Tribe: DASCILLINI, PIC

Genus DASCILLUS, LATREILLE

congruus, PASCOE パスコナガハナノミ
Journ. Ent. I., p. 44, (1860).
Loc. Distr.—Horisha, Arisan.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Subfamily EUBRIINAE

Genus EUBRIANAX, KIESENWETTER

ramicornis, KIESENWETTER クシヒゲナガハナノミ
Berl. Ent. Zeitschr. XVIII., p. 247, (1874).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

HELODIDAE 圓花蚤科

(*Cyphonidae*)

Subfamily **PTILODACTYLINAE**

Genus **PTILODACTYLA,** ILLIGER

sinensis var. **sauteri,** PIC シナマルハナノミ
Ent. Mitteil. XVI., No. 4, p. 249, (1927).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa

nitidissima, PIC ツヤマルハナノミ
Ent. Mitteil. XVI., No. 4, p. 249, (1927).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **HELODINAE**

Genus **CYPHON,** PAYKUL

formosanus, PIC タイワンマルハナノミ
Mélanges, XXVII., p. 5, (1918).
Loc. Distr.—Kōsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

atripennis, PIC クロバネマルハナノミ
Mélanges, XXVII., p. 5, (1918).
Loc. Distr.—Sokutsu, Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SCIRTES,** ILLIGER

rufonotatus, PIC ムネアカマルハナノミ
Mélanges, XII., p. 6, (1915).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

CLERIDAE 郭公蟲科

Subfamily **CLERINAE**

Tribe: **TILLINI**

Genus **CYLIDRUS,** LATREILLE

cyaneus, FABRICIUS キバラルリカツコウムシ
Mant. Ins., p. 126, (*Clerus*) (1787).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kōsempo.
Gen. Distr.—Madagascar, Mauritius, Central Africa, Formosa, East India, New-Guinea, Malay, Australia.

Genus **CLADISCUS**, Chevrolat

sanguinicollis, Spinola クビアカホソカツコウムシ
Clerites, I., p. 125, (1844).
Loc. Distr.—Kôsempo, Banshoryô.
Gen. Distr.—East India, Andaman, Formosa.

sauteri, Schenkling ザウタホソカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 322, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo, Banshoryo.
Gen. Distr.—Formosa.

terminalis, Schenkling タイホリンホソカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 322, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TILLUS**, Olivier

birmanicus, Gorham ビルマヒメカツコウムシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2) XII., p. 720, (1892).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Burma, Sumatra, Formosa.

notatus, Klug キオビヒメカツコウムシ
Clerii., p. 276, (1842).
Loc. Distr.—Kankau, Tauran.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, India, Madagascar.

Genus **GASTROCENTRUM**, Gorham

unicolor, Whaite サビカツコウムシ
Cat. Cleria., p. 56, (1849).
Loc. Distr.—Kôsempo, Musha.
Gen. Distr.—India, Philippines, Formosa.

nitidum, Schenkling アカツヤカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 323, (1912).
Loc. Distr.—Sokutsu, Rôhô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CALLIMERUS**, Gorham

bicoloripes, Pic アシマダラカツコウムシ
Mélanges, XLIV. p. 32, (1925).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

nigromarginatus, Kuwert クロヘリキクビカツコウムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII., p. 483, (1893).

Loc. Distr.—Kōsempo, Garambi, Taihōrin, Kankau.
Gen. Distr.—Sumbawa, Formosa.

duodecimpustulatus, SCHENKLING ジウニシロテンカツコウムシ（シラホシカツコウ）
Ent. Mitteil. I., p. 323, (1912).
Loc. Distr.—Kankau, Kōsempo, Banshoryō, Rokkiri.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: CLERINI

Genus OPILO, LATREILLE

mollis, LINNÉ セオビカツコウムシ
Syst. Nat. ed., X., p. 355, (*Dermestes*) (1758).
Loc. Distr.—Anping, Rikiriki.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

formosanus, SCHENKLING ヒザグロカツコウムシ（タイワンナガカツコウ）
Ent. Mitteil. I., p. 324, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrin, Banshoryō.
Gen. Distr.—Formosa.

dificilis, SCHENKLING チヤイロカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 324, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrinshō, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus ORTHRIUS, GORHAM

prolongatus, SCHENKLING ヒトツメオホカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 325, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrin, Kōsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formssa.

carinifrons, SCHENKLING マエミゾオホカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 325, (1912).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formsa.

Genus XENORTHRIUS, GORHAM

umbratus, SCHENKLING オビカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 325, (1912).
Loc. Distr.—Kōsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

umbratus var. **simplex,** SCHENKLING
Ent. Mitteil. I., p. 326, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrinshō, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STIGMATIUM**, GRAY

pilasellum, GORHAM ダンダラサビカツコウムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 163, (1878).
Loc. Distr.—Kankau, Fuhōshō, Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

diversipes, SCHENKLING ヒメサビカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 326, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DASYCETOCLERUS**, KUWERT

ceramboides, MOTSCHULSKY アヤフチビカ[illegible]ウムシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIV., p. 125, (1861).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa, Ceylon.

Genus **OMMADIUS**, CASTERNAU

nigromaculatus, LEWIS クロフアシナガカツコウムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X., p. 187, (1892).
Loc. Distr.—Hoozan, Alikang, Kōsempo, Fuhōshō, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

pectoralis, SCHENKLING ミツオビアシナガカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 326, (1912).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Taihōrinshō, Hoozan, Kōsempo, Kankau, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ANTHICOCLERUS**, SCHENKLING

anthicoides, WESTWOOD ニセイツカクカツコウムシ
in White, Cat. Clerid., p. 59. (1849).
Loc. Distr.—Kōsempo, Taihōrin.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Sumatra, New-Guinea, Formosa.

Genus **NEOCLERUS**, LEWIS

quinquemaculatus, GORHAM イツホシカツコウムシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2) XII., p. 738, (1892).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Subfamily **CORYNETINAE**

Tribe: **ENOPLIINI**

Genus **ALLOCHOTES,** Westwood

dochroa, Lewis ツヤマルバカツコウムシ
Ent. Monthl. Mag. XXVII, p. 210, (1891).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

sauteri, Schenkling ザウタマルバカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 328, (1912).
Loc. Distr.—Kankau, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

violaceipennis, Schenkling ルリマルバカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 328. (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TENERUS** Casternau

signaticollis, Casternau タテスヂムネブトカツコウムシ
in Silberm. Rev. IV., p. 44, (1836).
Loc. Distr.—Banshoryô.
Gen. Distr.—India, Java, Malay, Formosa.

hilleri, Harold ツマグロムネブトカツコウムシ（ツマグロカツコウ）
Berl. Ent. Zeitschr. XXI., p. 357, (1877).
Loc. Distr.—Taihôrinshô, Fuhôshô, Alikang, Kôsempo, Kankau, Taihoku, Paroe.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

higonius, Lewis ルリバムネブトカツコウムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X., p. 189, (1892).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

maculicollis, Lewis モンムネブトカツコウムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X., p. 189, (1892).
Loc. Distr.—Taihoku, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

formosanus, Schenkling ホタルカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 329, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PELONIUM,** Spinola

mundum, Schenkling コウセンチビカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 329, (1912).

Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanum, SCHENKLING タイワンチビカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 329, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

lividipenne, SCHENKLING アヲチビカツコウムシ
Ent. Mitteil. I., p. 330, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CORYNETINI**

Genus **TARSOSTENUS,** SPINOLA

univittatus, ROSSI シロオビチビカツコウムシ
Fauna Etr. I., p. 44 (*Clerus*) (1792).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **CORYNETES,** HERBST

coeruleus, DE GEER ホシカムシ
Mém. V., p. 163, t. 5, f. 13-14, (*Clerus*) (1775).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite

Genus **NECROBIA,** OLIVIER

ruficollis, FABRICIUS アカクビホシカムシ
Syst. Ent., p. 57, (*Clerus*) (1775).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

rufipes, FABRICIUS アカアシホシカムシ
Mém. Ins. V., p. 165, f. 4, (*Clerus*) (1775).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

violacea, LINNÉ ルリホシカムシ
Syst. Nat. ed. X., p. 356 (*Clerus*) (1758).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

LYMEXYLONIDAE 筒蠹蟲科

Genus **ATRACTOCERUS,** PALISOT de BEAUVOIS

niger, STROHMEYER コバネツツシンクヒ
Ent. Rundsch. XXVII., p. 6, (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kusukusu.
Gen. Distr.—India, Formosa.

PTINIDAE 標本蠹科

Subfamily GIBBIINAE

Genus GIBBIUM, Scopoli

psyllioides, Czenpinski セマルヘウホンムシ
Diss. Zool.-med., p. 51, (*Scotias*) (1778).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Subfamily PTININAE

Genus PTINUS, Linné

fur, Linné ヘウホンムシ
Syst. Nat. X., p. 293, 33, (*Cimbyx*) (1758).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

kuronis, Ohta タイワンクロヘウホンムシ
Ins. Mat. IV., No. 3, p. 105, (1929).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Pic ザウタヘウホンムシ
Suppl. Ent. III., p. 8, (1914).
Loc. Distr.—Kankau.
Gec. Distr.—Formosa.

albidiceps, Pic シロアシヘウホンムシ
Suppl. Ent. III., p. 9, (1914).
Loc. Distr.—Kankau.
Gec. Distr.—Formosa.

ANOBIIDAE 番死蠹科

Genus SITODREPA, Thomson

panicea, Linné ジンサンシバンムシ
Fn. Suec., p. 145, (1761).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus GASTRALLUS, Jacquerin Duval

tuberculatus, Pic コブシバンムシ
Suppl. Ent. III., p. 10, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

testaceicornis, Pic ウスヒゲシバンムシ
Mélanges, XXXVI., p. 7, (1922).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **FALSOGASTRALLUS,** Pic

sauteri, Pic ザウタシバンムシ
Suppl. Ent. III., p. 10, (1914).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LASIODERMA,** Stephens

serricorne, Fabricius タバコシバンムシ
Ent. Syst. I., p. 240, (*Ptinus*) (17[illegible]).
Loc. Distr.—Anping, Tainan, Kankau.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **DORCATOMA,** Herbst

sibilica var. **subrufescens,** Pic ウスアカシバンムシ
Suppl. Ent. III., p. 11, (1914).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **THECA,** Mulsant et Ray

[illegible]latipennis, Pic タイワンシバンムシ
Echange, XXVIII., p. 46, (1912).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

BOSTRYCHIDAE 長蠹科

Genus **DINODERUS,** Stephens

minutus, Fabricius ナガシンクヒ
Syst. Ent., p. 54, (*Xylopertha*) (1775).
Loc. Distr.—Chikutoki.
Gen. Distr.—Widely distributed in tropical and subtropical region.

Genus **LICENOPHANES,** Lesne

carinipennis, Lewis セマダラナガシンクヒ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII., p. 338, (*Apate*) (1896).
Loc. Distr.—Hoozan, Kōsempo, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, India, Ceylon.

Genus **BOSTRYCHOPSIS**, LESNE

affinis, LESNE タイワンナガシンクヒ
Bull. Mus. Paris, p. 226-229, (*Bostrichus*) (1899).
Loc. Distr.—Taihôrin, Anping, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HETEROBOSTRYCHUS**, LESNE

aequalis, WATERHOUSE ホソナガシンクヒ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 215, pl. 16, f. 3, (*Bostrichus*) (1884).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo, Taihoku, Horisha, Nantô, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Malay, Siam, India, Nicobar, Andaman, Java, Formosa.

haematipennis, LESNE オホナガ ンクヒ
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 169-178, (*Bostrichus*) (1895).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Heitô.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa, Hainan, Burma, Andaman, Sylhet, Ceylon, Mauritius.

Genus **PARABOSTRYCHUS**, LESNE

acuticollis, LESNE カクムネナガシンクヒ
Bull. Mus. Paris, IV., p. 192, f. (1913).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **XYLOTHRIPS**, LESNE

flavipes, ILLIGER キアシツヤナガシンクヒ
Mag. I., p. 171, (*Rhizopertha*) (1801).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—India, Malay, Madagascar, Formosa.

Genus **XYLOPSOCUS**, LESNE

capucinus, FABRICIUS キバネナガシンクヒ
Mant. I., p. 36, (*Bostrichus*) (1787).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—China, Formosa, Borneo, Siam, India, Malay, East coast of Africa, Madagascar, Guinea, Guyana, Brasil.

bicuspis, LESNE コクロナガシンクヒ
Abeille, XXX., p. 73-104, pl. 1, 2, (1901).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kankau, Taihôrin.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

Genus **RHIZOPERTHA,** Stephens

dominicana, Fabricius オホムギナガシンクヒ（コナガシンクヒ）
Syst. El. II., p. 380, ♀, (1801).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—China, Formosa, Siam, Malay, Andamann, India, Ceylon, Aden, Africa.

LYCTIDAE 竹蠹科

Genus **LYCTUS,** Fabricius

Subgenus **XYLOTROGUS,** Stephens

brunneus, Stephens タケシンクヒムシ
Ill. Brit. III., p. 117, t. 18, f. 4, (1830).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

CIOIDAE 圓蕈蠹科

(*Cicidae*)

Genus **CIS,** Latreille

ornatus, Reitter マルキノコムシ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXII., p. 381, (1877).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

BUPRESTIDAE 吉丁蟲科

Tribe: **ACMAEODERINI**

Genus **ACMAEODERA,** Eschscholtz

luzonica, Nonfried キボシフナガタタマムシ
Berl. Ent. Zeitschr., p. 302, (1895).
Loc. Distr.—Hoppo, Kôsempo, Shinkwa, Kôshun.
Gen. Distr.—Siam, Philippines, Formosa.

Tribe: **CHRYSOCHROINI**

Genus **CHRYSOCHROA,** Solier

fulgidissima, Schoenherr ヤマトルリタマムシ（フタスヂアヲタマムシ，タマムシ，ヤマトタマ）
Syn. Ins. III., p. 229, (*Buprestis*) (1817).
Loc. Distr.—Musha, Shinchiku, Hoppo, Byôritsu, Ritôzan, Namakaban, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Loo-Choo, Formosa.

horsti, Waterhouse オガサハラルリタマムシ（ツマアカアヲタマムシ，オガサハラタマムシ）
Ann. Mag. Nat. Hist., p. 109, (1890).
Loc. Distr.—Kôshun?
Gen. Distr.—Japan proper, Bonin Islands, Formosa.

chinensis, CASTERNAU et GORY ルリタマムシ
Monogr. I., p. 7, t. 2, f. 5, (1835).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—India, Indo-China, Formosa.

vittata, FABRICIUS エゲリルリタマムシ
Syst. Ent., p. 216, (*Buprestis*) (1774).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Indo-China, Formosa.

Tribe: **CHALCOPHORINI**

Genus **CHRYSODEMA,** CASTERNAU et GORY

jucunda, CASTERNAU et GORY アヲムネスヂタマムシ
Monogr. I., p. 6, t. 2, f. 6, (1835).
Loc. Distr.—Kararu, K[illegible]au, Garambi, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa, Loo-Choo.

Genus **CHALCOPHORA,** SOLIER

yunnana, FAIRMAIRE タカサゴウバタマムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII., p. 24, (1888).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Indo-China, Tibet, Formosa, China, Loo-Choo.

satzumae, LEWIS サツマウバタマムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII., p. 334, (1896).
Loc. Distr.—Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Loo-Choo, Formosa.

japonica, GORY ヤマトウバタマムシ
Monogr. Suppl. IV., p. 81, t. 14, f. 77, (1840).
=*chinensis,* SCHAUFUSS, Nunquam otiosus III., p. 480, (1879).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, China, Formosa, India.

Tribe: **BUPRESTINI**

Genus **LAMPRA,** SPINOLA

cupreosplendens, KERREMANS ベニクロボシタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 203, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHILANTHAXIA,** H. DEYROLLE

sauteri, KERREMANS ザウタマルタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 110, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ANTAXIA**, Eschscholtz

aeneocuprea, Kerremans カラカネヒラタタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX. A. 8, p. 103, (1913).
Loc. Distr.—Banshoryô, Soʻkutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CHRYSOBOTHRINI**

Genus **CHRYSOBOTHRIS**, Eschscholtz

sauteri, Kerremans ルリムツボシタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 204, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

infranitens, Kerremans タカサゴムツボ[illegible]マムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7. p. 204, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **BELIONOTA**, Eschscholtz

fallaciosa, H. Deyrolle デイロウルカドアカタマムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. VIII., p. 84, (1864).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Malacca, Sumatra, Malay, Hindustan, China, Japan proper, Formosa.

prasina, Thunberg ツンベルグカドアカタマムシ
Nov. Sp. Ins. V., p. 90, (1798).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Africa, Madagascar, Andaman, India, Japan proper, Formosa.

intermedia, Lansberg ランスベルグカドアカタマムシ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. 148, t. 22, (1879).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Borneo, Philippines, Formosa.

Tribe: **AGRILINI**

Genus **CORAEBUS**, Castelnau et Gory

bajulus, H. Deyrolle ミドリナカボソタマムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. VII., p. 122, (1864).
Loc. Distr.—Taihôrin, Horisha, Shinchiku.
Gen. Distr.—India, China, Formosa, Loo-Choo.

sauteri, Kerremans ザウタナカボソタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 205, (1912).
Loc. Distr.—Anping, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

insulicola, KERREMANS タカサゴナカボソタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 205, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

aesopus, KERREMANS ルリナカボソタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. II, p. 111, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MELYBAEUS,** H. DEYROLLE

saundersi, KERREMANS ルリチビナカボソタマムシ
Mém. Soc. Ent. Belg., t. 1, p. 233, (1892).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **SAMBUS,** H. DEYROLLE

sauteri, KERREMANS ザウタムナビロタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 112, (1912).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

argenteus, KERREMANS マダラムナビロタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 104, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

horni, KERREMANS ホルンムナビロタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 104, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **AGRILUS,** STEPHENS

insulicola, KERREMANS シマノナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 205, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, KERREMANS タイワンナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 205, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

nigricinctus, KERREMANS フタホシミドリナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 206, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, KERREMANS ザウタナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 206, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

hornianus, KERREMANS ホルンナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 206, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

ajax, KERREMANS シラホシナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 207, (1912).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

mentor, KERREMANS カギナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 20[illegible] (1912).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

priamus, KERREMANS ミドリナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 207, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

auropictus, KERREMANS キンイロナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 208, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

minor, H. DEYROLLE チビナガタマムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XIII., p. 171, (1864).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

obnotatus, KERREMANS カラカネナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 208, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

myrmido, KERREMANS アカガネナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 208, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

discicollis, H. DEYROLLE ツマグロナガタマムシ
Ann. Soc. Ent. Belg., t. 8, p. 189, (1864).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Borneo, Sumatra, Formosa.

pyrrhus, KERREMANS コウセンナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 112, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

tyrtæus, KERREMANS タカハシナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 113, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

orestes, KERREMANS コイヅミナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 113, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

radivolus, KERREMANS カンカウナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 113, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

bacchus, KERREMANS シヤウジヤウナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 114, (1912).
Loc. Distr.—Sokutsu, Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

acastus, KERREMANS フクダナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 114, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

spiridion, KERREMANS ヒメアヲナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 114, (1912).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

ctesias, KERREMANS サビナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 115, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

tyndarus, KERREMANS ヒメカラカネナガタマムシ
Arch. Naturg., A. 11, p. 115, (1912).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

xantippus, KERREMANS ヒメアカガネナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 115, (1912).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

viduus, KERREMANS ソナンナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 105, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

intrusus, KERREMANS ミノワナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 105, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

omissus, KERREMANS ホソヤナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 106, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

sorocinus, KERREMANS ヒメナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 106, (1913).
Loc. Distr.—Banshoryô, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

lugubris, KERREMANS ヨミヂナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 107, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

sevilis, KERREMANS アサヒナガタマムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 8, p. 107, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

auriventris, SAUNDERS ミカンナガタマムシ
Journ. Linn. Soc. Zool., p. 517, (1873).
Loc. Distr.—Taihôku, Inrin, Shinchiku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **ENDELUS,** H. DEYROLLE

sauteri, KERREMANS ザウタエグリタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, p. 209, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

parallelus, KERREMANS ナガエグリタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 116, (1912).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TRACHYS,** FABRICIUS

horni, KERREMANS ホルンチビタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 11, p. 116, (1912).
Loc. Distr.—Kankau, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

flaviceps, KERREMANS キアシチビタマムシ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. 223, t. 36, (1892).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—India, Formosa.

sauteri, KERREMANS ザウタチビタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII, A. 7, p. 209, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

salicis, LEWIS ノミチビタマムシ
Journ. Linn. Soc. Zool. XXIV., p. 337, (*Brachys*) (1892).
Loc. Distr.—Taihōrinshō.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

formosana, KERREMANS タカサゴチビタマムシ
Arch. Naturg. LXXVIII., A. 7, 209, (1912).
Loc. Distr.—Taihōrinshō.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwanensis, OBENBERGER タイワンチビタマムシ
Casopis Csl. Spolec. Entom. c. XXVI., 1-2, p. 9-14, (1929).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

ELATERIDAE 叩頭蟲科

Subfamily AGRYPNINAE

Genus AGRYPNUS, ESCHSCHOLTZ

politus, CANDÈZE オホクロコメツキ
Monogr. Elat. I., p. 43, pl. 1, f. 2, (1857).
Loc. Distr.—Nantō, Taihoku, Horisha, Musha, Taihōrin, Kōsempo, Rikiriki, Kizan, Kankau, Hokuto, Chip-Chip.
Gen. Distr.—China, Formosa, Java.

Genus ADELOCERA, LATREILLE

kikuchii, MIWA キクチサビコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa XIX., No. 102, p. 226, (1929).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

tosta, CANDÈZE アカマダラサビコメツキ
Mongr. Elat. I., p. 129, (*Lacon*) (1857).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—India, Sunda Islands, Indo-China, Formosa.

Genus LACON, LAPORTE de CASTERNAU

formosanus, BATES タイワンオホサビキコリ
Proc. Zool. Soc. Lond. II., p. 348, (1866).
Loc. Distr.—Taitō, Horisha, Musha, Kwarenkō, Taihoku, Pilam, Kankau, Tainan, Sokutsu, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

bipapulatus, CANDÈZE ヒラタサビキコリ
Elat. Nouv. I., p. 11, (1865).
Loc. Distr.—Taihoku, Arisan, Taipin, Fuhōshō, Sokutsu, Hoozan.
Gen. Distr.—China, Formosa, Loo-Choo.

musculus, CANDÈZE シラキサビキコリ
Monogr. Elat. I., p. 141, (1857).
Loc. Distr.—Kwarenkō, Shichisei, Taihoku, Anping, Kôsempo, Shōkwa, Rokkiri, Fuhōshō, Kwori.
Gen. Distr.—South China, Formosa.

modestus, CANDÈZE アンピンサビキコリ
Monogr. Elat. I., p. 118, (1857).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—India, Burma, Sunda Islands, Formosa.

scrofa, CANDÈZE ヒメサビキコリ
Mém. Soc. Sc. Liège (2) V., p. 4, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

setiger, BATES トビイロサビキコリ
Proc. Zool. Soc. Lond. II., p. 348, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku, Hokuseiko, Horisha, Kôshun, Sokutsu, Taihôrin
Gen. Distr.—Formosa.

montanus, MIWA ミヤマサビキコリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa XIX., No. 102, p. 229, (1929).
Loc. Distr.—Shinchiku, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

kawamurae, MIWA カワムラサビキコリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 102, p. 230, (1912).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

tuberculipennis, MIWA コブサビキコリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 102, p. 230, (1929).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwanus, MIWA タイワンサビキコリ
Ins. Mats. II., No. 1, p. 13, pt. 1, f. 2, (1927).
Loc. Distr.—Baibara, Horisha, Mt. Taiko, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

sakaguchii, MIWA サカグチサビキコリ
Ins. Mats. II., No. 1, p. 1, pt. 1. f. 3, (1927).
Loc. Distr.—Shinchiku.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

uraiensis, Miwa ウライサビキコリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 102, p. 231, (1929).
Loc. Distr.—Urai.
Gen. Distr.—Formosa.

taciturnus, Candèze チュガタサビキコリ
Rév. Monogr., p. 60, (1874).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa, Laos.

tumens, Candèze ムナダカサビキコリ
Mém. Soc. Sc. Liège, (2) V., p. 4, (1873).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Japan proper, Cambodja, Formosa.

Genus **PARALACON,** Reitter

koshunensis, Miwa ナガデアンサビキコリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 102, p. 233, (1929).
Loc. Distr.—Kôshun, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

argillaceus, Solsky キバネデアシサビキコリ
Hor. Soc. Ent. Ross. VII., p. 360, (*Lacon*) (1870).
Loc. Distr.—Musha, Kwarenkô, Tattaka.
Gen. Distr.—East Siberia, Korea, Formosa.

argillaceus var. **davidi,** Fairmaire
Ann. Soc. Ent. Fr., p. 109, (*Lacon davidi*) (1878).
Loc. Distr.—Kaibuta.
Gen. Distr.—China, Indo-China, Korea, Formosa.

Genus **CAMPSOLACON,** Reitter

formosanus, Miwa フチバサビキコリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 102, p. 235, (*Neolacon*) (1929).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **HEMIRRHIPINAE**

Genus **ALAUS,** Eschscholtz

putridus, Candèze フタモンウバタマコメツキ
Monogr. Elat. I., p. 233, pt. 4, f. 15, (1857).
=*larvatus,* Candèze, Rév. Monogr. p. 141, (1874).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Taipin. Kusukusu, Taihoku, Sokutsu, Kôsempo, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Java, Malacca, Formosa. South China, Indo-China. Bonin Islands.

pini, LEWIS マツノウバタマコメツキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 30, (1894).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

elongatus, MIWA ナガウバタマコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 102, p. 237, (1929).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

berus, CANDÈZE ウバタマコメツキ
Elat. Nouv. I., p. 15, (1865).
Loc. Distr.—Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

mus, MIWA シモフリウバタマコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 102, p. 238, (1929).
Loc. Distr.—Arisan, Kwarenkō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TETRIGUS,** CANDÈZE

lewisi, CANDÈZE チヤイロヒゲコメツキ
Mém. Soc. Sc. Liège (2) V., p. 6, (1873).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper, Korea.

Subfamily **OXYNOPTERINAE**

Genus **PECTOCERA,** HOPE

fortunei, CANDÈZE ヒゲコメツキ
Mém. Soc. Sc. Liège, (2) V., p. 6, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Rikiriki.
Gen. Distr.—Japan proper, Loo-Choo, China, Formosa.

Subfamily **CHALCOLEPIDIINAE**

Genus **CAMPSOSTERNUS,** LATREILLE

auratus, DRURY オホアヲコメツキ
Ill. Exot. Ins. II., 65, pt. 35, f. 3, (*Elater*) (1773).
Loc. Distr.—Nantō, Shinten, Kōshun, Horisha, Hoozan, Kuraru.
Gen. Distr.—China, Tonkin, Annan, Cambodja, Hainan, Formosa.

gemma, CANDÈZE アカヘリオホアヲコメツキ
Monogr. Elat. I., p. 344, (1857).
Loc. Distr.—Urai, Musha, Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Shanghai, Formosa.

gemma var. **watanabei,** MIWA ワタナベオホアヲコメツキ
Ins. Mats. II., No. I, 15, (1929).
Loc. Distr.—Hoppo, Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa.

milabilis, FLEUTIAUX フレシヨオホアヲコメツキ
Bull. Mus. Paris, II., No. 4, p. 409, (1930).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **DICLEPIDIINAE**
Genus **SEPHILUS,** CANDÈZE

formosanus, SCHWARZ ヒラアシコメツキ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 319, (1902).
Loc. Distr.—Horisha, Kuraru.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **CONODELINAE**
Genus **ANATHESIS,** CANDÈZE

laconoides, CANDÈZE サビキコリダマシ
Elat. Nouv. I., p. 21, (1866).
Loc. Distr.—Kuraru, Koshun.
Gen. Distr.—Malacca, Tonkin, Laos, Siam, Sumatra, New-Guinea, Hainan, Formosa.

Genus **AEOLODERMA,** FLEUTIAUX

brachmana, CANDÈZE カンショヴグロコメツキ
Monogr. Elat. II., p. 238 et 345, (*Aeolus*) (1859).
Loc. Distr.—Taichiu, Nantô, Taihoku.
Gen. Distr.—Bengal, Burma, Annan, Tonkin, Hindustan, Ceylon, Java, Sumatra, Borneo, Celebes, Malay, Philippines, Formosa.

sinensis, CANDÈZE タイワンキマダラコメツキ
Monogr. Elat. II., p. 283 et 346, (*Aeolus*) (1859).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôshun, Kagi, Taihoku, Anping.
Gen. Distr.—Cochin-China, Cambodja, Annan, Laos, Tonkin, China, Burma, Malacca, Bengal, Hindoustan, Sumatra, Celebes, Formosa.

Genus **HETERODERES,** LATREILLE

intermedius, CANDÈZE アンピンフナガタコメツキ
Elat. Nouv. V., p. 32, (1893).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Indo-China, Formosa.

triangularis, ESCHSCHOLTZ ミツカドフナガタコメツキ
Entomogr. I., p. 73, (*Elater*) (1822).

Loc. Distr.—Taihōrin, Kankau, Anping.
Gen. Distr.—Indo-China, Philippines, Formosa.

albicans, Candèze ウスイロフナガタコメツキ
Elat. Nouv. II., p. 23, (1878).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Kuraru, Chipon, Shinkwa.
Gen. Distr —Philam, Tonkin, Cochin-China, Laos, Bengal, Formosa.

oblitus, Candèze カンショフナガタコメツキ
Monogr. Elat. II., p. 354 et 361, (1859).
Loc. Distr.—Shinkwa, Taihoku, Arisan.
Gen. Distr.—Indo-China, Formosa.

Genus **PRODRASTERIUS,** Fleutiaux

brahminus, Candèze フタテンチビコメツキ
Monogr. Elat. II., p. 422 et 426, (*Drasterius*) (1859).
Loc. Distr.—Rōnō.
Gen. Distr.—Himaraya, Bengal, Tonkin, Annan, Cambodja, Cochin-China, Formosa.

sacchari, Miwa カンショキボシコメツキ
Ins. Mats. II., No. 1, p. 15, pt. 1, f. 6, (*Heterodercs*) (1927).
Loc. Distr.—Kyōshitō.
Gen. Distr.—Formosa.

6-punctatus, Miwa ムツテンチビコメツキ
Ins. Mats. II., No. 1, p. 15, pt. 1, f. 5, (*Heterodercs*) (1927).
Loc. Distr.—Kyōshitō, Rinkiho.
Geu. Distr.—Formosa.

Subfamily **ELATERINAE**

Genus **ELATER,** Linné

bimaculatus, Miwa フタモンアカコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 487, (1929).
Loc. Distr.—Rantaizan.
Gen. Distr.—Formosa.

cambodiensis, Fleutiaux カンボヂヤコメツキ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVII., p. 214, p. 214, (1918).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Cambodja, Formosa.

formosensis, Miwa タイワンコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 487, (1929).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MEGAPENTHES,** Kiesenwetter

bispinicollis, Miwa トゲムネコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 488, (1929).

Loc. Distr.—Baibara, Suisha.
Gen. Distr.—Formosa.

granulipennis, MIWA サメハダコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa XIX., No. 105, p. 489, (1929).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

horishanus, MIWA カドアカコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 489, (1929).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

robustus, MIWA フトコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX, No. 105, p. 490, (1929).
Loc. Distr.—Niitaka.
Gen. Distr.—Formosa.

ligatus, CANDÈZE タイワンタテヲマコメツキ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XII., p. 124, (1878).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinten, Urai, Maruyama, Sharyôtô, Ranrun, Rantaizan, Horisha, Shinkwa, Kôshun, Kôsempo, Alikang.
Gen. Distr.—Sumatra, Nias, Borneo, Burma, Hongkong, Formosa.

bicarinatus, LEWIS ヒゲナガホソコメツキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., (1894).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

koshunensis, MIWA コウシュンホソコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 494, (1929).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

sonami, MIWA ソナンホソコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 494, (1929).
Loc. Distr.—Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MELANOXANTHUS,** ESCHSCHOLTZ

melanocephalus, FABRICIUS ツマグロキコメツキ
Spec. Ins. I., p. 272, (*Elater*) (1781).
Loc. Distr.—Kagi, Shinkwa, Anping.
Gen. Distr.—Loo-Choo, East India, Tonkin, Formosa, Comoro, Seychelles, Malacca, Madagascar, Zanzibar.

nigripennis, FLEUTIAUX クロバマダラコメツキ
Encycl. Ent. Col. (Elat. Ind-Ch.), p. 52, (1929).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa.

montivagus, Miwa セマダラコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 105, p. 491, (1929).
Loc. Distr.—Arisan, Kwarenkô, Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa.

4-guttatus, Miwa ヨツモンマダラコメツキ
Ins. Mats. II., No. , p. 21, pl. 1, ♂g. 19, ♀, (1927).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

luzonicus, Fleutiaux ルソンマダラコメツキ
Philipp. Journ. Sc. D. IX., p. 444, (1915).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **PENGAMETHES,** Fleutiaux

parallelaris, Miwa フチグロホソコメツキ
Ins. Mats. II., No. 1, p. 21, pl. 1, fig. 18, (*Megapenthes*) (1929).
Loc. Distr.—Kyûhabon, Baibara, Hinokiyama.
Gen. Distr.—Formosa.

oblongicollis, Miwa ムネナガホソコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa XIX., No. 105, p. 492, (1929).
Loc. Distr.—Kusukusu, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **PHYSORRHININAE**

Genus **ANCHASTUS,** Le Conte

casternaui, Candèze カステルノアシブトコメツキ
Elat. Nouv. II., p. 24, (1878).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Den. Distr.—Siam, Laos, Formosa.

Subfamily **HYPNOIDINAE**

Genus **ARRHAPHES,** Candèze

dyptychus, Candèze フタモンマルチビコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 99, t. 2, f. 8, (*Arhaphes*) (1860).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **HYPNOIDUS,** Stephens

nitobei, Miwa ニトベチビコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 2, (1930).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—Formosa.

tutus, Lewis ムネスヂチビコメツキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 186, (*Cryptohypnus*) (1894).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **QUASIMUS,** Gozis

ovalis, Candèze マルケシコメツキ
Mém. Soc. Sc. Liège (2) V., p. 11, (*Cryptohypnus*) (1873).
Loc. Distr.—Kōshun, Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Sumatra.

shirakii, Miwa シラキケシコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 3, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

horishanus, Miwa ホリシヤケシコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 3, (1930).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Hinokiyama, Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa.

luteipes, Candèze キアシケシコメツキ
Mém. Soc. Sc. Liège, (2) V., p. 15, (*Cryptohypnus*) (1873).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subfamily **CARDIOPHORINAE**

Genus **CARDIOTARSUS,** Eschscholtz

rarus, Miwa ヒラアシハナコメツキ
Ins. Mats. II., 2, p. 108, f. 4, (1927).
Loc. Distr.—Musha, Nōkō.
Gen. Distr.—Formosa.

pallidipes, Miwa キヒラアシハナコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 5, (1930).
Loc. Distr.—Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa.

humeralis, Miwa カタウスヒラアシハナコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 6, (1930).
Loc. Distr.—Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PARACARDIOPHORUS,** Schwarz

cryptohypnoidus, Miwa チビハナコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX, No. 106, p. 6, (1930).
Loc. Distr.—Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa.

devastans, MATSUMURA カンシヨクロハナコメツキ
Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII., p. 145, (*Cardiophorus*) (1911).
Loc. Distr.—Kôshun, Horisha, Taitô, Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CARDIOPHORUS,** ESCHSCHOLTZ

adjutor, CANDÈSE アカアシハナコメツキ
Mém. Soc. Sc. Liège, (2). V., p. 17, (1873).
Loc. Distr.—Musha, Tainan, Shinkwa.
Gen. Distr.—Japan proper, Loo-Choo, Formosa.

yanagiharae, MIWA ヤナギハラハナコメツキ
Ins. Mats. II., 2, p. 109, f. 5, (1927).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

nothus, CANDÈZE クロハナコメツキ
Elat. Nouv. I., p. 43, (1865).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

comptus, CANDÈSE セスヂハナコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 202, (1860).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—Sonth Hindustan, Form sa.

systenus, CANDÈZE コゲチヤナガハナコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 210, t. 13, f. 29, (1860).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Hindustan, Loo-Choo, Formosa.

formosanus, MATSUMURA カンシヨハナコメツキ
Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII., p. 145, (1911).
Loc. Distr.—Ensuikô, Taihoku, Arisan, Kôshun, Shinchiku, Horisha, Taitô, Kôtô-sho, Tabo.
Gen. Distr.—Formosa.

anpingensis, MIWA アンピンハナコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., 2, p. 91, (1930).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

servilis, CANDÈZE チヤイロケシハナコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 203, (1860).
Loc. Distr.—Shokwa, Kôshun.
Gen. Distr.—Bengal, Cambodja, Annan, Formosa.

sonani, MIWA ソナンハナコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 108, p. 9, (1930).
Loc. Distr.—Shinchiku, Kôshun, Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

baibaranus, MIWA バイバラハナコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 10, (1930).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

carduelis, CANDÈZE ムネアカヨツモンハナコメツキ
Elat. Nouv. I., p. 39, (1865).
=*rufithorax,* MIWA Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 10, f. (1930).
Loc. Distr.—Horisha, Taihoku, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Singapore, Sumatra, Java, Cochin-China, Canbodja.

Genus **CARDIOHYPNUS,** FLEUTIAUX

coomani, FLEUTIAUX ジウジケシハナコメツキ
Bull. Soc. Ent. Fr. p. 185, (1925).
=*sonani,* MIWA, Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 11, f. (1930).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa, Tonkin.

Subfamily **MELANOTINAE**

Genus **PSELLIS,** CANDÈZE

formosana, SZOMBÀTHY ヒラボソクシコメツキ
Ann. Mus. Nat. Hung. VIII., p 446, f. (1910).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NEODIPLOCONUS,** HYSLOP

angulatus, CANDÈZE チヤイロホソクシコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 297, (*Diploconus*) (1860).
Loc. Distr.—Musha, Shinchiku, Kusukusu, Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa, Hongkong, Tonkin, Shingapore.

castaneus, MIWA クリイロホソケシコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 92, (1930).
Loc. Distr.—Kōsempo, Alikang, Horisha, Kagi, Kanshirei, Rokki.
Gen. Distr.—Formosa.

ciprinus, CANDÈZE アカホソクシコメツキ
Elat. Nouv. I., p. 47, (*Diploconus*) (1864).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Formosa, Luzon.

elegans, SZOMBÀTHY ツマグロアカホソクシコメツキ
Ann. Mus. Nat. Hung. VIII., p. 385, (*Diploconus*) (1910).
Loc. Distr.—Kōsempo, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

elegans var. **takanoi,** MIWA

Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 59, (1930).

Loc. Distr.—Horisha.

Gen. Distr.—Formosa.

melanopterus, CANDÈZE アカアシホソクシコメツキ

Elat. Nouv. I., p. 46, (*Diploconus*) (1864).

Loc. Distr.—Kōshun.

Gen. Distr.—Sumatra, Indo-China, Formosa.

sanguinicollis, MIWA ムネアカホソクシコメツキ

Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 59, (1930).

Loc. Distr.—Musha, Kwarenkō, Arisan, Horisha.

Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SPHENISCOSOMUS,** SCHWARZ

restrictus, CANDÈZE クロオホクシコメツキ

Elat. Nouv. I., p. 47, (*Melanotus*) (1864).

Loc. Distr.—Baibara.

Gen. Distr.—Japan proper, China, Korea, Formosa.

horishanus, MIWA ホリシヤオホクシコメツキ

Ins. Mats. II., 2, p. 111, f. 9, (1927).

Loc. Distr.—Baibara.

Gen. Distr.—Formosa.

pilosulus, MIWA ケブカオホクシコメツキ

Ins. Mats. II., 2, p. 110, f. 8, (1927).

Loc. Distr.—Namakaban.

Gen. Distr.—Formosa.

melanotoides, MIWA ニセクシコメツキ

Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 61, (1930).

Loc. Distr.—Arisan, Musha, Kwarenkō, Horisha.

Gen. Distr.—Formosa.

frequens, MIWA ヒラタクシコメツキ

Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 61, (1930).

Loc. Distr.—Horisha, Arisan, Musha, Niitaka, Kyuhabon, Nōkō.

Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CREMNOSTETHUS,** SCHWARZ

telum, CANDÈZE オホナガクシコメツキ

Elat. Nouv. V., p. 49, (*Melanotus*) (1893).

Loc. Distr.—Rōnō.

Gen. Distr.—Darjeeling, Formosa.

Genus **MELANOTUS,** ESCHSCHOLTZ

ventralis, CANDÈZE ハラアカクシコメツキ
Mongr. Elat. III., p. 324, (1860).
Loc. Distr.—Horisha, Rikiriki.
Gen. Distr.—Formosa.

venalis, CANDÈZE コウセンクシコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 323, (1860).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

ebeninus, CANDÈZE コウトウクシコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 335, (1860).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

umber, BATES ベイツクシコメツキ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 349, t. 5, f. 6, (1866).
Loc. Distr.—Ranrun.
Gen. Distr.—Formosa.

regalis, CANDÈZE フトクシコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 325, t. 5, f. 6, (1860).
Loc. Distr.—Horisha, Kôshun, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Indo-China, China, Formosa.

fuscus, FABRICIUS タイワンクシコメツキ
Syst. El. II., p. 228, (*Elater*) (1801).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, North-India, Burma, Siam, Indo-China, Sumatra, Amboina, Malay, Formosa.

tamsuyensis, BATES カンショクコメツキ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 349, (1866).
Loc. Distr.—Arisan, Horisha, Musha, Kagi, Kappanzan, Taihoku, Baibara, Tompo, Funkiko, Shinchiku, Heitô, Kwarenkô, Taitô, Tainan, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Loo-Choo.

rufiventris, MIWA オホハラアカクシコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 64, (1930).
Loc. Distr.—Horisha, Rikiriki, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **METRIAULACUS,** SCHWARZ

badiipennis, CANDÈZE アカバネツヤクシコメツキ
Monogr. Elat. III., p. 334, (*Melanotus*) (1860).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—North-India, Formosa.

formosanus, MIWA ホソツヤクシコメツキ
Ins. Mats. II., 2, p. 113, f. 10, (1927).
Loc. Distr.—Baibara, Kusukusu.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **ATHOINAE**

Genus **PARATHOUS,** FLEUTIAUX

sanguineus, FLEUTIAUX ニイタカベニコメツキ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVI., p. 242, (1918).
=*Athous suleicollis,* MIWA, Ins. Mats. II., No. 3, p. 136, pl. v. f. 7, (1928).
Loc. Distr.—Rakuraku, Arisan.
Gen. Distr.—Tonkin, Cambodja, Formosa.

Genus **ATHO[illegible],** ESCHSCHOLTZ

temperatus, MIWA タイワンウスバコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 66, (1930).
Loc. Distr.—Arisan, Musha, Kwarenkō.
Gen. Distr.—Formosa.

nigripennis, MIWA クロバネアカホソコメツキ
Ins. Mats. II., 3, p. 136, pl. V, f. 6, (1928).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

rufangulus, MIWA カドアカウスアヲコメツキ
Ins. Mats. II., 3, p. 137, pl. V, f. 8, (1928).
Loc. Distr.—Kyûhabon, Horisha, Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

rufangnlus var. **nigricollis,** MIWA クロムネウスアヲコメツキ
Ins. Mats. II., 3, p. 137, pl. V, f. 9, (1928).
Loc. Distr.—Arisan, Ranrun, Tamaho.
Gen. Distr.—Formosa.

rufangulus var. **ruficollis,** MIWA アカムネウスアヲコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 68, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

rufithorax, MIWA ムナアカウスバコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 92, (1930)
Loc. Distr.—Taihôrin, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

tattakensis, MIWA タツタカマルムネコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 38, pl. 1, f. 1, (*Paralima*) (1928).
Loc. Distr.—Tattaka.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TAIWANATHOUS,** MIWA

arisanus, MIWA アリサンウスバコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 107, p. 68, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **CORYMBITINAE**

Genus **CORYMBITES,** LATREILLE

formosensis, MIWA タイワンシモフリコメツキ
Ins. Mats. II., No. 3, p. 139, pl. V, f. 12, (1928).
Loc. Distr.—Sōzan, Taihoku, Tattaka.
Gen. Distr.—Formosa.

formosensis var. **mushanus,** MIWA ムシヤヒラタコメツキ
Ins. Mats. II., No. 3, p. 139, pl. V, f. 13, (1928).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

speciosus, MIWA ヒメルリヒラタコメツキ
Ins. Mats. II., No. 3, p. 144, pl. V, f. 24, (1928).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

gratus var. **fuscipes,** MIWA カラカネヒラタコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXI, No. 113, p. 72, (1931).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **SENODONINAE**

Genus **PENIA,** HOPE

eschscholtzi, HOPE ムクゲセマルコメツキ
in Gray's Zool. Misc., p. 26, (1831).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Nepal, Formosa.

Genus **CSIKIA,** SZOMBÀTHY

taiwana, MIWA チヤイロツヤマルコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 93, (1930).
Loc. Distr.—Taihōrinshō, Baibara, Arisan, Kwarenkō.
Gen. Distr.—Formosa.

dimatoides, SZOMBÀTHY キイロツヤマルコメツキ
Ann. Mus. Nat. Hung. VIII., p. 360, f. 2, 3, (1910).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily LUDIINAE

Genus LUDIUS, Berthold

niponensis, Lewis クロナガコメツキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 264, (1894).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sieboldi, Candèze オホナガコメツキ
Mém. Soc. Sc. Liège, (2) V., p. 27, (1873).
Loc. Distr.—Baibara, Horisha, Musha, Sôkutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus NEOTRICHOPHORUS, Jacobson

plebejus, Candèze コナガコメツキ
Mém. Soc. Sc. Liège (3) V., p. 28, (*Ludius*) (1873).
Loc. Distr.—Taihoku, Anping, Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Loo-Choo, Formosa.

carinicephalus, Miwa ヒメコナガコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 205, (1931).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus APHANOBIUS, Eschscholtz

alaomorphus, Candèze エゲリホソナガコメツキ
Monogr. Elat. IV., p. 319, t. 4, f. 11, (1863).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—Formosa, South-China, Indo-China, Malay, Burma, India.

longithorax, Wiedeman チヤバネホソナガコメツキ
Zool. Mag. II., 1, p. 106, (*Elater*) (1823).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Sunda-Islands, Philippines, Formosa.

Genus PARALLELOSTETHUS, Schwarz

acutus, Candèze クロフナガタコメツキ
Monogr. Elat. IV., p. 299. t. 4, f. 3, (*Ludius*) (1863).
Loc. Distr.—Kôshun, Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Java, Formosa.

Genus LUDIGENUS, Candèze

politus, Candèze ナガムナビロコメツキ
Monogr. Elat. IV., p. 326, (1863).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Indo-China, Philippines, Formosa.

Genus **SCELISUS**, CANDÈZE

sanguineus, CANDÈZE ヨツテンオホベニコメツキ
Monogr. Elat. IV., p. 328, t. 5, f. 1, (1863).
Loc. Distr.—Rōnō.
Gen. Distr.—India, Formosa, Nepal.

Genus **AGRIOTES**, ESCHSCHOLTZ

sonanis, MIWA ソナンムナボソコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 45, pl. 1, f. 10, (1928).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

nokozanus, MIWA ノウコウムナボソコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 45, pl. 1, f. 11, (1928).
Loc. Distr.—Nōkō.
Gen. Distr.—Formosa.

fuscus, MIWA チヤイロムナボソコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 93, (1930).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

angustatus, MIWA ホソクロムナボソコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 46, pl. 1, f. 12, (1928).
Loc. Distr.—Kuyania.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **AGONISCHIUS**, CANDÈZE

obscuripes, GYLLENHAL ツヤコメツキ
in Schönh. Syn. Ins. III., Apdend. p. 131, (1817).
Loc. Distr.—Kōsempo, Alikang, Kankau, Tainan, Taihorin.
Gen. Distr.—Himalaya, Hindustan, Cochin-China, Tonkin, China, Formosa, Loo-Choo, Japan proper.

obscuripes var. **caschmirensis**, KOLLAR et REDTENBACHER ムラサキツヤコメツキ
in Hügel. Kaschm., p. 507, (1848).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—India, Formosa.

obscuripes var. **ruficephalus**, MIWA ヴアカツヤコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 48, (1928).
Loc. Distr.—Kōshun, Kankkau, Kōsempo.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

obscuripes var. **sanguinicollis**, MIWA ムナアカツヤコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 48, (1928).
Loc. Distr.—Uraisha, Kōshun, Kurarn, Kankau, Chikutōki, Taihōrin, Alikang,
Gen. Distr.—Formosa.

obscuripes var. **brunneus,** Miwa チヤイロツヤコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 48, (1928).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara, Kōsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

obscuripes var. **marginicollis,** Miwa ムナヘリツヤコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 48, (1928).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

obscuripes var. **taikozana,** Miwa タイコウツヤコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 49, (1928).
Loc. Distr.—Taikozan. Kōsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa,

obscuripes var. **candezellus,** Miwa キバネツヤコメツキ
Monogr. Elat. IV., p. 421, (obscuripes [illegible] b.) (1863).
Ins. Mats. III., No. 1, p. 49, (1928) (nom. nov.)
Loc. Distr.—Horisha, Tainan. Kōsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Indo-China.

gracilis, Miwa キイロヒメツヤコメツキ
Wien. Ent Zeit. XLVII., p. 205, (1931).
Loc. Distr.—Kankau, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

vittiger, Heyden クロヘリツヤコメツキ
Hor. Soc. Ent. Ross. XXI., p. 267, (1887).
Loc. Distr.—Kwarenkō, Taitō. Alikang, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa, Korea, Loo-Choo.

mushanus, Miwa ムシヤツヤコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 47, pl. 1, f. 15, (1928).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Miwa タイワンツヤコメツキ
Ins. Mats. II., No. 1, p 19, pl. 1, fig. 13, (*Megapenthes*) (1927).
Loc. Distr.—Taito, Kankau, Niitaka.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **AGRIOTIDES,** Schwarz

tonkinensis, Fleutiaux トンキンマルツヤコメツキ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII., p. 690 (*Silesis*) (1894).
=*pallidiangulus,* Miwa, Ins. Mats. III., No. 1, p. 46, pl. I, f. 13, (*Agriotes*) (1928).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinchiku, Horisha, Niitaka, Kōsempo, Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Tonkin, Annam, Formosa.

tonkinensis var. **formosana,** Miwa タイワンマルツヤコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 46, pl. I, f. 14, (1928).

Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **GLYPHONYX**, Candèze

rubricollis, Miwa セアカクチボソコメツキ
Ins. Mats. III., No. 1, p. 49, pl. 1, f. 16, (1928).
Loc. Distr.—Arisan, Horisha, Kagi, Takesaki, Ranrun, Kôshun, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

longulus, Miwa ナガクチボソコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 94, (1930).
Loc. Distr.—Kôsempo, Horisha, Rônô.
Gen. Distr.—Formosa.

arisanus, Miwa アリサンクチボソコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 206, (1931).
Loc. Distr.—Taihôrin, Arisan, Kanshirei.
Gen. Distr.—Formosa.

brunneipennis, Miwa チャバネクチボソコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 206, (1931).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

kankaui, Miwa カンカウクチボソコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 206, (1931).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Miwa ザウタクチボソコメツキ
Wein. Ent. Zeit. XLVII., p. 207, (1931).
Loc. Distr.—Taihôrin, Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

castaneus, Miwa クリイロクチボソコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 207, (1931).
Loc. Distr.—Taihôrin, Taihôrinshô, Horisha, Gyochi.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SILESIS**, Candèze

absimilis, Candèze オホクチブトコメツキ
Monogr. Elat. IV., p. 463, (1863).
Loc. Distr.—Taihôku.
Gen. Distr.—China, Formosa.

mutabilis, Bates タイワンクチブトコメツキ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 349, (1866).
Loc. Distr.—Taichiu, Shokwa.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, MIWA ザウタクチブトコメツキ
Wien. Ent. Zeit. XLVII., p. 96, (1930).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kōsempo, Taihōrin, Taihōrinshō, Arisan, Horisha, Musha, Tabo, Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **DENTICOLLINAE**

Genus **DENTICOLLIS,** PILLER et MITTERBACHER

puerilis, MIWA ミヤマベニコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXI., No. 113, p. 83, (1931).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

mounaldaui, MIWA ムシヤベニコメツキ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXI., No. 113, p. 83, (1931).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PLECTROSTERNUS,** LACORDAIRE

rufus, LACORDAIRE ツヤハダオニコメツキ
Gen. Col. IV., 10, p. 228, (1857).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—India, Indo-China, Formosa.

Genus **HEMIOPS,** CASTERNAU

flava, CASTERNAU クビマルキコメツキ
in Silberm. Rev. Ent. IV., p. 15, (1836).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Ryohen, Niitaka, Kōshun, Kwarenkō, Taitō.
Gen. Distr.—India, China, Indo-China, Philippines, Sunda Islands, Formosa.

MELASIDAE 偽叩頭蟲科

Subfamily **EUCNEMINAE**

Genus **PTEROTARSUS** GUÉRIN-MÉNÉVILLE

auricolor, BONVOULOIR キンケコメツキダマシ
Mon. Eucn., p. 808, 821, t. 39, f. 8, (*Galba*) (1875).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara, Kōshun.
Gen. Distr.—New Guinea, Celebes, Sumatra, Philippines, Formosa.

bonvouloiri, FLEUTIAUX アリカンコメツキダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. XCII., p. 304, 308, (1923).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—India, Philippines, Molucca, New-Guinea, Formosa.

chrysocomus, HOPE アカガネコメツキダマシ
Trans. Ent. Soc. Lond. IV., p. 14, t. f. 3a-g, (1845).
Loc. Distr.—Kôtôsho, Kôshun.
Gen. Distr.—India, Malacca, Indo-China, Philippines, China, Formosa, Java, Borneo.

Genus **RAAPIA,** FLEUTIAUX

sauteri, FLEUTIAUX ザウタコメツキダマシ
Bull. Soc. Ent. Fr. p. 206, (1929).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **[illegible]DOCERUS,** BONVOULOIR

malaisiensis, BONVOULOIR マレイコメツキダマシ
Mon. Eucn., p. 450, t. 22, f. 4, (1872).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—Malay, Indo-China, Philippines, Formosa.

Genus **DORMAEOLUS,** KIESENWETTER

semigriseus, BONVOULOIR コウトウコメツキダマシ
Mon. Eucn., p. 199, 238, t. 10, f. 7, (1871).
Loc. Distr.—Kôtôsho?
Gen. Distr.—Formosa, Malay, Sunda Islands.

Genus **FORNAX,** CASTERNAU

concolor, BLANCHARD クロコメツキダマシ
Voy. Pole Sud. Col., p. 92, t. 6, f. 14, (*Eucnemis*) (1853).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—India, Sunda Islands, Malay, Formosa.

tumidicollis, REDTENBACHER オホチヤイロコメツキダマシ
Reise Novara, Col., p. 92, (1867).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Borneo, Malay, India, Formosa.

Genus **SCYTHON,** CASTERNAU

coloratus, BONVOULOIR ツマグロアカコメツキダマシ
Mon. Eucn. p. 493, 494, t. 24, f. 6, ♀, 7, ♂, (1872).
Loc. Distr.—Kôtôsho?
Gen. Distr.—Sunda Islands, Formosa.

Subfamily **DIRHAGINAE**

Genus **BALISTICA,** MOTSCHULSKY

picipes, MOTSCHULSKY チビコメツキダマシ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIV., I, p. 116, t. 9, f. 7, (1861).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, New Caledonia, Philippines, Formosa.

Genus **DIRHAGUS,** LATREILLE

ramosus, FLEUTIAUX クシヒゲコメツキダマシ
Bull. Mus. Paris, p. 24, (*Microrhagus*) (1902).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

RHIPICERIDAE 櫛角蟲科

Tribe: **RHIPICERINI**

Genus **CALLIRRHIPIS,** LATREILLE

antiqua, WATERHOUSE クロナガクシヒゲ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 384, ♂, (1877).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

dissimilis, WATERHOUSE ナガクシヒゲ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 380, ♀, (1877).
Loc. Distr.—Taitô, Kôshun.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

formosana, PIC タイワンナガクシヒゲ
Echange, XXVIII., p. 6, ♂, (1912).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HORATOCERA,** LEWIS

similis, MIWA タイワンクビアカクシヒゲ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVIII., No. 99, p. 375, (1928).
Loc. Distr.—Shinchiku, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ENNOMETES,** PASCOE

horni, EMDEN ホルンオホクシヒゲ
Ent. Mitteil. XIII., f. p. 30, (1924).
Loc. Distr.—Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SIMIANELUS**, EMDEN

melanocephalus, EMDEN アカクシヒゲ
Ent. Mitteil. XIII., p. 33, f, (1924).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **SANDALINI**

Genus **SANDALUS**, KNOCH

sauteri, EMDEN セスヂクチキクシヒゲ
Ent. Mitteil. XIII., p. 28, f. 1, (1924).
Loc. Distr.—Hoozan, Raisha.
Gen. Distr.—Formosa.

truncatus, BOURGEOIS セマルクチビシヒゲ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 119, ♂, (1896).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

CEBRIONIDAE 偶節角科

Genus **CEBRIORHIPIS**, CHEVROLAT

striatulus, BOURGEOIS スヂクシヒゲダマシ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 117, ♂, (1896).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Division IV. HETEROMERA 異節族

TENEBRIONIDAE 偶歩行蟲科

Ssbfamily **BLAPTINAE**

Genus **TAGONOIDES**, FAIRMAIRE

delavayi, FAIRMAIRE デラベイオサダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI., p. 343, (1886).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Yunnan, Formosa.

Genus **BRAPS**, FABRICIUS

japonensis, MARSEUL ヤマトオサダマシ
Abeille, XVII., Nouv. et Faits. I., p. 99, (1879).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China.

moerens, ALLARD ヒマラヤオサダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) X., p. 319, (1880).
Loc. Distr.—Shinchiku, Horisha.
Gen. Distr.—Thibet, Himaraya, Formosa.

Subfamily **PLATYSCELINAE**

Genus **PLATYSCELIS,** LATREILLE

strigicollis, LEWIS セマルオサダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV., p. 447, (1895).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—Formosa, India.

Subfamily **PEDININAE**

Genus **PLATINOTUS,** FABRICIUS

punctatipennis, MULSANT ハバビロオサダマシ
Mém. Acad. Lyon, p. 270, (1852).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **PSEUDOBLAPS,** GUÉRIN-NÉNÉVILLE

crenata, FABRICIUS オホゴモクダマシ
Sepc. Ins. I., p. 322, (*Blaps*) (1781).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, India.

javana, WIEDEMANN ジャバゴモクダマシ
Zool. Mag. I., 3, p. 163, (1819).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, China, Burma, Tenasserim, Siam, Sunda Islands, North India.

Genus **PENTHICOIDES,** FAIRMAIRE

seriatoporus, FAIRMAIRE ホソゴモクダマシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XL., p. 20, (1896).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Genus **PEDINUS,** LATREILLE

strigosus, FALDERMANN アシナガゴモクダマシ
Mém. Acad. Petr. Sav. etr., p. 410, (1835).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Mongoria, China, Korea, Formosa.

Genus **MICROPEDINUS**, Lewis

pallidipennis, Lewis キバネケシスナモグリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. p. 380, (1894).
Loc. Distr.—Taipin?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

algae, Lewis ケシスナモグリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 379, (1894).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **MESOMORPHUS**, Seidlitz

villiger, Blanchard コガシラスナモグリ
Voy. Pôle Sud. IV., p. 154, t. 10, f. 15, (1853).
Loc. Distr.—Kankau, [illegible]shoryô, Pilam, Tainan, Horisha, Hôkotô, Rikiriki, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Japan proper, South Asia, Tropical Africa, Madagascar, Australia.

Subfamily **OPATRINAE**

Genus **SCLERON**, Hope

ferrugineum, Fabricius サビスナモグリ
Syst. El. I., p. 118, (1801).
Loc. Distr.—Tainan, Anping, Hoozan.
Gen. Distr.—South China, India, Tonkin, Philippines, Java, Sumatra, Formosa.

Genus **TRIGONOPODA**, Gebien

crassipes, Gebien ヒラアシスナモグリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 3, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Anping, Tainan, Hokuto.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **GONOCEPHALUM**, Chevrolat

elongatum, Guérin-Méneville ナガスナモグリ
Mag. Zool. Melas., p. 32, (1834).
Loc. Distr.—Pilam, Kankau, Heitô.
Gen. Distr.—South China, India, Formosa.

pubens, Marseul オホスナモグリ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 97, (1876).
Loc. Distr.—Anping, Tainan, Hoozan, Takao.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, India.

formosanus, Gebien タカサゴスナモグリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 4, (1913).

Loc. Distr.—Koroton, Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

coriaceum, Motschulsky ヒメスナモグリ
Etud. Ent. VI., p. 34, (1857).
Loc. Distr.—Kankau, Tainan, Anping, Kôsempo, Garambi.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

depressum, Fabricius クロスナモグリ
Ent. Syst. Suppl., p. 41, (1798).
Loc. Distr.—Hôkoto (Pescadores), Arisan, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, India.

Genus **ANEMIA,** Casternau

coriaria, Fairmaire マダソモグリ
Ann. Soc. Ent. Belg. XL., p. 21, (1896).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa, India.

Genus **PSEUDADRUS,** Fairmaire

scaphoides, Marseul オキノコモグリ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 99, (1878).
Loc. Distr.—Taipin?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **OPATROIDES,** Brulle

striolatus, Fairmaire ホソモグリダマシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XL., p. 21, (1896).
Loc. Distr.—Shinkwa.
Gen. Distr.—Formosa, India.

Genus **AMMOBIUS,** Guérin-Méneville

asperatus, Champion ケシマダソモグリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV., p. 448, (1894).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **CAEDIUS,** Blanchard

marinus, Marseul セマルチビスナモグリ
Ann. Soc. Ent Fr. (5) VI., p. 96, (1876).
Loc. Distr.—Taipin?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **LEICHENUM**, BLANCHARD

seriehispidum, MARSEUL ハイマダラテビスナモグリ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 101, (1876).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus **ISARIDA**, PASCOE

testacea, PASCOE チヤイロテビスナモグリ
Journ. Ent. II., p. 456, (1866).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa, India.

Genus **OPATRUM**, FABRICIUS

subaratum, FALDERMANN セダカスナモグリ
Mém. Acad. Petr. sav. étr. II., p. 413, (1835).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Mongoria, China, Formosa, Penang.

Subfamily **TRACHYSCELINAE**

Genus **TRACHYSCELIS**, LATREILLE

chinensis, CHAMPION チヤイロマルゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV., p. 448, (1894).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, China.

Subfamily **CRYPTICINAE**

Genus **PHALERIA**, LATREILLE

atriceps, LEWIS クロアシケシゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 383, f. (1894).
Loc. Distr.—Anping, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CRYPTICUS**, LATREILLE

minutissimus, GEBIEN ダンダラゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 6, (1913).
Loc. Distr.—Akau, Kankau, Chikutôki.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **BOLITOPHAGINAE**

Genus **BRADYMERUS**, PERROUD

clathratus, SCHAUFUSS ヒメコムネゴミダマシ
Hor. Soc. Ent. Ross. XXI., p. 134, (1887).

Loc. Distr.—Taihōrin, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa, India, Sunda Islands, Philippines.

aequecostatus, FAIRMAIRE セスヂコムネゴミダマシ
Not. Leyd. Mus. XV., p. 20, (1893).
Loc. Distr.—Kōsempo, Fuhōshō, Taihōrin, Sokutsu, Kankau.
Gen. Distr.—Borneo, Sumatra, Malay, Philippines, Formosa.

violaceus, PASCOE ルリゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XI., p. 437, (1883).
Loc. Distr.—Kōtōsho?
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Genus **DICRAEOSIS,** GEBIEN

amplus, GEBIEN クビカクシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 8, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

cylindricus, GEBIEN オホクビカクシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 9, (1913).
Loc. Distr.—Kanshirei, Sokutsu, Kōsempo, Kankau, Kwarenkō, Horisha, Taihoku, Shinten.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, GEBIEN ザウタクビカクシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 11, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

carinatus, GEBIEN スヂクビカクシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 12, (1913).
Loc. Distr.—Kankau, Hoozan, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **DIAPERINAE**

Genus **DIAPERIS,** GEOFFROY

lewisi var. **intersecta,** GEBIEN ミヅオビツヤゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 15, (1913).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

Genus **SCAPHIDEMA,** REDTENBACHER

ornatellum, LEWIS フタモンツヤゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 396, (1894).
Loc. Distr.—Kiirun, Sharyōtō.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PLATYDEMA**, LAPORTE de CASTERNAU

umbratus, MARSEUL クロツヤゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 107, (1876).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, GEBIEN ザウタツヤゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 15, (1913).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Polisha, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

haemorrhoidale, GEBIEN ツマアカツヤゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 16, (1913).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, GEBIEN タカサゴツヤゴミダマシ
Philip. Journ. Sc. XXVII., p. 588, (1925).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

pallidicolle, LEWIS ダンダラツヤゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 398, (1894).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

subfascia, WALKER カタモンツヤゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 284, (1858).
Loc. Distr.—Hoozan, Horisha.
Gen. Distr.—Burma, Annam, Borneo, Sumatra, Celebes, Formosa, J pan Proper.

flavopictum, GEBIEN ヨツモンツヤゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 17, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

scriptipenne, FAIRMAIRE オビマダラツヤゴミダマシ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 33, (1875).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Tropical Asia and Africa.

Genus **ISCHNODACTYLUS**, CHEVROLAT

formosanus, GEBIEN タイワンヒラタツヤゴミダマシ
Philip. Journ. Sc. XXVII., p. 445, (1925).
Loc. Distr.—Hoozan, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa

batesi, CHEVROLAT ベイツヒラタツヤゴミダマシ
Bull. Soc. Ent Fr., p. 88, (1878).

Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Sumatra, Formosa.

Genus **CEROPRIA,** Castelnau

laticollis var. **schenklingi,** Gebien アヲセマルゴミダマシ
Arch. Naturg., A. 9, p. 19, (1913).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

intermedia, Harold ルリセマルゴミダマシ
Stett. Ent. Zeit. XXXIX., p. 354, (1877).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, New Guinea, Molucca, Formosa.

formosana, Gebien タイワンセマルゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 20, (1913).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

induta, Wiedemann ルリツヤセマルゴミダマシ
Zool. Mag. I., 3, p. 164, (1819).
Loc. Distr.—Kôsempo, Fuhôshô, Chip-Chip, Suisharyô, Tainan, Sokutsu, Hoozan, Polysha, Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Malay, Formosa, Japan proper, China, Burma, Philippines, Sunda Islands.

Genus **BASANOPSIS,** Gebien

curvipes, Gebien ヨツモンセマルゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, 22, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Fuhôshô, Horisha, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **LEIOCHRINAE**

Genus **LEIOCHRINUS,** Westwood

lutescens, Westwood キイロテントウガタゴミダマシ
Tijdschr. v. Ent. XXVI., p. 71, pl. 3, f. 14, (1883).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Malacca.

Genus **LEIOCHRODES,** Westwood

tibialis, Gebien モモブトテントウガタゴミダマシ
Arch. Naturg., A. 9, p. 23, (1913).
Loc. Distr.—Tainan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

discoidalis, Westwood アカゲロテントウガタゴミダマシ
Tijdschr. v. Ent. XXVI., p. 71, pl. 3, f. 8-13, (1883).
Loc. Distr.—Kôtôsho?
Gen. Distr.—Formosa, Sumatra.

varicolar, Westwood カタモンテントウガタゴミダマシ
Tijdschr. v. Ent. XXVI., 76, (*Leiochrota*) (1883).
Loc. Distr.—Kôtôsho?
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

tenebrosus, Thomson クロテントウガタゴミダマシ
Mus. Scient., p. 13, (*Pimplema*) (1860).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Penang, Sumatra, Java, Formosa.

Subfamily **ULOMINAE**

Genus **ULOMA,** Latreille

polita, Wiedemann クロエグリゴミダマシ
in Germ. Mag. IV., p. 149, (1821).
Loc. Distr.—Kôsempo, Anping, Musha, Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa, Java, India, Ceylon.

excisa, Gebien ヒメエグリゴミダマシ
Arch. Naturg., A. 9, p. 24, (1913).
Loc. Distr.—Tainan, Pilam, Chip-Chip, Kôsempo, Polisha, Sokutsu, Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

orientalis, Casternau オホエグリゴミダマシ
Hist. Nat. II., p. 220, (1840).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Java.

Genus **EUTOCHIA,** Le Conte

pulla, Erichson アンピンヒメゴミダマシ
Arch. Naturg. IX., 1, p. 253, (1843).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Tropical Asia, Tropical Africa, Formosa

lateralis, Boheman キブチヒメゴミダマシ
Resa Eugen., p. 94, (1858).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—India, Burma, Siam, Hainan, China, Philippines, Formosa.

Genus **ALPHITOBIUS,** Stephens

diaperinus, Panzer ナヤゴミダマシ
Fn. Germ. XXXVII, p. 16, (1797).

Loc. Distr.—Tainan, Anping, Taihōrin.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

piceus, OLIVIER キビゴミダマシ
Encycl. Méth. VII., p. 50, (*Helops*) (1792).
Loc. Distr.—Anping, Kankau.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **DIACLINA,** JACQUELIN-DUVAL

quadrimaculata, GEBIEN ヨツモンヒメゴミダマシ
Phil. Journ. Sci. Soc. D. 8., p. 394, (1913).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Sokutsu.
Gen. Distr.—Philippines, India, Java, Formosa.

Genus **CNEOCNEMIS,** GEBIEN

laminipes, GEBIEN アカアシヒメゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, 217, f. 8, (1913).
Loc. Distr.—Taihōrin, Anping, Pilam.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TRIBOLIUM,** MAC LEAY

ferrugineum, FABRICIUS コクヌスツトモドキ
Mant. Ins. I., p. 212, (1787).
Loc. Distr.—Anping, Kōsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **PALORUS,** MULSANT

subdepressus, WOLLASTON ニセヒラタコクヌスツトモドキ
Cat. Can. Col., p. 499, (1864).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

depressus, FABRICIUS ヒラタコクヌスツトモドキ
Skrivter Naturh. Selsk. I., p. 223 (*Hypophloeus*) (1790).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Europe.

exilis, MARSEUL ケシコクヌスツトモドキ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 116, (1876).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Java.

Genus **BOLITRIUM,** GEBIEN

crenulicolle, GEBIEN ケシツヤコクヌスツトモドキ
Arch. Naturg., A. 9, p. 28, (1913).

Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Genus **HYPOPHLOEUS**, Fabricius

analis, Gebien ツヤコクヌスツトモドキ
Phil. Journ. Sci. Soc. D. 8, p. 395, (1913).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kôsempo, Sokutsu, Suisharyô.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

filum, Fairmaire ホソツヤコクヌスツトモドキ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXII., p. 29, (1893).
Loc. Distr.—Taihôrin, Sokutsu, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa, China.

cephalotes, Gebien ツビコツヤコクヌスツトモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 29, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

robustus, Gebien スイシヤツヤコクヌスツトモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 30, (1913).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DOLIEMA**, Pascoe

spinicollis, Fairmaire トゲムネクロコクヌスツトモドキ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXII., p. 27, (1893).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa, Indo-China, Burma, Andaman.

platisoides, Pascoe コウトウコクヌスツトモドキ
Journ. Ent. I., p. 50, pl. 3, f. 8, (1860).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Ceylon, India, Burma, Siam, Malay, Philippines, Formosa.

Genus **GNATHOCERUS**, Thunberg

cornutus, Fabricius ツノコクヌスツトモドキ
Ent. Syst. Suppl., p. 51, (1798).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **LATHETICUS**, Waterhouse

oryzae, Waterhouse イネコクヌスツトモドキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V., p. 148, (1880).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Europe, Arabia, Abissinia, India, Formosa.

Subfamily **COSSYPHINAE**

Genus **COSSYPHUS,** Olivier

depressus, Fabricius オホカメノコゴミダマシ
Spec. Ins. I., p. 254, (*Tenebrio*) (1781).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, China, Burma, India.

limbatum, Pascoe ヒメカメノコゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XX., p. 13, (1887).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Siam, Cochin-China, Formosa.

Subfamily **TENEBRIONINAE**

Genus **SETENIS,** Motschulsky

striatipennis, Lewis セスヂナガゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 473, (1894).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihôrin, Sokutsu, Chip-Chip, Polisha, Fuhôshô, Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

valgipes, Marseul オホナガゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 117, (1876).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China.

manilarum, Fairmaire シリピロナガゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI., p. 188, (1886).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines, New Guinea.

Genus **ENCYALESTHES,** Motschulsky

exularis, Gebien ツヤマルクビゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 31, (1913).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Hoozan, Kôsempo, Horisha, Fuhôshô, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

nitidipennis, Fairmaire ルリマルクビゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXVII., p. 394, (1898).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **DEROSPHAERUS,** Thomson

rotundicollis, Casternau クロイブシマルクビゴミダマシ
Hist. Nat. II., p. 213, (1830).
Loc. Distr.—Anping, Kôsempo, Hoozan.
Gen. Distr.—Philippines, Siam, Java, Formosa.

Genus **NECROBIOIDES,** Fairmaire

bicolor, Fairmaire ヒメルリマルクビゴミダマシ
Not. Leyd. Mus. XV., p. 28, (1893).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

Genus **ARIARATHUS,** Fairmaire

ulomoides, Fairmaire ムナビロゴミダマシ
Compt. Rend. Soc. Ent. Belg., p. 211 (1891).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

Genus **TENEBRIO,** Linné

obscurus, Fabricius コメノゴミダマシ
Ent. Syst. I., p. 111, (1792).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

molitor, Linnè クワシノゴミダマシ
Syst. Nat. Ed. X., I. p. 417, (1758).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **CATAPIESTUS,** Perty

subrufescens, Pic フチバヒラタゴミダマシ
Echange, XXVII., p. 184, (1911).
Loc. Distr.—Kōsempo, Chip-Chip, Sokutsu, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **TOXICUM,** Latreille

cavifrons, Pic タイナンツノゴミダマシ
Mélanges, VI., p. 17, (1913).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

funginum, Lewis ツノゴミダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, p. 469, (1894).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kōsempo, Taihōrin, Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

tricornutum, Waterhouse ミツノゴミダマシ
Ent. Monthl. Mag. XI., p. 126 (1874).
Loc. Distr.—Shinsha.
Gen. Diitr.—Formosa, Japan proper.

Genus **MENEPHILUS**, Mulsant

medius, Marseul ウヤホソゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 120, (1876).
Loc. Distr.—Pilam, Tainan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China, Java.

Genus **ANTHRACIAS**, Redtenbacher

oppugnans var. **gazellae**, Schaufuss コウトウホソゴミダマシ
Hor. Soc. Ent. Ross. XIX., p. 201, (1885).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Celebes, Philippines, Formosa.

Subfamily **HETEROTARSINAE**

Genus **HETEROT[illegible]SUS**, Latreille

carinula, Marseul ヤマトコガシラゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 127, (1876).
Loc. Distr.—Kosempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China.

pustulifer, Fairmaire トンキンコガシラゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII., p. 361, (1888).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Tonkin.

subcrenatus, Fairmaire シナコガシラゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI., p. 345, (1888).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **LYPROPS**, Hope

sinensis, Marseul ヒゲブトゴミダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 126, (1876).
Loc. Distr.—Kankau, Suisharyô, Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, South China.

luzonicus, Gebien ルソンヒゲブトゴミダマシ
Phil. Journ. Sci. Soc. D. 8., p. 405, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

horni, Gebien ホルンヒゲブトゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, 34, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

irregularis, Gebien タイワンヒゲブトゴミダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 35, (1913).

Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

indicus, WIEDEMANN インドヒゲブトゴミダマシ
Zool. Mag. II., 1, p. 42, (1821).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Siam, Darjeeling, India, Ceylon, Formosa.

Subfamily **CYPHALEINAE**

Genus **ARTACTES,** PASCOE

latreillei, CASTERNAU ラトレイユニジゴミダマシ
Ann. Sc. Nat. XXII., p. 405, (81) pl. 10, f. 6a, (1831).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

cyaneolimbatus, FAIRMAIRE アヲフヤマルゴミダマシ
Not. Leyd. Mus. XV., p. 30, (1893).
Loc. Distr.—Kusukusu.
Gen. Distr.—Indo-China, Siam, Assam, Formosa.

Subfamily **CNODALONINAE**

Genus **PLATYCREPIS,** LACORDAIRE

violaceus, KRAATZ ルリムラサキキマハリモドキ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIV., pl. 103, (1880).
Gen. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **SCOTAEUS,** HOPE

seriatopunctatus, HELLER アカアシフヤキマハリモドキ
Abh. Mus. Dresden, VII., No. 8, p. 8, (1899).
Loc. Distr.—Kôtôsho?
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **EUCYRTUS,** PASCOE

?nigripes, KRAATZ クロアシフヤキマハリモドキ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIV., p. 100, (1880).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **HEMICERA,** CASTERNAU

alternata, GEBIEN アヤスヂキマハリモドキ
Arch. Naturg LXXIX., A. 9, p. 37, (1913).

Loc. Distr.—Kôsempo, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Formosa, Tonking.

Genus **CAMARIA**, SERVILLE

spectabilis, PASCOE オホキハリモドキ
Journ. Ent., p. 52, I, (1860).
Loc. Distr.—Shinten, Urai, Heichin.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **PSYDUS**, PASCOE

marginicollis, GEBIEN フチトリキマハリモドキ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 38, (1913).
Loc. Distr.—Alikang, Fubôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **GAUROMAIA**, PASCOE

dives, PASCOE ムラサキヅビロキマハリモドキ
Journ. Ent. II., p. 474, (1866).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Malacca, Sumatra, Java, Borneo, Formosa.

Genus **OEDEMUTES**, PASCOE

purpuratus, PASCOE セダカキマハリモドキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII., p. 355, (1871).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **PSEUDABAX**, KRAATZ

formosus, KRAATZ フイリツビンキマハリモドキ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIV., p. 108, (1880).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **GNESIS**, PASCOE

helopioides, PASCOE ヅビロキマハリモドキ
Journ. Ent. II., p. 478, (1866).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PSEUDONAUTES**, FAIRMAIRE

purpurvittatus, MARSEUL ルリスヂキマハリモドキ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 130, (1876).

Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Kankau, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subfamily **HELOPINAE**

Genus **LAMPEROS**, Allard

elegantulus, Lewis ルリキマハリモドキ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII., p. 478, (1894).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

Subfamily **AMARYGMINAE**

Genus **CYRIOGETON** Pascoe

nigroaeneum, Gebien クロツヤキマハリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 40, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PLESIOPHTHALMUS**, Motschulsky

spectabilis, Harold オホカラカネキマハリ
Abh. Ver. Brem. IV., p. 293, (1875).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

fuscoaenescens, Fairmaire オキナワカラカネキマハリ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 14, (1898).
Loc. Distr.—Kirun.
Gen. Distr.—Loo-Choo (Ishigaki), Formosa.

Genus **AMARYGMUS**, Dalman

pilipes, Gebien ヨツモンマルキマハリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 42, f. 11, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Annan, Burma, Formosa.

cuprarius, Weber アカマルキマハリ
Obsc. Ent., p. 40, (1801).
Loc. Distr.—Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Sumatra, Java, Mindanao, Formosa.

formosanus, Pic タカサゴマルキマハリ
Mélanges, XVI., p. 21, (1915).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

callichromus, FAIRMAIRE ニジマルキマハリ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 70, (1897).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Loo-Choo (Ishigaki), Formosa, Java.

Subfamily **STRONGYLIINAE**

Genus **STRONGYLIUM,** KIRBY

albopilosum, GEBIEN ムクゲナガキマハリ（ケブカナガゴミダマシ）
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 44, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanum, GEBIEN セナミナガキマハリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 45, (1913).
Loc. Distr.—Tainan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

erythrocephalum, FABRICIUS アカアシルリナガキマハリ（アヲヅヤナガゴミダマシ）
Syst. El. I., p. 156, (1801).
Loc. Distr.—Takao, Anping.
Gen. Distr.—Burma, Siam, Indo-China, Sumatra, Java, Manila, Formosa, China, Malay, Tenasserim, Andaman.

marseuli, LEWIS セスヂナガキマハリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII., p. 481, (1894).
Loc. Distr.—Taihanroku.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

carbonarium, GEBIEN クロナガキマハリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 47, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

schenklingi, GEBIEN キンイロナガキマハリ（シハナガゴミダマシ）
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 48, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

longissimum, GEBIEN オホナガキマハリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 50, (1913).
Loc. Distr.—Sokutsu
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CROSSOCELIS,** GEBIEN

clauda, GEBIEN クロガネナガキマハリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 9, p. 53, (1913).
Loc. Distr.—Suisharyô, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

RHYSOPAUSSIDAE 偶背筋蟲科

Genus GONOCNEMIS, THOMSON

sericeus, FABRICIUS ムナビロセスヂダマシ
Syst. El. I., p. 120, (1801).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Sunda Islands.

Genus ZIAELAS, FABRICIUS

formosanus, HOZAWA タイワンセスヂダマシ (タカサゴヂヤイラ)
Ann. Zool. Jap. VIII., p. 483, (1914).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus AZARELIUS, FAIRMAIRE

oberthuri, WASMANN ヒメセスヂダマシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2) XVI., p. 617, pl. 2, f. 3, (1896).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Burma.

LAGRIIDAE 偶金花蟲科

Subfamily LAGRIINAE

Genus CEROGRIA, BORCHMANN

anisocera, WIEDEMANN タイワントゲツノハムシダマシ
Zool. Mag. II., 1, p. 31, (*Lagria*) (1823).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Java, Sumatra, Burma, Bengal, Formosa.

odontocera, FAIRMAIRE トゲツノハムシダマシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI., p. 348, (*Lagria*) (1886).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Yunnan, Formosa.

miwai, KONO ミワトゲツノハムシダマシ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 18, (1930).
Loc. Distr.—Shirin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus LAGRIA, FABRICIUS

kikuchii, KONO キクチハムシダマシ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 28, (1929).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

formosensis, Borchmann オホハムシダマシ
Suppl. Ent. I., p. 6, (1912).
Loc. Distr.—Taihoku, Taichiu, Tappan, Horisha, Ibaho, Arisan, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LAGRIOCERA,** Fairmaire

ruficollis, Borchmann ツノビロハムシダマシ（クビアカハムシダマシ）
Suppl. Ent. I., p. 7, (1912).
Loc. Distr.—Arisan, Hoppo, Kôshun, Kanshirei, Akau, Ranrun, Shôkwa, Shûshû Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ARTHROMACRA,** Kirby

abnormalis, Kono ケブカハムシダマシ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 31, (1929).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **STATIRINAE**

Genus **ANISOSTRIA,** Borchmann

cognata, Borchmann オホモモブトハムシダマシ
Suppl. Ent. I., p. 11, (*Nemostira*) (1912).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

abnormipes, Borchmann モモブトハムシダマシ
Suppl. Ent. I., p. 10, (*Nemostira*) (1912).
Loc. Distr.—Baibara, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

abnormipes f. abdominalis, Kono
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 33, (1929).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

abnormipes f. flavipes, Kono
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 33, (1929).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

abnormipes f. kikuchii, Kono
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 34, (1929).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NEMOSTIRA**, FAIRMAIRE

occipitalis, BORCHMANN クロナガハムシダマシ
Suppl. Ent. I., p. 8, (1912).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

rufipennis, BORCHMANN ハネアカナガハムシダマシ
Suppl. Ent. I., p. 9, (1912).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

viridimetallica, PIC ルリナガハムシダマシ
Mélanges, I., p. 7, (1911).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

sinuatipes, PIC タイナンナガハム[illegible]ダマシ
Mélanges, I., p. 7, (1911).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

OTHNIIDAE 偽朽木科

Genus **OTHNIUS**, LE CONTE

formosanus, BORCHMANN タイワンクチキダマシ
Arch. Naturg. LXXXII., p. 106, f. 9a-9c, 12, (1916).
Loc. Distr.—Taihôrin, Fuhôshô, Kôsempo, Hoozan, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

similis, BORCHMANN ニセクチキダマシ
Arch. Naturg. LXXXII., p. 107, f. 10, (1916).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Taihôrin, Hoozan, Tainan, Sokutsu, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

rugicollis, BORCHMANN ムネアカクチキダマシ
Arch. Naturg. LXXXII., p. 108, f. 11, (1916).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

atrithorax, PIC クロムネクチキダマシ
Mélanges, XXXII., p. 9, (1920).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

ALLECULIDAE 朽木蟲科

(*Cisteridae*)

Genus **ALLECULA**, FABRICIUS

fuliginosa, MÄKLIN カバイロクチキムシ（オホクチキ）
Act. Soc. Fenn. X., p. 666, (1875).

Loc. Distr.—Kôsempo, Suisharyô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

maxima, Pic オホクチキムシ
Echange, XXVI., p. 94, (1910).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kôsempo, Taihôrinshô, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa, Yunnan.

bilamellata, Marseul チヤイロチビクチキムシ（クリイロクチキ）
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 323, (1876).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

velutina, Marseul サビイロクチキムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 322, (1876).
Loc. Distr.—Suisharyo.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

formosana, Pic タイワンクチキムシ
Echange, XXVI., p. 94, (1910).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ALLECULODES,** Borchmann

sauteri, Borchmann モモブトオホクチキムシ
Treubia, Buit. VI., p. 341, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **BORBORESTHES,** Fairmaire

cruralis, Marseul ヒメイクビクチキムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 324, (1876).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

fuliginosus, Fairmaire チヤイロヒメイクビクチキムシ
Not. Leyd. Mus. XIX., p. 253, (1897).
Loc. Distr.—Taihanroku, Kankau.
Gen. Distr.—Sze-tchoucu, Formosa.

Genus **HYMENALIA,** Mulsant

rufipennis, Marseul アカハネヒメクチキムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 328, (*Cistela*) (1876).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Siberia, Europe, Formosa, Japan proper.

Genus **ISOMIRA**, MULSANT

formosana, PIC タカサゴフナガタクチキムシ
Mélanges, XXII., p. 20, (1917).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

subelongata, PIC ナガフナガタクチキムシ
Mélanges, XXIII., p. 20, (1917).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr—Formosa.

matsumurai, KONO クリイロフナガタクチキムシ
Ins. Mats. IV., No. 3, p. 95, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

konoi, MIWA (nom. nov.) オホフナガタクチキムシ
=*formosana*, KONO, Ins. Mats. IV., No. 3, p. 96, (1930) (nec. PIC).
Loc. Distr.—Musha, Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CISTELOMORPHA**, REDTENBACHER

bina, FAIRMAIRE フタモンイクビクチキムシ (フタホシオホクチキ)
Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII., p. 631, (1899).
Loc. Distr.—Anping.
Fen. Distr.—Formosa.

nigrotibialis, FAIRMAIRE クロアシイクビクチキムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII., p. 301, (1893).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Lang-Song, Formosa.

Genus **CISTELINA**, SEIDLITZ

tricolor, BORCHMANN クロアシキアカクチキムシ (アカオホクチキ)
Arch. Naturg. LXXXII., p. 101, (1916).
=*rufina*, BORCHMANN, Suppl. Ent. No. 1, p. 12, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin, Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

melanopyga, FAIRMAIRE アラゲオホクチキムシ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII., p. 322, (*Cistelomorpha*) (1893).
Loc. Distr.—Hoppo, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CTENIOPINUS**, SEIDLITZ

unicolor, KONO アリサンキイロクチキムシ
Ins. Mats. IV., No. 3, p. 98, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwanus, KONO ビロウドクチキムシ
Ins. Mats. IV., No. 3, p. 98, (1930).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

crassicornis, BORCHMANN ヒラヒゲクチキムシ（シリグロオホクチキ）
Arch. Naturg. LXXXII., p. 103, f. (1916).
Loc. Distr.—Banshoryô, Kanshirei.
Gen. Distr.—Formosa.

MONOMMIDAE 僞吉丁蟲科

Genus **MONOMMA,** CASTERNAU

formosana, PIC タイワンタマムシモドキ
Mélanges, XX., p. 1, (1916).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

glyphysternus, MARSEUL トビイロタマムシモドキ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 330, (1876).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

OEDEMERIDAE 僞天牛科

Tribe: **ASCLERINI**

Genus **EOBIA** SEMENOV

curticornis, PIC ハイイロカミキリダマシ
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II, p. 88, (1911).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, PIC タイワンカミキリダマシ
Mélanges, XXXIX., p. 31, (1923).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

florilega, LEWIS キイロカミキリダマシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV., p. 438, (1895).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **SESSINIA,** PASCOE

chinensis, HOPE ツマグロカミキリダマシ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 61, (*Nacerdes*) (1842).
Loc. Distr.—Anping, Hokuto.
Gen. Distr.—Formosa, China.

Genus **ASCLERA**, STEPHENS

formosana, PIC ヒメカミキリダマシ
Echange, XXVI., p. 95, (*Ischnomera*) (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo, Chôsokeit, Shisha.
Gen. Distr.—Formosa.

rugosipennis, PIC ルリカミキリダマシ
Echange, XXVI., p. 95, (*Ischnomera*) (1910).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **OEDEMERINI**

Genus **OEDEMERA**, OLIVER

sauteri, PIC ザウタカミキリダマシ
Echange, XXVI., p. 96, (*Ischnomera*) (1910).
Loc. Distr.—Hokuto, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

SERROPALPIDAE 長朽木科

(*Melandryidae*)

Subfamily **TETRATOMINAE**

Genus **SYNSTROPHUS**, SEIDLITZ

rollei, PIC ロールナガクチキムシ
Echange, XXVI., p. 75, (*Eustrophus*) (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HOLOSTROPHUS**, HORN

multinotatus, PIC キボシナガクチキムシ
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., p. 188, (1911).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **OSPHYINAE**

Genus **OSPHYA**, ILLIGER

formosana, PIC タイワンナガクチキムシ

Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

trilineata, Pic ミスヂナガクチキムシ
Echange, XXVI., p. 75, (1910)
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

MORDELLIDAE 花蚤科

Tribe: MORDELLINI

Genus MACROTOMOXIA, Pic

castanea, Pic クリイロハナノミ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 208, (1922).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Indo-China, Formosa.

Genus GLIPA, Le Conte

sauteri, Pic ザウタオビハナノミ
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., p. 189, (1911).
Loc. Distr.—Urai, Giran, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, Pic タイワンオビハナノミ
Echange, XXVII., p. 191, (1911).
Loc. Distr.—Ranrun, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana obscuripennis, Pic
Echange, XXVII., p. 191, (1911).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

malaccana, Pic コウトウハナノミ
Echange, XXVII., p. 190, (1911).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo, Shisha, Taihôrin, Sokutsu, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Malacca, Formosa.

Genus MORDELLA, Linné

composita, Walker コウシュンハナノミ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 286, (1858).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

composita var. **innotata,** Pic
Ent. Mitteil. XV., p. 67, (1926).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MORDELLISTENA**, COSTA

pelecotomoides, PIC キイロヒメハナノミ
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., p. 189, (1911).
Loc. Distr.—Banshoryō, Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, PIC タイワンヒメハナノミ
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., p. 189, (1911).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kwarenkō.
Gen, Distr.—Formosa.

altestrigata, MARSEUL フタモンヒメハナノミ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 474, (1876).
Loc. Distr.—Taihoku, Kōshun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, PIC キンオビヒメハナノミ
Ent. Mitteil. XV., p. 67, (1926).
Loc. Distr.—Taihōrin, Shisha, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

curteapicalis, PIC オナシハナノミ
Ent. Mitteil. XV., p. 67, (1926).
Loc. Distr.—Shisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **ANASPIDINI**

Genus **CYRTANASPIS**, EMERY

sauteri, PIC ザウタフナガタハナノミ
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., p. 189, (1911).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ANASPIS**, GEOFFROY

marseuli, CSIKI (nom. nov.) マシュールハナノミ (クロフナガタハナノミ)
=*sericea*, MARSEUL, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p 477, (1876).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

RHIPIPHORIDAE 大花蚤科

Tribe: **PELECOTOMINI**

Genus **MICROPELECOTOIDES**, PIC

japonica, PIC キクヒオホハナノミ
Echange, XXVII., p. 21, (*Pelecotoides*) (1910).
Loc. Distr.—Kankau, Kōsempo, Sokutsu, Shisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **MACROSIAGON,** HENTZ

bipunctatum, FABRICIUS フタモンオホハナノミ
Syst. El. II., p. 120, (*Ripiphorus*) (1801).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Indonesia, India, Capland, East-Africa, Formosa.

ferrugineum flabellata, FABRICIUS タイワンオホハナノミ
Spec. Ins. II., App p. 501, (*Mordella flabellata*) (1781).
Loc. Distr.—Taihōrin, Tainan.
Gen. Distr.—India, Spain, Africa, Formosa.

nasutum, THUNBERG タイワンクロオホハナノミ
Diss. Nov. Ins. Spec. III., p. 66, f. 77, (1874).
Loc. Distr.—Paroe, Taihoku.
Gen. Distr.—Nicobar, Sumatra, Borneo, Philippines, Japan proper, Formosa.

Genus **RHIPIPHORUS,** PASCOE

apicalis, WATERHOUSE コウシュンオホハナノミ
Cist. Ent. I., p. 370, (*Myodites*) (1875).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—India, Bombay, Formosa.

Tribe: **RHIPIDIINI**

Genus **RHIPIDIUS,,** THUNBERG

longicollis, SCHILDER コバネオホハナノミ
Ent. Mitteil. XII., p. 203, (1923).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

pectinicornis, THUNBERG クシヒゲコバネオホハナノミ
Vet. Ak. Nya. Handl. XXVII., p. 5, pl. 2, f. 1-5, (1807).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—Europe, Ceylon, China, Formosa.

MELOIDAE 地膽科

Subfamily **LYTTINAE**

Genus **MYLABRIS,** FABRICIUS

cichorii, LINNÉ オビゲンセイ（ヨコジマツンメウ）
Syst. Nat. X., p. 419, (*Meloë*) (1758).
Loc. Distr.—Taihoku, Urai, Horisha, Musha, Baibara, Niitaka District, Kōshun District.
Gen. Distr.—India, China, Formosa.

phalerata, PALLAS オホオビゲンセイ
Icon. Ins., p. 78, t. E, f. 3b, (*Meloë*) (1781).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Niitaka District, Taihoku, Kwanshirei, Kwarenkô, Kôshun District.
Gen. Distr.—China, India, Formosa.

schoenherri, BILLBERG フタオビゲンセイ
Monogr. Mylabr., p. 14, t. 2, f. 1, (1813).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—China, Hainan, Formosa.

Genus **EPICAUTA,** REITTENBACHER

formosensis, WELLEMAN タイワンクロマメハンメウ
Ent. News, XXIII., p. 31, (1912).
Loc. Distr.—Taihoku, Urai, Kiirun, Shôkwa, Dakusui, Horisha, Niitaka District, Kuarau.
Gen. Distr.—Formosa.

waterhousei, HAAG-RUTENBERG タイワンセスヂマメハンメウ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIV. p. 79-81, (1880).
Loc. Distr.—Urai, Shizangan, Gyochi, Horisha, Niitaka District, Kwanshirei, Tainan.
Gen. Distr.—East-India, Formosa.

?gorhami, MARSEUL マメハンメウ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 227, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa?

tibialis, WATERHOUSE ケブカマメハンメウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 406, (1871).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

chinensis, MOTSCHULSKY チヨウセンクロマメハメンウ
Etud. Ent. II., p. 48, (1853).
Loc. Distr.—Kobayshi, Taipin, Musha, Tauran, Tainan, Kôshun.
Gen. Distr.—Korea, China, Formosa.

hirticornis, HAAG-RUTENBERG ムクゲマメハンメウ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIV., p. 26, (1880).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Assam, Formosa.

Genus **MELOE,** LINNÉ

formosensis, MIWA タイワンコバネヲヂハンメウ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XX., No. 106, p. 12-13, (1930).
Loc. Distr.—Musha, Arisan, Sankakuho.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **NEMOGNATHINAE**

Genus **ZONITIS,** Fabricius

? cothurnata, Marseul ツマグロキツチハンメウ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III., p. 228, (1873).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Japan proper (Kiushiu), Formosa.

pallida, Fabricius キイロツチハンメウ
Ent. Syst. IV., App., p. 447, (1794).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, East-India.

geniculata, Fairmaire ボルクマンキツチハンメウ
Not. Leyd. Mus. IX., p. 195, (1887).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Celebes, Formosa.

Genus **CISSITES,** Latreille

cephalotes, Olivier トビイロゲンセイ
Encycl. Meth. Hist. Nat. Ins. VII., p. 102, (*Horia*) (1792).
Loc. Distr.—Hokuzankô, Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Java, Sumatra, Formosa, Loo-Choo (Ishigaki).

anguliceps, Fairmaire ヒメトビイロゲンセイ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. CXI, (*Horia*) (1885).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Borneo, Sumatra, Formosa.

PYROCHROIDAE 赤翅蟲科

Genus **PHYLLOCLADUS,** Blair

magnificus, Blair ビルマオホアカバネムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX., p. 531, (*Dendroides*) (1912).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **EUPYROCHROA,** Blair

linbaticollis, Pic シナアカバネムシ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 330, (*Pyrochroa*) (1909).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **PSEUDOPYROCHROA,** Pic

fainanensis, Pic ヴアカアカバネムシ
Echange, 27., p. 158, (*Pyrochroa*) (1911).
Loc. Distr.—Horisha, Suisharyô, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

depressa, Pic ヒラタアカバネムシ
Melanges, II, p. 17, (1914).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwana, Kono タイワンアカバネムシ
Ins. Mats. III., p. 67, (1929).
Loc. Distr.—Tappan.
Gen. Distr.—Formosa.

carinifrons, Kono スヂアカバネムシ
Ins. Mats. III., p. 68, (1929).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

PEDILIDAE 細頭蟲科

Genus **MACRATRIA,** Newman

griseosellata var. **sauteri,** Pic ザウタホソクビムシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 2, p. 133, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

serialis, Marseul ツツガタホソクビムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 448, (1876).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

HYLOPHILIDAE 偽細頭科

(*Xylophilidae*)

Genus **HYLOPHILUS,** Berth

sauteri, Pic ザウタホソクビダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 2, p. 134, (1913).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

laticeps, Pic カンカウホソクビダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 2, p. 134, (1913).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Pic タイワンホソクビダマシ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 2, p. 133, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

ANTHICIDAE —角科

Genus **MECYNOTARSUS,** La Ferte

minimus, Marseul チビイツカク
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 461, (1876).
Loc. Distr.– Kamagawa, Anping.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

flavipes, Pic キアシイツカク
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 129, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

4-maculatus, Pic ヨツモンイツカク
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 129, (1913).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **FORMICONUS,** La Ferte

braminus, La Ferte インドイツカク
Monogr. Anthic., p. 79, (1848).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, India.

cribriceps, Marseul ヤマトイツカク
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 459, (*Anthelephilus*) (1876).
Loc. Distr.—Taihôrin, Pilam.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

lewisi, Marseul レビスアリヅカイツカク
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 458, (*Anthelephilus*) (1876).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, Pic ザウタアリヅカイツカク
Mélanges, II., p. 6, (1912).
Loc. Distr.—Yentempo, Takao, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

longispinus formosanus, Pic トゲナガアリヅカイツカク
Mélanges, II., p. 7, (1912).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LEPTALEUS,** La Ferte

trigibber, Marseul ミツヒダイツカク
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 460, (*Pseudoleptaleus*) (1876).
Loc. Distr.—Hokuto.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

trigibber var. **mediomaculatus,** Pic
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 130, (1913).
Loc. Distr.—Hokuto.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ANTHICUS,** Paykull

takaosus, Pic タカオイツカク
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 130, (1913).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Pic ザウタイツカク
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 131, (1913).
Loc. Distr.—Tainan, Anping, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

floralis var. **quisguilius,** Thomson アンビンイツカク
Skand. Col. VI., p. 380, (1864).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

confucii, Marseul コウシイツカク
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI., p. 464, (1876).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Sumatra.

confucii var. **obscuripennis,** Pic
Mélanges, V., p. 11, (1913).
Loc. Distr.—Takao, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

crinitus, La Ferte ケブカイツカク
Monogr. Anthic., p. 204, (1848).
Loc. Distr.—Anping, Kankau.
Gen. Distr.—North and Central Africa, Asia.

monstrosicornis var. **inapicalis,** Pic ヒゲブトイツカク
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 131, (1913).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

diversepunctatus, Pic マダライツカク
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 132, (1913).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

luteonotatus, Pic セウスイツカク
Arch. Naturg. LXXIX., A. 11, p. 132, (1913).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

pectilis, Pic クシバイツカク
Echange, XXVI., p. 71, (1910).
Loc. Distr.—Taihōrin, Kôsempo, Akau, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

testaceicolor, Pic キイロイツカク
Arch. Naturg., A. 11, p. 133, (1913).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Pic タカサゴイツカク
Mélanges, I., p. 11, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

TRICTENOTOMIDAE 擬鍬形科

Genus TRICTENOTOMA, Gray

formosana, Kriesche クハガタモドキ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 11, p. 150, (1919).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Division V. PHYTOPHAGA 食葉族

BRUCHIDAE 豆象科

(*Mylabridae, Lariidae*)

Genus PACHYMERUS, Thunberg

gonagra, Fabricius コウヂマメザウ
Ent. Syst. Suppl., p. 159, (*Bruchus*) (1798).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus BRUCHUS, Linné

ademptus, Sharp ヨコジママメザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII., p. 36, (1886).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

affinis, Frölich シラホシマメザウ
Naturf. XXVIII., p. 55, (1799).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

analis, Fabricius アカイロマメザウ
Spec. Ins. I., p. 75, (1781).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

chinensis, Linné マメザウ
Syst. Nat. X., p. 386, (1758).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

comptus, Sharp フタヲビマメザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII., p. 36, (1886).
Loc. Distr.—Shinten.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

dorsalis, Fahraeus オホマメザウ
in Schönh. Gen. Curc. V., p. 98, (1839).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, India, Formosa.

japonicus, Harold フタモンマメザウ
Berl. Ent. Zeitschr. XXII., p. 87, (1878).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa?

fulvipes, Roelofs クロホシマメザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXIII., p. 55, (1879).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa?

theobromae, Linné シママメザウ
Syst. Nat. Ed. XII., p. 605, (1767).
Loc. Distr.—Taihoku, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, India, Malay.

pisorum, Linné エンドウマメザウ
Syst. Nat. X., p. 356, (1758).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

pusillimus, Sharp クロチビマメザウ
Biol. Centr. Am. Col. V., p. 479, (1885).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Mexico, Guatemala, Formosa.

quadrimaculatus, Fabricius マダラマメザウ
Ent. Syst. I., 2, p. 371, (1792).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—America, Formosa.

terrenus, Sharp クロマダラマメザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII., p. 35, (1886).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinchiku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

urbanus, Sharp アヤジママメザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII., p. 35, (1886).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, Pic ザウタマメザウ
Ent. Mitteil. XVI., Nr. 4, p. 248, (1927).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SPERMOPHAGUS,** Schönherr

formosanus, Pic タイワンマメザウ
Mélanges, XXVI., p. 9, (1917).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus var. **subundulatus,** Pic
Mélanges, XXVI., p. 10, (1917).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

CHRYSOMELIDAE 金花蟲科

Group I EUPODES

Subfamily **CRIOCERINAE**

Genus **LEMA** Fabricius

rufotestacea, Clark キイロカタビロハムシ
Cat. Phyt. App., p. 29, (1866).
Loc. Distr.—Musha, Taitô, Kôshun.
Gen. Distr.—Deccan, Burma, Assam, Formosa.

unicolor, Clark オホキイロカタビロハムシ
Cat. Phyt. App., p. 23, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

fortunei, Baly ツオルチユンカタビロハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond. V., p. 148, (1859).
Loc. Distr.—Arisan, Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa.

oryzae, Kuwayama ドロハムシ
Ins. Mats. V., No. 3, p. 155, (1931).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

coronata, Baly ルリカタビロハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 72, (1873).
Loc. Distr.—Musha, Taitô.
Gen. Distr.—Japan (Nagasaki), Formosa.

honorata, Baly オホルリカタビロハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 73, (1873).
Loc. Distr.—Nantô, Shôkwa.
Gen. Distr.—Japan (Nagasaki), Formosa.

postrema, BATES タイワンカタビロハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 353, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Group II. CAMPTOSOMES
Subfamily **CLYTRINAE**
Genus **CLYTRASOMA,** JACOBY

palliata, FABRICIUS ダンダラハネビロハムシ
Syst. El. II, p. 30, (1801).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Genus **CLYTRA,** LAICH

nigrifrons, HOPE ダンダラツツ[illegible]ムシ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 51, (*Gynandrophtalma*) (1842).
Loc. Distr.—Kwarenkô, Horisha, Taihoku.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **COPTOCEPHALA,** LACORDAIRE
Subgenus **PHYSAUCHENIA,** LACORDAIRE

formosana, PIC タイワンマツコウハムシ
Mélanges, LI., p. 35, (1928).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

pallens, FABRICIUS ヅグロマツコウハムシ
Mant. Ins. I., p. 81, (*Cryptocephalus*) (1787).
Loc. Distr.—Tauran, Kôshun, Horisha, Rikiriki, Taitô, Taihoku.
Gen. Distr.—East India, China, Formosa.

Subfamily **CRYPTOCEPHALINAE**
Genus **CRYPTOCEPHALUS,** GEOFFROY

swinhoei, BATES スキンホクビカクシハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 353, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

trifassiatus, FABRICIUS ミスヂリビカクシハムシ
Mant. Ins. I., p. 81, (1787).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Musha, Rônô, Kôshun.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

fainanensis, PIC タイナンクビカクシハムシ
Mélanges, LI., p. 34, (1928).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

bissexsignatus, SUFFRIAN モンマダラクビカクシハムシ
Linn. Ent. IX, p. 56, (1854).
Loc. Distr.—Horisha, Sōzan, Kōshun, Kwarenkō, Arisan.
Gen. Distr.—Assam, Formosa.

Subfamily **CHLAMYDINAE**
Genus **CHLAMYS,** KNOCH

lewisi, BALY クソダマシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 83, (1873).
Loc. Distr.—Shinten, Musha, Kōshun.
Gen. Distr.—Japan (Nagasaki), Formosa.

interjecta, BALY チビクソダマシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 84, (1873).
Loc. Distr.—Taitō.
Gen. Distr.—Japan (Nagasaki), Formosa.

spilota, BALY チヤイロクソダマシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 85, (1873).
Loc. Distr.—Horisha, Kōshun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

formosana, BATES タイワンクソダマシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 353, (1866).
Loc. Distr.—Tansui.
Gen. Distr.—Formosa.

Group III. CYCLICA
Subfamily **LAMPROSOMINAE**
Genus **LAMPROSOMA,** KIRBY

alienum, BATES マルツヤハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p, 353, (1866).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **EUMORPINAE**
Genus **NODINA,** MOTSCHULSKY

chalcosoma, BALY セマルルリハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 170, (1874).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, Japan (Nagasaki).

Genus **HETERASPIS,** BLANCHARD

japana, MOTSCHULSKY ヤマトサルハムシ
Etud. Ent., p. 37, (1857).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **BASILEPTA**, Baly

pallidulum, Baly キイロサルハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 169, (*Nodostoma*) (1874).
Loc. Distr.—Shinchiku, Musha, Kôshun, Taihoku, Horisha, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Japan (Nagasaki).

modestum, Jacoby ルリサルハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 206, (*Nodostoma*) (1885).
Loc. Distr.—Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

davidi, Lefèvre クビアカサルハムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII., p. 157, (*Nodostoma*) (1877).
Loc. Distr.—Musha, Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

lateralis, Matsumura キベリサ ハムシ
Schädl. u. Nützl. Ins. Zuckerrhor. Formosas, p. 31, pl. XXVII, f. 4, ♀, (*Nodostoma*) (1910).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **AORIA**, Baly

nigripes, Baly クロアシキサルハムシ
Journ. Ent. I., p. 23, (1860).
Loc. Distr.—Taihoku, Garambi.
Gen. Distr.—Formosa, China.

nigrita, Jacoby クロサルハムシ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XXXII., p. 904, (1892).
Loc. Distr.—Musha, Arisan, Shinchiku, Kôshun, Tabo.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

bowringi, Baly クロモンアカクビサルハムシ
Jour. Ent. I., 1, p. 27, (1860).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

quinquemaculata, Bates イツホシサルハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 354, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **COLASPOSOMA**, Castelnau

oberthuri, Jacoby オキナワイモサルハムシ
Entomolog. XXIX., p. 6, (1896).
Loc. Distr.—Taikoku, Hokuto, Kagi, Arisan, Hori, Ratô, Kwarenkô, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Loo-Choo.

Genus **ACROTHINIUM,** MARSHALL

gaschkewitchi, MOTSCHULSKY アカガネサルハムシ
Etud. Ent., p. 23, (1860).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

Genus **CLEORINA,** LEFÉVRE

lefevrei, JACOBY イクビルリハムシ
Cat. Eumolp., p. 144, note 6, (1885).
Loc. Distr.—Musha, Horisha, Shinchiku, Arisan.
Gen. Distr.—Formosa, Burma.

Genus **COPTONODES,** HOPE

undatus, OLIVIER ルリマダラナガハムシ
Encycl. Méth. VI., p. 614, (*Cryptocephalus*) (1791).
Loc. Distr.—Taihoku, Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa, Hainan.

indigaceus, CHEVROLAT ルリナガハムシ
Rev. Zool., p. 228, (1841).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—China, Formosa, Hainan, India, Philippines.

Subfamily **CHRYSOMELINAE**

Genus **PHAEDON,** LATREILLE

incertum, BALY ヒメダイコハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 176, (1874).
Loc. Distr.—Taichiu, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CHRYSOMELA,** LINNÉ

bowringi, BALY クチバネハムシ
Journ. Ent. I., p. 96, (1860).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

Genus **LINA,** REDTENBACHER

formosana, BATES タイワンハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 354, (1866).
Loc. Distr.—Koroton.
Gen. Distr.—Formosa.

Group IV. TRICHOSTOMES

Subfamily **GALERUCINAE**

Genus **OIDES,** WEBER

epipleuralis, LABOISSIERE ニセテントウハムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. XCVIII., p. 254, (1929).
Loc. Distr.—Hoozan, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Formosa.

chrysomeloides, BATES タイワンイチモンジハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 355, (*Adorium*) (1866).
Loc. Distr.—Taihoku, Taichiu, Ratō, Kayahara, Tainan, Kagi.
Gen. Distr.—Formosa.

decempunctata, BILLBERG トホシセマルオホハムシ
in Schönh. Syn. Ins. I., 2, p. 230, (*Adorium*) (1808).
Loc. Distr.—Shinchiku, Horisha, Garanbi.
Gen. Distr.—Formosa, China, Korea.

maculata, OLIVIER キイロテントウガタオホハムシ
Ent. V., p. 611, t. 1, f. 4, (1807).
Loc. Distr.—Horisha, Taihoku, Shinchiku.
Gen. Distr.—Java, Assam, Formosa.

Genus **CERATIA,** CHAPUIS

bicolor, WEBER クロホシウリハムシ
Obsc. Ent., p. 56, (*Chrysomela*) (1801).
Loc. Distr.—Taihoku, Tabo, Arisan, Kanshirei, Musha, Rikiriki.
Gen. Distr.—Burma, India, Formosa.

analis, WEBER コウトウウリハムシ
Obsc. Ent., p. 55, (*Chrysomela*) (1801).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Philippines, Sunda Islands, Formosa.

pallida, SCHALL クロウリハムシ
Abh. Hall. Ges. I., p. 279, (*Chrysomela*) (1783).
Loc. Distr.—Horisha, Sōzan, Kōshun, Kōtōsho.
Gen. Distr.—India, Sunda Islands, Formosa.

lewisi, BALY レビスウリハムシ
Linn. Soc. Journ. XX., p. 5, 24, ♀, (1886).
Loc. Distr.—Shinchiku, Musha, Kōshun, Hōkotō.
Gen. Distr.—China, Malay, India, Formosa.

nigripennis, MOTSCHULSKY クロバウリハムシ
Etud. Ent. VI., p. 38, (*Aulacophora*) (1857).
Loc. Distr.—Shinchiku, Tabo, Kōshun, Taitō, Hori, Taihoku, Rikiriki.
Gen. Distr.—Japan proper, Amur, China, Formosa.

similis, OLIVIER タイワンウリハムシ
Ent. VI., p. 624, t. 2, f. 23, (*Chrysomela*) (1808).
Loc. Distr.—Tainan, Kusukusu, Kôkotô, Kwashôtô, Kôtôsho, Rokkiri, Arisan, Taihoku.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Formosa.

Genus **AGETOCERA,** HOPE

discedens, WEISE ツイゼコガシラハムシ
Tijdschr. v. Ent. LXV., p. 64, ♀, (1922).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **FORMOSOGALERUCELLA,** PIC

brevithorax, PIC コムネコガシラハムシ
Mélanges, LI., p. 32, (1928).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PERICLITENA,** WEISE

fulminans, FALDERMAN ルリジウジコガシラハムシ
Mém. Ac. Peter. II., p. 438, t. 5, f. 8, (*Galleruca*) (1835).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Namakaban, Rônô, Haikô.
Gen. Distr.—China, Formosa.

vigorsi, HOPE アヲコガシラハムシ
in Gray's Zool. Misc., p. 29, (*Galleruca*) (1831).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—India, Burma, Java, Formosa.

Genus **MIMASTRA,** BALY

costata, BALY クロバメダカハムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II., p. 415, (1878).
Loc. Distr.—Musha, Kanshirei, Rônô, Garambi.
Gen. Distr.—China, Formosa.

soreli, BALY ホソメダカハムシ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) II., p. 415, (1878).
Loc. Distr.—Banshoryô.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **CNEORANE,** BALY

formosanae, WEISE タイワンメダカハムシ
Tijdschr. v. Ent. LXV., p. 72, (1922).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LEPTARTHA,** Baly

grandipennis, Fairmaire オホバホソクビハムシ
Ann. Soc. Ent. Fr. LVIII., p. 77, (1889).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa, Burma.

Genus **DERCETES,** Clark

flaviventris, Jacoby キバラホソクビハムシ
Entomolog. XXIII., p. 214, (1890).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **MONOLEPTA,** Erichson

jacobyi, Weise ジヤコビコハムシ
Nova Guinea, V., p. 326, Anm. 1, (1908).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Sumatra, Mentawei, Formosa.

suturalis var. **nigrobilineata,** Motschulsky フタスヂヒメハムシ
Etud. Ent. IX., p. 26, (1860).
Loc. Distr.—Rinkiho, Taichiu, Tairan, Kyôshitô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China.

Genus **APOPHYLIA,** Duponchel

pallipes, Jacoby ミドリホソハムシ
Ann. Mus. Genova, XXXII., p. 969, (1892).
Loc. Distr.—Musha, Kôshun, Horisha.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Subfamily **HALTICINAE**

Genus **PHYLLOTRETA,** Foudras

vittata, Fabricius キスヂトビハムシ
Syst. El., p. 469, (1801).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **LIPRUS,** Motschulsky

hirtus, Baly チビクビナガハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 194, (1874).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PODONTIA**, Dalman

lutea, Olivier キイロオホハムシ
Encyci. Méth. V., p. 692, (*Chrysomela*) (1790).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **OPHRIDA**, Chapuis

scaphoides, Baly キイブシオホモモブトハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 430, (1865).
Loc. Distr.—Shinchiku, Musha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **SEBAETHA**, Baly

plagioderoides, Motschulsky ルリハムシ
Etud. Ent. IX., p. 27, (1860).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

balyi, Bates タイワンルリハムシ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 354, (1866).
Loc. Distr.—Tansui, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHYGASIA**

ornata, Baly フタホシクロキクビハムシ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 445, (1876).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinchiku, Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Group V. CRYPTOSTOMES

Subfamily **HISPINAE**

Genus **BOTRYONOPA**, Blanchard

bicolor, Uhmann ツマグロアカナガハムシ
Suppl. Ent. XVI., p. 109, (1927).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo, Fuhôshô, Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LASIOCHILA**

bicolor, Pic フタイロナガハムシ
Mélanges, XLII., p. 30, (1924).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, Pic タイワンナガハムシ
Mélanges, XLII., p. 30, (1924).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

insularis, Uhmann クロチヤナガハムシ
Suppl. Ent. XVI., p. 110, (1927).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo, Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MONOCHIRUS,** Chapuis

callicantus, Bates カンショクロトゲトゲ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 354, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinkwa, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Uhmann タイワントゲトゲ
Suppl. Ent. XVI., p. 111, (1927).
Loc. Distr.—Hokuto.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ASAMANGULIA,** Maulik

horni, Uhmann ホルントゲトゲ
Suppl. Ent. XVI., p. 112, (1927).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DACTYLISPA,** Weise

corpulentina, Uhmann タピアカハバビロトゲトゲ
Suppl. Ent. XVI., p. 113, (1927).
Loc. Distr.—Hokuto, Chôsokei, Paroe, Kankau, Kôsempo, Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Uhmann キバラトゲナガトゲトゲ
Suppl. Ent. XVI., p. 115, (1927).
Loc. Distr.—Paroe, Taihoku, Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HISPA,** Linné

similis, Uhmann イネトゲトゲ
Suppl. Ent. XVI., p. 116, (1927).
Loc. Distr.—Tainan, Kankau, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily CASSIDINAE

Genus ASPIDOMORPHA, Hope

indica, Boheman ヨツカヒヲヤヂンガサ

Monogr. Cassid. II., p. 318, (1854).

Loc. Distr.—Kôsempo.

Gen. Distr.—India, Himalaya, Yunnan, Formosa.

furcata, Thunberg マエカヒヲヤヂンガサ

Nov. Ins. Spec. V., p. 87, t. 5, f. 96, (*Cassida*) (1789).

Loc. Distr.—Takao, Kôsempo, Taihôrinshô, Taihôrin, Taihanroku, Kankau, Hoozan.

Gen. Distr.—South China, India, Sunda Islands, Formosa.

Genus LACCOPTERA, Boheman

quadrimaculata bohemani, Weise ヨツモンヂンガサ

Verh. Naturf. Ver. Brünn. XLVIII., p. 42, (1910).

=*chinensis*, Boheman, Monogr. Cassid. III., p. 71, (1855) (nec. Fabricius).

Loc. Distr.—Kanetoan, Taitô, Hori, Taihoku, Kankau, Takao, Kôsempo, Hoozan, Fushôhô.

Gen. Distr.—South China, India, Andaman, Formosa.

Genus THLASPIDA, Spaeth

formosae, Spaeth アトカヒヲヤヂンガサ

Ann. Mus. Nat. Hung. XI., p. 46, (1913).

Loc. Distr.—Taihoku, Takao, Taihanroku, Tainan, Chip-Chip, Kôsempo.

Gen. Distr.—Formosa.

Genus METRIONA, Weise

circumdata, Herbst タテスヂヒメヂンガサ

Natursyst. Käfer, VIII., p. 268, t. 132, f. 11, (*Cassida*) (1799).

Loc. Distr.—Takao, Taihanroku, Taihôrinshô, Chip-Chip, Kôsempo, Tainan, Kankau, Anping, Taihôrin, Hoozan.

Gen. Distr.—East India, Indo-China, Philippines, Formosa.

thais, Boheman ホソサビヂンガサ

Monogr. Cassid. IV., p. 463, (*Coptocycla*) (1862).

Loc. Distr.—Baknlas.

Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus TAIWANIA, Spaeth

sauteri, Spaeth ザウタヂンガサ

Ann. Mus. Nat. Hung. XI., p. 48, (1913).

Loc. Distr.—Kôsempo, Hoozan, Alikang, Taihôrin, Taihôrinshô.

Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PRIOPTERA,** Hope

angusta, Spaeth フタホシキイロオホヂンガサ
Suppl. Ent. III., p. 17, (1914).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CASSIDA,** Linnè
Subgenus **DELOYALA,** Redtenbacher

vespertina, Boheman ハバビロヂンガサ
Monogr. Cassid. IV., p. 357, (1862).
Loc. Distr.—Kanshirei, Horisha.
Gen. Distr.—China, Amur, Japan proper, Formosa.

japana, Baly ヤマトヂンガサ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 212, (1874).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Indo-China.

piperata, Hope ホソバサビヂンガサ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 62, (1842).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Amur, East China, Japan proper, Formosa.

obtusata, Boheman タイナンヂンガサ
Monogr. Cassid. II., p. 405, (1854).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—East India, South China, Philippines, Formosa.

CERAMBYCIDAE 天牛科

Subfamily **PRIONINAE**
Tribe: **PARANDRINI**
Genus **PARANDRA,** Latreille

janus, Bates オホウスバカミキリ
Ent. Monthl. Mag. XII., p. 47, (1875).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Malacca, Java, Celebes, New Guinea, Formosa.

Tribe: **MACROTOMINI**
Genus **MACROTOMA,** Serville

fischeri, Waterhouse トゲフチオホウスバカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV., p. 382, (1884).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Burma, Cochin-China, Formosa.

Tribe: **CALLIPOGONINI**

Genus **EURYPODA**, SAUNDERS

antennata, SAUNDERS ヒゲナガウスバカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II., p. 110, t. 4, f. 5, (1853).
Loc. Distr.– Kôsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **MEGOPIS**, SERVILLE

Subgenus **BARALIPTON**, THOMSON

mandibularis, FAIRMAIRE デウスバカミキリ
Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII., p. 637, (1899).
Loc. Distr.– Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

sulcipenne, WHITE ミゾバネウスバカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 31, (1853).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Burma, Tenasserim, Andaman, Formosa.

sauteri, LAMEERE ザウタ:スバカミキリ
Arch. Naturg. LXXIX., A. 7, p. 176, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **AEGOSOMA**, SERVILLE

sinica sinica, WHITE ウスバカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 30, (1853).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Den. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Tribe: **PRIONINI**

Genus **PRIOTYRANNUS**, THOMSON

Subgenus **CHOLLIDES**, THOMSON

closteroides, THOMSON ミカンノコギリカミキリ
Rev. Mag. Zool., p. 264, (1877).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Tonkin, South-China, Formosa.

Genus **DORYSTHENES**, VIGORS

pici, LAMEERE クロヒラタノコギリカミキリ
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI., p. 176, (1912).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

hydropicus, Pascoe ヒメノコギリカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 91, (1857).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Tribe: **ANACOLINI**

Genus **SARMYDUS,** Pascoe

antennatus, Pascoe ヒラヒゲノコギリカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX., p. 410, (1876).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Assam, Manipur, Burma, Andaman, Nicobar, Java, Borneo, Formosa.

Subfamily **LAMIINAE**

Tribe: **DORCUDIONINI**

Genus **PLECTAURA,** Mannerheim

metallica, Bates アカガネカミキリ
Jour. Linn. Soc. Zool. Lond. XVIII., p. 236, pl. 1, f. 9, (1884).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **ECHTHISTATUS,** Pascoe

binodosus, Waterhouse フタコブカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 431, (1881).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CENTRURA,** Guérin-Méneville

costata, Guérin-Méneville スヂダカカミキリ
Voy. Deless. II., p. 62, (1843).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Tribe: **PHRISSOMINI**

Genus **AETHALODES,** Gahan

formosanus, Kriesche タイワンコブスヂカミキリ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 285, (1924).
Loc. Distr.—Chikutôki, Kôsempo, Sokutsu, Kayahara, Taiheizan.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **LAMIINI**

Genus **LAMIA**, FABRICIUS

? textor, LINNÉ エゾカミキリ

Syst. Nat. Ed. X., p. 392, (*Cerambyx*) (1758).

Loc. Distr.— \risan (after Kano).

Gen. Distr.—Saghalien, Korea, Japan proper, Formosa.

Tribe: **MONOCHAMINI**, LACORDAIRE

Genus **EPICEDIA**, THOMSON

officinator, WHITE インドカミキリ

Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI., p. 409, (1858).

Loc. Distr.—Kôshun.

Gen. Distr.—Assam, Burma, Formosa.

carolina, FAIRMAIRE シロマダラカミキリ

Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII., p. 641, (*Archidice*) (1899).

Loc. Distr.—Hoozan, Suisharyô.

Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **LEPRODERA**, THOMSON

bioculata, FAIRMAIRE フタツメヒゲナガカミキリ

Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII., p. 641, (1899).

Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo.

Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **PSACOTHEA**, GAHAN

hilaris, PASCOE キボシヒゲナガカミキリ (スズキカミキリ)

Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 103, (1857).

=*flavoguttata*, FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI., p. 133, (1887).

Loc. Distr.—Horisha, Hoozan, Suisharyô, Sokutsu, Kankau.

Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus **DIOCHARES**, PASCOE

ambigenus, CHEVROLAT コウトウタテスヂヒゲナガカミキリ

Rev. Zool. IV., p. 228, (1841).

Loc. Distr.—Kôtôsho, Kwashôtô.

Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **MONOCHAMUS**, GUÉRIN-MÉNÉVILLE

permutans, PASCOE キンケヒゲナガカミキリ

Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 103, (1857).

=*sericeomicans*, FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX., p. 67, (1889).

Loc. Distr.—Horisha, Nantô, Kanshirei, Arisan, Kankau.

Gen. Distr.—North China, India, Formosa.

bimaculatus, GAHAN フタモンヒゲナガカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 260, (1885).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—East India, Sikkim, Burma, Siam, China, Formosa.

subfasciatus, BATES ヒメヒゲナガカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 308, (1878).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

tesserula, WHITE マダラカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond. XXVI., p. 408, (1858).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus **DIHAMMUS,** THOMSON

contemtus, GAHAN タイワンヒメヒゲナガカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 62, (1888).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

speciosus, GAHAN ギンケヒゲナガカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I., p. 274, (1888).
Loc. Distr.—Kanshirei.
Gen. Distr.—China, Formosa.

cervinus, HOPE ビロドカミキリ
in Gray's Zool. Misc., p. 27, (1831).
=*fraudator*, BATES, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 309, (1873).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—North India, Nepal, Assam, Burma, Formosa, Korea, Quelpart Island, Japan proper.

rusticator, FABRICIUS クロビロドカミキリ
Syst. El. II., p. 294, (1801).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Ceylon, Malacca, Sunda Islands, Philippines, Formosa.

Genus **ORSIDIS,** PASCOE

sobrius, PASCOE シナビロドカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 246, (1858).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa, Borneo.

Genus **MELANAUSTER,** THOMSON

chinensis, FORSTER クワゴマダラカミキリ
Nov. Spec. Ins., p. 39, (*Cerambyx*) (1771).
=*macularius*, THOMSON, Syst. Ceramb., p. 553, (1865).

Loc. Distr.—Taihoku, Shinchiku, Horisha, Kwarenkō, Tainan, Ratō, Taipin, Kappanzan, Kagi, Heitō.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, China, Formosa.

luridus, PASCOE ハイゴマダラカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 47, (1856).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—North China, Formosa.

beryllinus, HOPE オホゴマダラカミキリ
Proc. Linn. Soc. Lond. I., p. 79, (1840).
Loc. Distr.—Mashitabaon.
Gen. Distr.—Assam, Formosa.

Genus **EUPROMUS,** PASCOE

ruber, DALMAN ホシベニカミキリ
in Schönh. Ins. I., 3, Append. p. 167, (1817).
Loc. Distr.—Taipin?
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

Genus **ARISTOBIA,** THOMSON

hispida, SAUNDERS ホリヒゲナガカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II., p. 112, pl. 4, f. 6, (1857).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa, North China.

Genus **CELOSTERNA,** BLANCHARD

pulchellator, WESTWOOD シロモンヒゲナガカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond. V., p. 123, (1837).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **URAECHA,** THOMSON

angusta, PASCOE ホソヒゲナガカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 49, (1856).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

bimaculata, THOMSON フタツメホソヒゲナガカミキリ
Syst. Cerumb., p. 85, (1864).
Loc. Distr.—Arisan, Kōsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **BLEPEPHAEUS**, Pascoe

succinctor, Chevrolat ウスモンフトカミキリ
Rev. Zool. (2) IV., p. 417, (1852).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, China, Tenasserim, Malacca, East India, Burma, Assam.

Genus **CEREOPSIUS**, Pascoe

decolorata, Schwarzer アヤモンフトカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 59, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

decolorata var. **annulicorne**, Schwarzer
Ent. Blätt. XXI., p. 59, (1925).
Loc. Distr.—Pilam.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EUTAENIA**, Thomson

trifasciella, White ミツオビフトカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond. XVIII., p. 13, f. 1, (1850).
Loc. Distr.—Rônô, Alikang.
Gen. Distr.—China, North India, Penang, Formosa.

Tribe: **BATOCERINI**, Lacordaire
Genus **BATOCERA**, Casternau

?rubus, Linné イチヂクカミキリ
Syst. Nat. ed, X., p. 390, (*Cerambyx*) (1758).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—India, Malay, Indo China, Philippines, Formosa.

rubus var. **formosana**, Kriesche
Arch. Naturg. LXXX., A. II, p. 136, (1915).
Loc. Distr.—Kagi, Taihoku, Horisha, Taitô.
Gen. Distr.—Formosa.

punctata, Schwarzer タイワンオホカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 60, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

davidis, Deyrolle ダビヅドオホカミキリ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII., p. 131, (1878).
=*henrietta*, Kriesche, Arch. Naturg. LXXX., A. 11, p. 138, f. 2, (1915).
Loc. Distr.—Horisha, Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—China, Formosa.

lineolata var. **variecollis,** SCHWARZER シロスヂカミキリ變種
Ent. Blätt. XXI., p. 60, (1925).
Loc. Distr.—Kōsempo, Shinkwa, Suisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **APRIONA,** CHEVROLAT

germari, HOPE クワカミキリ
in Gray's Zool. Misc. I., p. 28, (1831).
=*rugicollis,* CHEVROLAT, Rev. Zool. (2) IV., p. 418, (1852).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinchiku, Ratō, Horisha.
Gen. Distr.—Silhet, Formosa, China, Loo-Choo, Japan proper.

Tribe: **MESOSINI**

Genus **MESOSA,** LATREILLE

perplexa, PASCOE チヤゴマフカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 243, (1858).
Loc. Distr.—Horisha, Taihoku, Urai.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

japonica, BATES ゴマフカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 312, (1873).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

longipennis, BATES ナガゴマフカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 312, (1873).
Loc. Distr.—Ratō, Shikikun.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

formosana, SCHWARZER タカサゴゴマフカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 60, (1925).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CACIA,** NEWMAN

aspersa, NEWMAN コウトウシモフリカミキリ
Entomol. I., p. 291, (1842).
Loc. Distr.—Kōtōsho?
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **AGELASTA,** NEWMAN

nigromaculata, GAHAN コウトウゴマフカミキリ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XXXIV., p. 52, (1895).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

formosana, Schwarzer シロゴマフカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 61, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CHOEROMORPHA,** Chevrolat

trifasciata, Newman キミスヂゴマフカミキリ
Entomol. I., p. 288, (1842).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Genus **COPTOPS,** Serville

anancyloides, Schwarzer ハイマダラゴマフカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 61, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Schwarzer クロゴマフカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 62. (1925).
Loc. Distr.—Paroe, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

aedificator, Fabricius アヤゴマフカミキリ
Ent. Syst. I., 2, p. 275, (*Ceramlyx*) (1792).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa, Ceylon, India, Bourbon, Mauritius, Madagascar, Africa.

Genus **SAIMIA,** Pascoe

alternans, Schwarzer ヒロオビゴマフカミキリ
Ent. Blätt. XXI., 62, (1925).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo, Pilam, Fuhôshô, Taihôrin, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **ANCYCLONOTINI**

Genus **APALIMNA,** Bates

liturata, Bates ヒゲナガゴマフカミキリ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII., p. 242, t. 2, 5, (1884).
Loc. Distr.—Horisha, Kayahara, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

palimnoides, Schwarzer テイモンヒゲナガカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 62, (1925).
Loc. Distr.—Shinchiku, Horisha, Taihôrin, Fuhôshô, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **RHODOPINI**
Genus **RHODOPIS,** Thomson

lewisi, Bates セミスヂカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 313, (1873).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

albomaculata, Gahan シロマダラカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V., p. 60, (1890).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Sikkim, Darjeeling, Nepal, Formosa.

Tribe: **DORCASCHEMATINI**
Genus **CYLINDREPOMUS,** Blanchard

virgatus, Gahan ハイマダラカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V., p. 61, (1890).
Loc. Distr.—Pinan.
Gen. Distr.—Himalaya, Formosa.

Genus **OLENOCAMPTUS,** Chevrolat

formosanus, Pic タカサゴシロカミキリ
Longic. IX., I, p. 19, (1914).
Loc. Distr.—Alikang, Kôsempo Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

bilobus, Fabricius ムツボシシロカミキリ
Syst El. II., p. 324, (1807).
Loc. Distr.—Horisha, Taihoku, Kanshirei.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Siam, Malay, India, Ceylon, Formosa.

clarus, Pascoe ムネホシシロカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V., p. 44, (1854).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—North China, Formosa.

optatus, Pascoe ヤツホシシロカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 253, (1866).
Loc. Distr.—Heitô.
Gen. Distr.—Malacca, Borneo, Formosa.

biocellatus, Schwarzer ジヤノメカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 63, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

marginatus, Schwarzer フチトリシロカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 63, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NYCTIMENINI**

Genus **NYCTIMENE,** Thomson

varicornis, Fabricius タテスヂドウボソカミキリ
Syst. El. II., p. 325, (1801).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Sumatra, Java, Formosa.

Genus **EUSEBOIDES,** Gahan

plagiatus, Gahan アラカハカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI., p. 386, pl. 19, f. 6, (1893).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Sikkim, Formosa.

Tribe: **HOMONOEINI**

Genus **MICROMULCIBER,** Aurivillius

4-signatus, Schwarzer ヨツスヂカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 64, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **BUMETOPIA,** Pascoe

oscitans var. **variegata,** Schwarzer ウスアヤカミキリ變種
Ent. Blätt. XXI., p. 64, (1925).
Loc. Distr.—Anping, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

oscitans var. **plagiata,** Schwarzer ウスアヤカミキリ變種
Ent. Blätt. XXI., p. 64, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **HECYRINI**

Genus **HECYRA**, THOMSON

formosana, PIC ビワクワヤカミキリ
Mélanges, XXVI., p. 7, (1917).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MOECHOTYPA**, THOMSON

delicatula, WHITE ホリシヤワヤカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 268, (1858).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Assam, Burma, Laos, Formosa.

Tribe: **NIPHONINI**, PASCOE

Genus **ABRYNA**, NEWMAN

coenosa, NEWMAN サビアヤカミキリ
Entomolog. I., p. 289, (1842).
=*obscura*, SCHWARZER, Ent. Blätt. XXI., p. 65, (1925).
Loc. Distr.—Horisha, Nantô, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Genus **NIPHONA**, MULSANT

furcata, BATES タケノハイイロカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 314, (1873).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PTEROLOPHIA**, NEWMAN

binodosa, BATES スヂダカサビカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 350, (1866).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Hoozan, Tainan, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

kaleea, BATES ナカジロサビカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 351, (1866).
Loc. Distr.—Nantô, Suisha.
Gen. Distr.—Formosa.

fainanensis, PIC タイナンサビカミキリ
Mélanges, XLV., p. 32, (1926).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen Distr.—Formosa.

latefascia, SCHWARZER ヨコスヂサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 65, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

gibbosipennis, PIC コブバネサビカミキリ
Mélanges, XLV., p. 32, (1926).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

scutellata, SCHWARZER オホナカジロサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 66, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Alikang, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

lunigera var. **formosana,** SCHWARZER フキモンサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 66, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo,
Gen. Distr.—Formosa.

obscura, SCHWARZER スヂサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 66, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Kankau, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

obscura var. **postica,** SCHWARZER
Ent. Blätt. XXI., p. 66, (1925).
Loc. Distr.—Fushôhô, Hoozan, Sokutsu, Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

caudata, BATES トガリシロオビサビカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 315, (1873).
Loc. Distr.—Kanshirei.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

jugosa, BATES ナカジロサビカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 315, (1873).
Loc. Distr.—Hokuto.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

rigida, BATES シリジロサビカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 316, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

angusta, BATES アトジロサビカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 317, (1873).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

melanula, PASCOE アトキサビカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 106, (1857).
Loc. Distr.—Heitô.
Gen. Distr.—Malacca, Borneo, Formosa.

Genus **MARMYLARIS,** Pascoe

buckleyi, Pascoe バクレイサビカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 107, (1857).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Himalaya, Formosa.

Genus **PSEUDALE,** Schwarzer

fasciata, Schwarzer オビサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 67, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MESOPE[illegible]HEA,** Schwarzer

variabilis, Schwarzer マダラサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 67, (1925).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LYCHROSIS,** Pascoe

zebrinus, Pascoe シロマダラサビカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 252, (1858).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Den. Distr.—North India, Formosa

Genus **ALBANA,** Mulsant

laterialba, Schwarzer シロヘリサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 68, (1925).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ENISPIA,** Pascoe

cleroides, Gahan アカシサビカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V., p. 73, p. 17, f. 7, (1890).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—North India, Formosa.

formosana, Schwarzer タカサゴサビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 68, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: APOMECYNINI

Genus APOMECYNA, LATREILLE

maculaticollis, PIC ムネモンサビカミキリ
Mélanges, XXVIII., p. 6, (1918).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

alboguttata, MEGERLE シラホシサビカミキリ
Cat. Ins. Append. Nov., p. 10, nr. 473, (1802).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Bengal, Australia.

albopicta, PASCOE シロテンサビカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVII., p. 245, (1886).
Loc. Distr.—Taihôrin
Gen. Distr.—Formosa. Delagoa Bay.

naevia, BATES ホソサビカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 817, (1873).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

quadrifasciata, THOMSON ヨツオビサビカミキリ
Physis, II., p. 159, (1868).
Loc. Distr.—Kanshirei, Taihôrin.
Gen. Distr.—Philippines, Laos, Formosa.

neglecta, PASCOE メロンサビカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III., p. 152, (1865).
Loc. Distr.—Taihoku, Taipin, Hôkotô.
Gen. Distr.—Japan proper, Ceylon, Bengal, Formosa.

Genus ROPICA, PASCOE

formosana, BATES ウスフタモンサビカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 351, (1866).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihôrin, Kôsempo, Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana var. **dorsalis,** SCHWARZER
Ent. Blätt. XXI., p. 145, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana var. **variabilis,** SCHWARZER
Ent. Blätt. XXI., p. 68, (1925).
Loc. Distr.—Sokutsu, Fuhôshô, Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ASAPERDA**, Bates

agapanthina, Bates シナノクロカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 386, (1873).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

rufipes, Bates キクスヒカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 386, (1873).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **MICROLERA**, Bates

ptinoides, Bates ヒシカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 380, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **PTERICOPTINI**, Lacordaire

Genus **ATIMURA**, Pascoe

fulva, Schwarzer キイロチビカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 145, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **SYBRA**, Pascoe

baculina, Bates アトモンチビカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 352, (1866).
Loc. Distr.—Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

punctatostriata, Bates テンスヂチビカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 351, (1866).
Loc. Distr.—Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

ordinata, Bates ワタカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 318, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

alternans, Wiedemann クロチビカミキリ
Zool. Mag. II., I. p. 111, (*Pterolophia*) (1823).
=*umbratica*, Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III., p. 203, (1865).
Loc. Distr.—Arisan, Kuraru, Rōnō, Chōsokei, Taihoku, Kanshirei.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines, Java, Borneo.

quadrinotata, SCHWARZER カクムネチビカミキリ
Ent. Blätt. XXI, p. 145, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **POGONOCHERINI,** LACORDAIRE
Genus **POGONOCHERUS,** ZETTERSTEDT

seminiveus, BATES ネジロカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, p. 382, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **HIPPOPSINI,** THOMSON
Genus **ULACONOTUS,** THOMSON

pachypezoides, THOMSON タテジマカミキリ
Syst. Ceramb., p. 99, (1864).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **POTHYNE,** THOMSON

silacea, PASCOE シロスヂドウボソカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, p. 278, (1871).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Hainan, Formosa.

capito var. **formosana,** SCHWARZER マツコウドウボソカミキリ
Ent. Blätt. XXI, p. 146, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

variegata, THOMSON マダラドウボソカミキリ
Syst. Ceramb., p. 98, (1864).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Assam, Burma, Siam, Formosa.

Genus **PSEUDOCALAMOBIUS,** KRAATZ

japonicus, BATES ドウボソカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, p. 383, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Amur, Japan proper, Formosa.

filiformis, FAIRMAIRE シナドウボソカミキリ
Rev. d'Ent. VII, p. 146, (1888).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Tribe: **SPALACOPSINI**

Genus **EUCOMATOCERA,** WHITE

vittata, WHITE ナガフドウボソカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII., p. 49, pl. 1, f. 3, (1846).
Loc. Distr.—Arisan
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **ACANTHOCININI,** LACORDAIRE

Genus **OSTEDES,** PASCOE

inermis, SCHWARZER モンクロドウボソカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 146, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Hoozan, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **RONDIBILIS,** THOMSON

spinosula, PASCOE ウスグロドウボソカミキリ
Journ. Ent. I, p. 62, (1860).
Loc. Distr.—Hoozan, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Molucca, New Guinea, Palawan, Formosa.

Genus **EOPORIMIMUS,** SCHWARZER

bifasciana, SCHWARZER フタスヂハイイロカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 147, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EXOCENTRUS,** MULSANT

seriatomaculatus, SCHWARZER アトモンマルケシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 147, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MIAENIA,** PASCOE

subfasciata, SCHWARZER ウスオビケシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 148, (1925).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CAMPTOMYNE,** PASCOE

variepennis, SCHWARZER モンマダラケシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 147, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **SAPERDINI**, MULSANT

Genus **SAPERDA**, FABRICIUS

?decempunctata, GEBLER トホシカミキリ
Ledeb. Reise, II., p. 186, (1830).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Siberia, Japan proper, Formosa.

magnifica, SCHWARZER コウセンカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 148, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EUTETRAPHA**, BATES

ocelota, BATES ヤツメカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 387, (1873).
Loc. Distr.—Kankô, Taikan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CAGOSHIMA**, THOMSON

sanguinolenta, THOMSON ハンノカミキリ
Syst. Ceramb., p. 116, (1864).
Loc. Distr.—Rantaizan, Niitaka.
Gen. Distr.—Saghalien, Japan propər, Formosa.

Genus **THYESTILLA**, AURIVILLIUS

gebleri, FALDERMANN アサカミキリ
Mém. Acad. Petersb. II., p. 434, pl. 5, f. 6, (1835).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—East Siberia, Japan proper, Korea, Formosa.

Genus **PRAOLIA**, BATES

citrinipes, BATES ヒゲナガヒメルリカミキリ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII., p. 267, (1884).
Loc. Distr.—Takao, Heitô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **SERIXIA**, PASCOE

atripennis, PIC クロバカミキリ
Mélanges, XL., p. 20, (1923).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

signaticornis, SCHWARZER ヒゲボソカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 149, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

longicornis, PASCOE キイロヒゲボソカミキリ
Journ. Ent. (2) IV., p. 255, (1858).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Malay, Burma, Batzan, Formosa.

Genus **NEOSERIXIA,** SCHWARZER

pulchra, SCHWARZER メンガタキイロカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 148, (1925).
Loc. Distr.—Kankau, Banshoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **GLENIDA,** GAHAN

suffusa, GAHAN ウスアヲフカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 66, (1888).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Tribe: **GLENEINI,** LACORDAIRE
Genus **GLENEA,** NEWMAN

assimilis, GAHAN カタチヤシラホシカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX., p. 484, (1897).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Sylhet, Assam, Formosa.

relicta, PASCOE シラホシカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV., p. 258, (1858).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—North China, Japan proper, Formosa.

lineosa, AURIVILLIUS シロスヂカミキリ
Junk's. Col. Cat., 74, p. 499, (1923) (nom. nov.).
=*lineata,* GAHAN, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX., p. 483, (1897).
Loc. Distr.—Taitô.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

chlorospila, GAHAN リウキウホシカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIX., p. 488, (1897).
Loc. Distr.—Taitô.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

anulicornis, SCHWARZER ヒゲワホシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 149, (1925).

Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, SCHWARZER ザウタキスヂホシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 150, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Alikang, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, SCHWARZER キスヂトガリカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 150, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana ab. **lineatomaculata,** SCHWARZER
Ent. Blätt. XXI., p. 150, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

acutoides, SCHWARZER アトキリキスヂホシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 151, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

lacteomaculata, SCHWARZER モンシロホシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 151, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

diversenotata, SCHWARZER ムネシロスヂホシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 152, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

chrysomaculata, SCHWARZER ルリボシカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 152, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

chrysomaculata var. **conjuncta,** SCHWARZER
Ent. Blätt. XXI., p. 153, (1925).
Loc. Distr.—Kankau, Kosempo.
Gen. Distr.—Formosa.

versuta, NEWMAN キスヂカミキリ
Entomolog. I., p. 302, (1842).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **PARAGLENEA,** BATES

swinhoei, BATES モンクロウスアヲカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 352, f. 3, (1866).

Loc. Distr.—Kanshirei, Taihoku, Taihôrin, Suisharyô, Sokutsu, Kankau
Gen. Distr.—Formosa, China.

Genus **DAPHISIA**, PASCOE

formosana, SCHWARZER モンキカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 153, (1925).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo, Pilam. Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HETEROGLENEA**, GAHAN

glechoma, PASCOE シロスヂチビカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III., p. 409, (1867).
Loc. Distr.—Kôtôsho, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines, Sumatra.

Tribe: **PHYTOECIINI**, LACORDAIRE

Genus **NUPSERHA**, THOMSON

bicolor, THOMSON クビアカリンゴカミキリ
Archiv Ent. I., p. 147, (1857).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Formosa.

fricator, DALMAN ツマグロリンゴカミキリ
in Schönh. Syn. Ins. I., 3, Append. p. 183, (1817).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Burma, Malacca, Borneo, Java, Celebes, Mindanao, Formosa.

Genus **OBEREA**, MULSANT

bicoloripes, PIC ウスキホソリンゴカミキリ
Longic. X., 1, p. 16, (1916).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

binotaticollis, PIC ムネモンホソリンゴカミキリ
Mélanges, XIII., p. 13, (1915).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

fuscipennis, CHEVROLAT チヤバネホソリンゴカミキリ
Rev. Zool. (2) IV., p. 419, (1852).
=*fulveola*, BATES, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 390, (1873).
Loc. Distr.—Taihôrin, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, China.

griseopennis, SCHWARZER ハイイロホソリンゴカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 154, (1925).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo, Sôkutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

holoxantha formosana, PIC フチジロホソリンゴカミキリ
Longic. VIII., 1, p. 21, (1911).
Loc. Distr.—Alikang, Fuhôshô, Hoozan, Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

lineaticeps, PIC スヂアシホソリンゴカミキリ
Longic. VIII., 1, p. 21, (1911).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

reductesignata, PIC スヂウスホソリンゴカミキリ
Longic. X., 1, p. 17, (1916).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

subannulipes, PIC ビツクホソリンゴカミキリ
Mélanges, V., p. 19, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen Distr.—Formosa.

?japonica, THUNBERG リンゴカミキリ
Mus. Nat. Acad. Upsal. IV., p. 57, Moto. 10, (Non. fig.) (1787).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

marginella, BATES ヘリグロリンゴカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 388, (1873).
Loc. Distr.—Taihoku, Kusukusu.
Gen. Distr.—Amur, Japan proper, Korea, Formosa.

marginella var. **kankauensis,** SCHWARZER
Ent. Blätt. XXI., p. 143, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

posticata, GAHAN タイワンリンゴカミキリ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XXXIV., p. 94, (1895).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **LINDA,** THOMSON

fraterna, CHEVROLAT ウライリンゴカミキリ
Rev. Zool. (2) IV., p. 149, (1852).
Loc. Distr.—Urai.
Gen. Distr.—China, Formosa.

femorata, CHEVROLAT モモブトリンゴカミキリ
Rev. Zool. (2) IV., p. 419, (1852).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, China.

signaticornis, SCHWARZER ヒゲナガリンゴカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 154, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DASYLINDA,** THOMSON

testacea, SAUNDERS カバキリンゴカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. II., p. 179, pl. 16, f. 5, (1839).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Sikkim, Formosa.

Genus **EPIGLENEA,** BATES

comes formosana, KANO タイワンヨツボシカミキリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVIII., No. 95, p. 127, (1928).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHYTOECIA,** MULSANT

simulans, BATES ヒメキクスヒカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 385, (1873).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **TETRAOPINI**

Genus **ASTATHES,** NEWMAN

episcopalis, CHEVROLAT オホムラサキカミキリ
Rev. Zool. (2) IV., p. 418, (1852).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Urai, Kusukusu, Nantô.
Gen. Distr.—China, Formosa.

cyanoptera, GAHAN タイワンオホルリカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V., p. 353, (1900).
Loc. Distr.—Tainan, Horisha, Kwarenkô, Musha.
Gen. Distr.—Hainan, Formosa.

levis, NEWMAN マヘルリカミキリ
Entomolog. I., p. 299, (1842).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **PLAXOMICRUS**, THOMSON

ellipticus, THOMSON ムラサキカミキリ
Arch. Ent. I., p. 58, (1857).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **CHREONOMA**, PASCOE

fortunei, THOMSON ルリカミキリ
Arch. Ent. I., p. 58, pl. 8, f. 2, (1857).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, China, Formosa.

Subfamily **CERAMBYCINAE**

Tribe: **DISTENIINI**

Genus **CYRTONOPS**, WHITE

nigra, GAHAN クロマルクビカミキリ
Fauna Brit. Ind. Col. I., p. 60, f. 22, (1906).
Loc. Distr.—Kwanshirei, Sokutsu.
Gen. Distr.—Manipur, Formosa.

punctipennis, WHITE テンマダラマルクビカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 33, pl. 2, f. 3, (1853).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Borneo, India, Formosa.

Tribe: **ASEMINI**

Genus **ASEMUM**, ESCHSCHOLTZ

arisanum, KANO アリサンマルクビヒラタカミキリ
Ins. Mats. V., Nos. 1 & 2, p. 42, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CRIOCEPHALUS**, MULSANT

exoticus, SHARP タイワンサビカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 159, (1905).
Loc. Distr.—Heiganzan (Nôkô).
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Tribe: **OEMINI**

Genus **HYPOCESCHRUS**, THOMSON

indicus, GAHAN タカハシカミキリ
Fauna Brit. Ind. Col. I., p. 104, f. 41, (1906).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **NOCERIUS**, PASCOE

tibialis, PASCOE リザグロウスバカミキヒ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 95, pl. 23, f. 4, (1857).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

Genus **XYSTROCERA**, SERCILLE

alcyonea, PASCOE コウシユンマルクビカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 534, (1866).
Loc. Distr.—Kusukusu.
Gen. Distr.—Formosa, Borneo.

globosa, OLIVIER アヲスヂカミキリ
Ent. IV., p. 27, t. 12, f. 81, (*Cerambyx*) (1795).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau, Alikang.
Gen. Distr.—Mourisius, Seychelles, Egypt, Formosa, Japan proper.

Tribe: **ACHRYSONINI**

Genus **NORTIA**, THOMSON

carinicollis, SCHWARZER クイリロミヤマカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 20, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Fuhôshô
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CERAMBYCINI**

Genus **NEOCERAMBYX**, THOMSON

mushensis, KANO ムシヤミヤマカミキリ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XVIII., No. 97, p. 224, (1928).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MALLAMBYX**, BATES

?raddei, BLESSIG ミヤマカミキリ
Hor. Soc. Ent. Ross. IX., p. 170, f. 1, f. 7, (1872).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Amur, Japan proper, Formosa.

Genus **AEOLESTHES**, GAHAN

chrpsothrix, BATES キマダラカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 152, (1873).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

induta, NEWMAN ハイビロドミヤマカミキリ
Entomolog. I., p. 245, (*Hammaticherus*) (1842).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Ceylon, Burma, Java, Borneo, Formosa.

Genus **TRIRACHYS,** HOPE

orientalis, HOPE オホビロドミヤマカミキリ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 61, (1841).
=*formosana*, SCHWARZER, Ent. Blätt. XXI., p. 21, (1925).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **PLOCAEDERUS,** THOMSON

obesus, GAHAN ハバビロミヤマカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V., p. 51, (1890).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Andaman, Siam, Burma, Sikkim, Assam, Formosa.

Genus **CERAMBYX,** LINNÉ

cantori, HOPE タイワンヤマカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 11, (1845).
Loc. Distr.—Shinten, Roshyû, Shin'ei.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **HOPLOCERAMBYX,** THOMSON

spinicornis, NEWMAN トゲミヤマカミキリ
Entomolog. I., p. 245, (1842).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Philippines, Sunda Islands, Malay, India, Formosa.

Genus **PACHYDISSUS,** NEWMAN

parnicollis, GAHAN タイワンキマダラカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII., p. 25, 29, (1891).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—North India, Formosa.

Genus **MARGITES,** GAHAN

fulvidus, PASCOE キイロミヤマカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 236, (1858).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, North China.

Genus **DIALEGES**, PASCOE

undulatus, GAHAN カバイロヒメミヤマカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII., p. 23, (1891).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Siam, Burma, Ceylon.

Genus **LACHNOPTERUS**, THOMSON

auripennis, NEWMAN ムネグロキンアカミヤマカミキリ
Entomolog. I., p. 245, (1842).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Molucca, Philippines, Formosa?

Genus **TRACHYLOPHUS**, GAHAN

sinensis, GAHAN シナヤマカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II., p. 60, (1888).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Burma, China, Formosa.

Genus **RHYTIDODERA**, WHITE

simulans, WHITE イツシキヤマカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 132, (1853).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—Tenasserim, Malay, Malacca, Serum, Borneo, Formosa.

Genus **XOANODERA**, PASCOE

regularis, GAHAN ヘリモンシロミヤマカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V., p. 52, (1890).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—India, Burma, Formosa.

maculata, SCHWARZER キボシヒメミヤマカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 21, (1925).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **HESPEROPHANINI**

Genus **HESPEROPHANES**, MULSANT

basalis, WHITE モンキイヘカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VIII., p. 304, pl. 7, t. 6, (1855).
Loc. Distr.—Taitô.
Gen. Distr.—Himalaya, Formosa.

Genus **STROMATIUM**, Serville

longicorne, Newman イヘカミキリ
Entomolog. I., p. 246, (1842).
Loc. Distr.—Kankau, Anping, Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—India, Burma, Malay, Sunda Islands, Siam, South China, Philippines, Formosa, Loo-Choo.

barbatum, Fabricius カノウイヘカミキリ
Syst. Ent., p. 189, (*Cerambyx*) (1775).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—India, Burma, Andaman, Madagascar, Mouritius, Boulbon, Seychelles, Formosa.

Genus **GNATHOLEA**, Thomson

eburifera, Thomson ホリカハイヘカミキリ
Classif. Ceramb., p. 375, (1860).
Loc. Distr.—Takao, Hoozan.
Gen. Distr.—Siam, Malay, Malacca, Tenasserim, Borneo, Formosa.

Tribe: **PHORACANTHINI**, Lacordaire

Genus **ALLOTRAEUS**, Bates

sphaerioninus, Bates トビイロカミキリ
Ent. Monthl. Mag. XIV., p. 37, (1877).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa

Tribe: **SPHAERIONINI**

Genus **NEOSPHAERION**, Schwarzer

asiaticum, Schwarzer
Ent. Blätt. XXI., p. 22, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo, Fuhôhô, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CALLIDIOPINI**

Genus **STENYGRINUM**, Bates

quadrinotatum, Bates ヨツボシカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII., p. 154, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Quelpart Island, China, Assam, Formosa.

Genus **CERESIUM**, NEWMAN

flavipes, FABRICIUS カミヤヒメカミキリ
Ent. Syst. I., 2, p. 327, (*Cerambyx*) (1792).
Loc. Distr.—Amping, Alikang, Kankau, Pilam, Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—India, Burma, Sunda Islands, Malay, Mourisius, Madagascar, Formosa, Mexico.

leucosticticum, WHITE シラホシヒメカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VIII., p. 245, t. 6, f. 1, (1855).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Assam, Burma, Siam, Sumatra, Formosa.

immite, NEWMAN トビイロヒメカミキリ
Entomolog. I., p. 247, (1842).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

longicorne, PIC ヒゲナガヒメカミキリ
Mélanges, XLV., p. 24, (1926).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

holophaeum, BATES ヨコヤマヒメカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 153, (1873).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sinicum, WHITE テツイロヒメカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VIII., p. 245, (1855).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, North China, Formosa.

subuniforme, SCHWARZER ホクトヒメカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 22, (1925).
Loc. Distr.—Hokuto, Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

zeylanicum, WHITE セイロンヒメカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VIII., p. 246, (1885).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau, Sokutsu, Taihôrin.
Gen. Distr.—India, Borneo, Formosa, Ceylon, Tenasserim.

Genus **STENODRYAS**, BATES

clavigera, BATES アメイロカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 154, (1878).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe : **OBRIINI**

Genus **OBRIUM**, CURTIS

formosanus, SCHWARZER チビアメカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 22, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **IPHRA**, PASCOE

apicale, SCHWARZER カンカウアメカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 23, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Tribe : **PHILINI**, GAHAN

Genus **PHILUS**

pallescens, BATES コウセンカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 350, (1866).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe : **LEPTURINI**

Genus **PEITHONA**, GAHAN

prionoides, GAHAN サイトウカミキリ
Fauna Brit. Ind. Col. I., p. 72, f. 27, (1906).
Loc. Distr — ?
Gen. Distr.—Sikkim. Formosa.

Genus **LEMULA**, BATES

decipiens, BATES アカチビハナカミキリ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII., p. 212, t. I. f. 5, (1884).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **TOXOTINUS**, BATES

treini, HEYDEN モモグロハナカミキリ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIII., p. 358, (1879).
Loc. Distr.—Rantaizan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **PSEUDOPIDONIA**, PIC

aegrota, BATES ヤマノハナカミキリ

Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII., p. 214, (*Pidonia*) (1884).

Loc. Distr.—Arisan.

Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **EUSTRANGALIA**, BATES

? distenoides, BATES クロスデハナカミキリ

Journ. Linn. Soc. Zool. XVIII., p. 222, t. I. f. 4, (1884)

Loc. Distr.—Niitaka.

Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **EPHIES**, PASCOE

coccineus, GAHAN ホウライハナカミキリ

Fauna Brit. Ind., p. 87, f. 34, (1906).

Loc. Distr.—Fuhōshō.

Gen. Distr.—Buhtan, Kohasi Hills, Upper Burma, Tenasserim, Formosa.

Tribe: **ENCYCLOPINI**

Genus **PYRRHONA**, BATES

laeticolor, BATES ヘリウスハナカミキリ

Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII., p. 224, (1884).

Loc. Distr.—Taipin.

Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **NECYDALINI**

Genus **NECYDALIS**, LINNÉ

pennata, LEWIS ホソコバネカミキリ

Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV., p. 464, (1879).

Loc. Distr.—Arisan.

Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **THRANIINI**, GAHAN

Genus **THRANIUS**, PASCOE

gibbosus, PASCOE コウトウトラフハナカミキリ

Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V., p. 23, (1895).

Loc. Distr.—Kôtôsho.

Gen. Distr.—South India, Ceylon, Formosa.

variegatus, BATES トラフハナカミキリ

Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 196, (1873).

Loc. Distr.—Arisan.

Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

formosanus, SCHWARZER タカサゴホソバハナカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 23, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Hoozan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

signatus, SCHWARZER モンキホソバハナカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 23, (1925).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **MOLORCHINI**

Genus **EPANIA,** PASCOE

brevipennis, PASCOE ヒメコバネハナカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III., p. 567, (1869).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Singapore, Formosa.

subchalybeata, SCHWARZER コウセンコバネハナカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 24, (1925) (*Epania sp.?*).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MERIONOEDA,** PASCOE

formosana, HELLER モモブトコバネハナカミキリ
Ent. Blätt. XX., p. 32, (1924).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

uraiensis, KANO ウライモモブトカミキリ
Ins. Mats. V., Nos. 1 & 2, p. 43, f. 1, (1930).
Loc. Distr.—Urai.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **EROSCHEMINI**

Genus **PYROCALYMMA,** THOMSON

pyrochroides, THOMSON アリサンハナカミキリ
Syst. Ceramb., p. 160, (1864).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Sikkim, Darjeeling, Formosa, Manipur, Burma, Penang.

Tribe: **PYRESTINI**

Genus **PYRESTES,** PASCOE

cardinalis, PASCOE クスベニカミキリ
Journ. Ent. II., p. 50, (1863).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

curticornis, Pic コヒゲベニカミキリ
Mélanges, XXXVIII., p. 13, (1923).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Schwarzer ホソクスベニカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 24, (1925).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kōsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ERYTHRUS,** White

formosanus, Bates タカサゴベニカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 350, (1866).
Loc. Distr.—Pilam.
Gen. Distr.—Formosa.

fortunei, White ハネビロベニカミキリ
Cat. Col Brit. Mus. VII., p. 142, (1853).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—North China, Formosa.

Tribe: **PROTHEMINI,** Lacordaire
Genus **PROTHEMA,** Pascoe

ochraceosignata, Pic ウスグロベニカミキリ
Mélanges, XII., p. 10, (1915).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

ochraceosignata nigra, Kano
Ins. Mats. V., No. 1 & 2, p. 42, (1930).
Loc. Distr.—Kirai.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EURYARTHRUM,** Blanchard

albocinctum, Blanchard シロオビクロカミキリ
Hist. Nat. Ins. II., p. 170, (1845).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Malay, Borneo, Formosa.

Tribe: **CALLICHROMINI,** Lacordaire
Genus **COLOBORHOMBUS,** Thomson

hemipterus, Olivier コバネカミキリモドキ
Ent. IV., 69, p. 127, t 23, f. 181, (*Nothopeus*) (1795).
Loc. Distr.—Kusukusu.
Gen. Distr.—Java, Burma, North India, Formosa.

Genus **ZINIPTERUS,** Hope

flavitarsis, Hope アヲサムカミキリ
Trans. Linn. Soc. Lond. XIX., p. 111, t. 10, f. 7, (1843).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—Assam, Formosa.

Genus **PACHYTERIA,** Serville

dimidiata, Westwood マンダラウスバネカミキリ
Cabin. Or. Ent., p. 60, t. 29, f. 8, (1848).
Loc. Distr.—Rônô.
Gen. Distr.—Assam, Formosa.

Genus **APHRODISIUM,** Thomson

neoxenum, White ミヤマアヲカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 154, (1853).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Assam, Formosa.

semiignitus, Chevrolat ムラサキアヲカミキリ
Rev. Zool., p. 227, (1841).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

semivelutinum, Schwarzer ウスアヲカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 24, (1925).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **AROMIA,** Serville

faldermanni, Saunders キクビウスバネカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II., p. 111, t. 4, f. 7, (1850).
Loc. Distr.—Niitaka.
Gen. Distr.—East Siberia, Mongoria, China, Formosa.

Genus **CALLICHROMA,** Latreille

bimaculatum, White フタモンウスバネカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 165, (1853).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **CHLORIDOLUM,** Thomson

thomsoni, Pascoe トムソンオホアヲカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V., p. 24, (1854).

Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

cinnyris, Pascoe ヒゲナガアヲカミキリ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 518, (1866).
Loc. Distr.—Kôtôsho, Kôshun.
Gen. Distr.—Penang, Burma, Java, Borneo, Formosa.

pertaetum, White タイワンアヲカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 161, (1853).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Assam, Tenasserim, Formosa.

Genus **LEONTIUM,** Thomson

viride, Thomson ホソアヲカミキリ
Syst. Ceramb., p. 175, (1864).
=*tenuatum*, Bates, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII., p. 197, (1873).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

bicolor, Kano ムラサキホソカミキリ
Ins. Mats. V., Nos. 1 & 2, p. 44, f. 2, (1930).
Loc. Distr.—Urai.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CHELIDONIUM,** Thomson

quadricolle, Bates カクムネアヲカミキリ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII., p. 226, (1884).
Loc. Distr.—Taibeizan?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sinense, Hope シナアヲカミキリ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 63, (1842).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—China, Burma, Sikkim, Formosa.

Genus **POLYZONUS,** Casternau

obtusus, Bates キスヂグロアヲカミキリ
Cist. Ent. II., p. 413, (1879).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Saigun, Formosa.

tetraspilotus, Hope キスヂミドリカミキリ
in Silberm. Rev. Ent. III., p. 71, t. 32, (1835).
=*quadrimaculatus*, White, Cat. Col. Brit. Mus. VII., p. 170, (1853).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Assam, Manipur, Formosa.

Tribe: **COMPSOCERINI**

Genus **ROSALIA,** SERVILLE

Subgenus **ROSALIA,** s. str.

batesi, HAROLD ルリボシカミキリ
Berl. Ent. Zeitschr. XXI., p. 360, (1877).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

lameeri, BRONGNART タイワンコルリボシカミキリ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X., Bull. p. 1 & 2, (1890).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Burma, Siam, Yunnan, Formosa.

Subgenus **EURYBATUS,** THOMSON

formosa, SAUNDERS タイワンベニボシカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. II., p. 178, t. 16, f. 4, (1839).
Loc. Distr.—Taikan, Kwankō, Arisan, Taiheizan, Horisha, Kanshirei, Suisharyō.
Gen. Distr.—Sikkim, Assam, Formosa, Himalaya.

lesnei, BOPPE ベニホシカミキリ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 103, f. I, 2, (1911).
Loc. Distr.—Arisan, Horisha, Kwarenkō.
Gen. Distr.—Formosa.

conuiva, CSIKI コウセンベニホシカミキリ
Ann. Mus. Nat. Hung. IX., p. 612, (1911).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CALLIDIINI**

Genus **SEMANOTUS,** MULSANT

japonicus, LACORDAIRE スギカミキリ
Gen. Col. IX., p. 47, nota 2, (1869).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CALLIDIUM,** FABRICIUS

rufipenne, MOTSCHULSKY ヒメスギカミキリ
Etud. Ent. IX., p. 19, (1860).
Loc. Distr.—Taihōrin, Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

arisanum, KANO アリサンヒメスギカミキリ
Ini. Mats. V., Nos. 1 & 2, p. 44, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHYMATODES,** Mulsant

albofasciatus, Motschulsky シロオビカミキリ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX., I, p. 174, (1866).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

maaki, Kraatz アカネカミキリ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIII., p. 104, (1879).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Amur, Japan proper, Formosa.

Tribe: **CLITINI**

Genus **XYLOTRECHUS,** Chevrolat

grayi, White ムネマダラトラカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VIII., p. 261, t. 6, f. 4, (1855).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kōsempo, Kankau, Pilam, Taihōrin, Hoozan, Horisha.
Gen. Distr.—North China, Japan proper, Formosa.

chinensis var. **laterufescens,** Pic トラカミキリ變種
Mélanges, V., p. 19, (1913).
Loc. Distr.—Taipin, Horisha.
Gen. Distr.—North China, Japan proper, Formosa.

chinensis var. **sauteri,** Shwarzer
Ent. Blätt. XXI., p. 26, (1925).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

contortus, Gahan ホソトラカミキリ
Fauna Brit. Ind. Col. I., p. 247, (1906).
Loc. Distr.—Shishitō, Arisan, Horisha, Kwarenkō.
Gen. Distr.—Sikkim, Bhutan, Formosa.

buqueti, Casternau et Gory ブーケトラカミキリ
Hist. Nat. Iconogr. Ins., Coleopt, p. 86, pl. 16, f. 99, (1841).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Darjeeling, Burma, Andaman, Siam, Java, Formosa.

magnicollis, Fairmaire クビアカトラカミキリ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII., p. 34, (1888).
Loc. Distr.—Banshoryō, Kōsempo, Fuhōshō, Taihōrin, Alikang.
Gen. Distr.—China, Formosa.

magnicollis var. **atrithorax,** Pic
Echange, XXVI., p. 30, (1910).
Loc. Distr.—Horisha, Arisan, Musha, Kōsempo, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

quadripes, CHEVROLAT アカアシクロトラカミキリ
Mém. Soc. Sc. Liège, XVIII., p. 315, (63), (1863).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—East India, Burma, Siama, Tonkin, Formosa.

incurvatus, CHEVROLAT コウセンクロトラカミキリ
Mém. Soc. Sc. Liège, XVIII., p. 331, (179), (1863).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—South China, East India, Formosa.

basalis, SCHWARZER カタアカクロトラカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 25, (1925).
Loc. Distr.—Taihôrinshô, Alikang, Kôsempo, Fuhôshô, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, SCHWARZER ムナボシクロトラカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 26, (1925)
Loc. Distr.—Alikang, Kosempo, Fuhôshô, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CLYTUS,** LAICHARTING

callizonus, GAHAN タイワンアカネトラカミキリ
Fauna Brit. Ind. Col. I., p. 251, f. 91, (1906).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

Genus **PERISSUS,** CHEVROLAT

kankauensis, SCHWARZER カンカウトラカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 26, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

fuliginosus, CHEVROLAT サビトラカミキリ
Mém. Soc. Sc. Liège, XVIII., p. 328, (1863).
Loc. Distr.—Marikoan.
Gen. Distr.—India, Tibet, Formosa.

Genus **CHLOROPHORUS,** CHEVROLAT

annularis, FABRICIUS タケノトラフカミキリ
Mant. Ins. I., p. 156, (*Cerambyx*) (1787).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Anping, Kankau, Suisha, Pilam, Tainan, Paroe, Kôtôsho, Taihoku, Shinchiku, Horisha, Musha, Kôshun, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Assam, Burma, Siam, China, Japan proper, Malacca, Java, Timor, Aru, New Guinea, Formosa, Loo-Choo.

signaticollis, CASTERNAU et GORY ウスグロトラカミキリ
Monogr., p. 103, t. 19, f. 122, (1841).
Loc. Distr.—Taihoku, Shinchiku, Horisha, Musha, Kwarenkō, Taihōrin, Sokutsu, Fuhōshō, Hoozan.
Gen. Distr.—North China, Formosa, Loo-Choo.

signaticollis var. **taihorensis,** SCHWARZER
Ent. Blätt. XXI., p. 27, (1925).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

fainanensis, PIC タイナントラカミキリ
Mélanges, XXVIII., p. 4, (1918).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

douei, CHEVROLAT ヒメトラカミキリ
Mém. Soc. Sc. Liège, XVIII., p. 294, (1863).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Cochin-China, Formosa.

notabilis, PASCOE キイロトラカミキリ
Journ. Ent. I., p. 360, (1862).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

quinquefasciatus, CASTERNAU et GORY ヨツスヂトラカミキリ
Monogr., p. 101, t. 19, f. 120, (1841).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Loo-Choo, Formosa.

curvatofasciatus, AURIVILLIUS スヂボソトラカミキリ

Loc. Distr.—Kōsempo, Alikang, Taihōrin, Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

anticemaculata, SCHWARZER アトオビトラカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 27, (1925).
Loc. Distr.—Alikang, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

bimaculicollis, SCHWARZER ムネフタモントラカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 28, (1925).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

circumscriptus, SCHWARZER メンガタトラカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 28, (1925).
Loc. Distr.—Kōsempo, Fuhōshō, Taihōrin, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **RHAPHUMA,** PASCOE

elegantula, Gahan アヤトラカミキリ
Fauna Brit. Ind. Col. I., p. 271, (1906).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Niligiri, Formosa.

horsfieldi, White ホルスフイルドトラカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VIII., p. 272, (1855).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Darjeeling, Burma, Java, Formosa.

quadricolor, Casternau et Gory クマゲロトラカミキリ
Monogr., p. 104, t. 19, f. 123, (1841).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

araneipes, Schwarzer クモアシトラカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 28, (1925).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

araneipes pallida, Schwarzer
Ent. Blätt. XXI., p. 29, (1925).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

testaceipes, Pic キアシトラカミキリ
Mélanges, XII., p. 11, (1915).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DEMONAX,** Thomson

bowringi, Pascoe ボウリングトラカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V., p. 28, (1859).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

ordinatus, Pascoe コウトウミスヂトラカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 623, (1869).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—Malay, Formosa.

leucoscutellatus, Hope シロスヂトラカミキリ
in Gray's Zool. Misc., p. 28, (1831).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Nepal, Sikkim, Assam, Formosa.

Genus **PARACLYTUS,** Bates

excultus, Bates ソナンカミキリ
in Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVIII., p. 234, t. I, f. 11, (1884).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa

Genus **AGLAOPHIS,** THOMSON

nokosanus, KANO ノウコウシロヘリトラカミキリ
Ins. Mats. V., Nos. 1 & 2, p. 46, f. 5, (1930).
Loc. Distr.—Nôkô, Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **TILLOMORPHINI**

Genus **EPIPEDOCERA,** CHEVROLAT

rollei, PIC ロールカミキリ
Echange, XXVI., p. 30, (1910).
Loc. Distr.—Kankau, Taihôrin, Kôsempo, Alikang, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

lunata, NEWMAN タカノカミキリ
Entomolog. I., p. 247, (1842).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Genus **CLYTELLUS,** WESTWOOD

methocoides, WESTWOOD ホンコンカミキリ
Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II., p. 240, t. 12, f. 6, (1853).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

Tribe: **CLEOMENINI**

Genus **DERE,** WHITE

?thoracica, WHITE ホタルカミキリ
Cat. Col. Brit. Mus. VIII., p. 249, t. 8, f. 7, (1855).
Loc. Distr.—Taipin?
Gen. Distr.—Japan proper, North China, Formosa.

Genus **CLEOMENIDA,** SCHWARZER

setigera, SCHWARZER ケナガカミキリ
Ent. Blätt. XXI., p. 29, (1925).
Loc. Distr.—Kankau, Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **STENASPINI**

Genus **DICELOSTERNUS,** GAHAN

corallinus, GAHAN ベニフヤカミキリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V., p. 309, (1900).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo, Hoozan, Taihôrin. Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PURPURICENUS**, GERMAR

sanguinolentus, OLIVIER タイワンダンダラカミキリ
Ent. IV., 47, p. 93, t. 20, f. 155, (*Cerambyx*) (1795).
Loc. Distr.—Hassenzan.
Gen. Distr.—East India, Ceylon, Formosa.

Genus **STERNOPLISTES**, GUÉRIN-MÉNÉVILLE

spectabilis, MOTSCHULSKY ヘリグロベニカミキリ
Etud. Ent. VI., p. 36, (1857).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Division VI. RHYNCHOPHORA 具吻族

BRENTHIDAE 三錐象科

Tribe: **CALODROMINI**

Genus **CALODROMUS**, GUÉRIN-MÉNÉVILLE

ito, HELLER アシナガミツギリザウ
Not. Leyd. Mus., XXXII., p. 180, (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

horishanus, KANO ホリシヤアシナガミツギリザウ
Kontyû, IV., No. 3, p. 153, f, (1930).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CYPHAGOGUS**, PARRY

suaviter, KLEINE ホソミツギリザウ
Ent. Mitteil. V., Nr. 1-4, p. 2, f. 1, (1916).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

signipes, LEWIS ルリボソミツギリザウ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVII., p. 297, (1884).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CHELORHINUS**, KLEINE

propheti, KLEINE プロフエツトミツギリザウ
Ent. Mitteil. XI., Nr. 3, p. 93, (1922).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ASAPHEPTERUM**, KLEINE

formosanum, KLEINE タイワンコミツギリザウ
Ent. Mitteil. V., Nr. 1-4, p. 87, t. 1, f. 13, fig. 34-37, (1916).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Borneo.

Genus **HETEROZEMUS**, SENNA

pubens, SENNA ケブカミツギリザウ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2) XII (XXXII)., p. 439, (*Zemioses*) (1892).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Burma, Philippines, Formosa.

Genus **DICTYOTOPTERUS**, KLEINE

splendens, KLEINE タイワンツヤミツギリザウ
Ent. Mitteil. V., Nr. 1-4, p. 77, f. 29, (1916).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ALLAEOMETRUS**, SENNA

breviceps, SENNA コアシミツギリザウ
Bull. Soc. Ent. Ital. XXXIV., p. 158, (1902).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Sunda Islands, Queensland, India, Indo-China.

Genus **ISOMORPHUS**, KLEINE

latecostatus, KLEINE コスヂミツギリザウ
Ent. Mitteil. V., Nr. 1-4, p. 58, t. 2, f. 29, (1916).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

trifasciatus, KLEINE ミツスヂミツギリザウ
Ent. Mitteil. V., Nr. 1-4, p. 57, t. 2, f. 27, (1916).
Loc. Distr.—Taihôrin, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa, Sumatra.

Tribe: **STEREODERMINI**

Genus **JONTHOCERUS**, LACORDAIRE

angulaticeps, SENNA カドアシミツギリザウ
Not. Leyd. Mus. XX., 53, (1898).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Philippines, Formosa.

asiaticus, KLEINE ナンヨウミツギリザウ
Arch. Naturg. LXXXV., A. 8, p. 47, f. 12, 13, (1919).

Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Sunda Islands.

laticostatis, KLEINE スデボソミツギリザウ
Arch. Naturg. LXXXV., A. 8, p. 38, f. 4, 5, (1919).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

nigripes, LEWIS クロアシホソミツギリザウ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVII., p. 298, t. 12, f. 5♂, 6♀, (1883).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **CEROBATES,** SCHÖNHERR

birmanicus SENNA ビルマミツギリザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII., p. 364, (1894).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

canaliculatus, MOTSCHULSKY ムネミゾミツギリザウ
Etud. Ent. VII., p. 96, (1858).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Malacca, Sunda Islands, Formosa.

formosanus, SCHÖNFELDT ムネボソミツギリザウ
Deutsch. Ent. Nat.-Bibl. II., Nr. 24, p. 190, (1911).
Loc. Distr.—Banshyoryô.
Gen. Distr.—Formosa.

sumatranus, SENNA スマトラミツギリザウ
Bull. Soc. Ent. Ital. XXV., III, p. 306, t. 3, f. 1, (1893).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Ceylon to Timor, Formosa.

Tribe: **TRACHELIZINI**

Genus **TRACHELIZUS,** SCHÖNHERR

bisulcatus, FABRICIUS クチボソミツギリザウ
Syst. El. II., p. 548, (1801).
Loc. Distr.—Hoozan, Arisan.
Gen. Distr.—Ceylon to New-Guinea and Australia, Formosa.

Genus **MIOLISPA,** PASCOE

crassifemoralis, KLEINE モモブトミツギリザウ
Zool. Med. Leyd. III., 4, p. 292, (1917).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Borneo, New-Guinea.

discors, SENNA ヒメモモブトミツギリザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX., p. 353, (1895).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Malacca, Celebes, Philippines, Borneo, Formosa.

cruciata, SENNA ジウジモンミツギリザウ
Not. Leyd. Mus. XX., p. 69, (1898).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Borneo, Philippines, Formosa.

Genus **HIGONIUS,** KLEINE

bilobicollis, SENNA フタモンマルクビミツギリザウ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2) XIX (XXXIX)., p. 235, (1898).
Loc. Distr.—Hoozan, Taitô.
Gen. Distr.—Formosa, Mentawei.

cilo, LEWIS ヒメマルクビミツギリザウ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. XVII., p. 300, t. 12, f. 9, 10, (1883).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Philippines, Burma, India.

Genus **HOPLOPISTHIUS,** SENNA

trichimerus, SENNA マルクビミツギリザウ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, (2) XII., p. 452, (1892).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Burma, Sunda Islands, Nias, Philippines, Formosa.

Genus **CARCINOPISTHIUS,** KOLBE

oberthuri, SENNA セブトミツギリザウ
Bull. Soc. Ent. Ital. XXIV., p. 255, (*Moplopisthius*) (1892).
=*Pseudothaphroderes formosanus,* BOLKAY, Ann. Mus. Nat. Hist. Hung. XI., 1, p. 265, 4, (1911).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Burma, Buru, Formosa.

Tribe: **AMORPHOCEPHALINI**

Genus **LEPTAMORPOCEPHALUS,** KLEINE

laborator, KLEINE タイトウミツギリザウ
Arch. Naturg. LXXXII., A. 12, p. 133, (1918).
Loc. Distr.—Taitô.
Gen. Distr.—Malacca, Sumatra, Formosa.

Tribe: **ARRHENODINI**

Genus **PROPHTHALMUS,** LACORDAIRE

tridentatus, FABRICIUS ミツバミツギリザウ
Syst. El. II., p. 554, (1801).

Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Malacca, Sunda Islands, Formosa.

wichmanni, KLEINE ウイツヒマンミツギリザウ
Stett. Ent. Zeit. LXXVII., p. 263, f. 7, 11, 22, 30, 41, (1916).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa.

Genus **BARYRRHYNCHUS,** LACORDAIRE

miles, BOHEMAN セボシフトミツギリザウ
in Schönh. Gen. Curc., VIII., p. 372, (1845).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—East India, South China, Tonkin, Borneo, Formosa.

poweri, ROELOFS オホミツギリザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXII., p. 54, (1879).
Loc. Distr.—Horisha, Taipin, Shinchiku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Tonkin.

Genus **CHENORYCHODES,** KLEINE

planicollis, FABRICIUS ウスモンミツギリザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. III., p. 262, nota 3, (1859).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon to Tonkin, Formosa.

serrirostris, FABRICIUS ツヤハダミツギリザウ
Syst. El. II., p. 553, (1801).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Malacca, Sunda Islands, Philippines, Celebes, Formosa.

Genus **PSEUDORYCHODES,** SENNA

insignis, LEWIS モンミツギリザウ
Journ. Linn. Soc. Lond. XVII., p. 301, t. 12, f. 12, (*Orychodes*) (1883).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **BELOPHERINI**

Genus **ANANESIOTES,** KLEINE

insularis, KLEINE タイワンミツギリザウ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 133, f. (1922).
Loc. Distr.—Kôsempo, Fuhôshô, Sokutsu, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe : **ITHYSTENINI**

Genus **DIURUS**, PASCOE

sphacelatus, PASCOE オハサミミツギリザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX., p. 19, (1887).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Andaman, Formosa.

Tribe : **PSEUDOCEOCEPHALINI**

Genus **OPISTHENOPLUS**, KLEINE

fascinatus, KLEINE キオビミツギリザウ
Deutsch. Ent. Zeitschr., Nr. 1, p. 140, f. 7, 8, (1922).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Sumatra.

Genus **HOMOCERUS**, SCHÖNHERR

reticulatus, FABRICIUS ツルハシミツギリザウ
Syst. El. II., p. 552, (1801).
Loc. Distr.—Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Ceylon to East-Australia, Formosa.

ANTHRIBIDAE 長角象科

Subfamily **PLEUROCERINAE**

Genus **MECANTHRIBUS**, JORDAN

sulphurus, WATERHOUSE キイロヒゲナガザウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 24, (1876).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Andaman, Formosa.

Genus **MECOCERUS**, SCHÖNHERR

gazella, GYLLENHAL コウシユンヒゲナガザウ
in Schönh. Gen. Curc. I., p. 116, (1833).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Sumatra, Formosa.

Genus **ASEMORHINUS**, SHARP

nebulosus, SHARP ウンモンヒゲナガザウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 299, (1891).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Hoozan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

Genus **SINTOR**, SCHÖNHERR

fasciatus, JORDAN オビヒゲナガザウ
Nov. Zool. X., p. 417, (1903).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ACORYNUS**, SCHÖNHERR

anchis, JORDAN タマヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 137, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo, Fuhôshô, Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

caenonus, JORDAN ゴミヒゲナガザウ
Nov. Zool. XVIII., p. 96, (1911).
Loc. Distr.—Kôtôsho,
Gen. Distr.—Formosa. Perak.

punctipennis, JORDAN テンマダラヒゲナガザウ
Stett. Ent. Zeit. LVI., p. 152, (1895).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Perak.

Genus **LITOCERUS**, SCHÖNHERR

bicuspis, JORDAN フタテンヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 138, (1912).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

dysallus, JORDAN ソウシヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 138, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

communis, JORDAN タカサゴヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 139, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrinshô, Fuhôshô, Hoozan, Kôsempo, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

histrio, GYLLENHAL エムマヒゲナガザウ
in Schönh. Gen. Curc. I., p. 126, (1833).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Java, Sumatra.

sticticus, JORDAN ナミキリヒゲナガザウ
Nov. Zool. XI., p. 233, (1904).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Tonkin.

Genus **CEDUS**, PASCOE

diversus, JORDAN バンケヒゲナガザウ
Nov. Zool. XVIII., p. 111, (1911).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MUCRONIANUS**, JORDAN

expandus, JORDAN エビスヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 141, (1912).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NESSIODOCUS**, HELLER

triodes, JORDAN ミツギリヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 140, (*Micronianus*) (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NESSIARA**, PASCOE

formosanica, JORDAN コマダラヒゲナガザウ
Nov. Zool. XI., p. 234, (1904).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **APATENIA**, PASCOE

infans, JORDAN チビヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 141, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **OXYDERES**, JORDAN

fastigata, JORDAN オビヒゲナガザウ
Nov. Zool. XXXI., p. 236, (1924).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ZYGAENODES**, PASCOE

discoidalis, WOLFRUM ウスキヒゲナガザウ
Ent. Mitteil. XI., p. 68, (1922).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

frontalis, Wolfrum チヤイロヒゲナガザウ
Ent. Mitteil. XI., p. 59, (1922).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NERTHOMMA,** Pascoe

aplota, Jordan フナガタヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 142, (*Nerthomma*) (1912).
Loc. Distr.—Fuhosho, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHAULIMIA,** Pascoe

grammica, Jordan キゴケヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 142, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DIRECTARIUS,** Jordan

incisus, Sharp ナミエヒゲナガザウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 308, (*Tropideres*) (1891).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

Genus **TROPIDERES,** Schönherr

japonicus, Roelofs ヤマトヒゲナガザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXII., (1879).
Loc. Distr.—Hoozan, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper, Laos, Tonkin.

paviei, Lesne パビエヒゲナガザウ
Ann. Soc. Ent. Fr. LX., p. 91, (1891).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Malay, Java, Philippines, Formosa.

roelofsi poecilus, Jordan ロエロフヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 139, (1912).
Loc. Distr.—Fuhōshō, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

signellus, Jordan ジョルダンヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 140, (1912).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HABRISSUS,** PASCOE

longipes formosanus, JORDAN
Nov. Zool. XIX., p. 143, (1912).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **XYLINADES,** IMHOFF

japonicus, SHARP ヤマトフトヒゲナガザウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 317, (1891).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

maculipes, FAHRAEUS モンマダラフトヒゲナガザウ
in Schönh. Gen. Curc. V., p. 235, (183
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa, East Africa.

phycus, JORDAN ホウザンフトヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 144, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **STIBODERES,** JORDAN

impressus, JORDAN エグリフトヒゲナガザウ
Stett. Ent. Zeit. LVI., p. 253, (1895).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa, Indo-China.

impressus stibinus, JORDAN
Nov. Zool. XIX., p. 143, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DENDROTROGUS,** JEKEL

angustipennis, JORDAN ホソバフトヒゲナガザウ
Stett. Ent. Zeit. LVI., p. 191, (1895).
Loc. Distr.—Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa, Indo-China.

colligens, WALKER タイホクフトヒゲナガザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. III., p. 261, (1859).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan, proper, Ceylon, Formosa.

Genus **BASITROPIS**, JEKEL

nitidicutis, JEKEL ツヤフトヒゲナガザウ
Ins. Saunders. I., p. 92, (1855).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper, Ceylon, Borneo, Indo-China.

persimilis, JORDAN ニセフトヒゲナガザウ
Nov. Zool. XXIII., p. 363, (1916).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHLOEOBIUS**, SCHÖNHERR

gigas, FABRICIUS オホフトヒゲナガ ウ
Syst. Ent., p. 63, (*Curculio*) (1775).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Australia, New-Guinea, Formosa.

alternans, WIEDEMANN ミカンヒゲナガザウ
Zool. Mag. I., 3, p. 172, (1819).
Loc. Distr.—Shinchiku, Inrin
Gen. Distr.—India, Indo-China, Sumatra, Formosa, Japan proper.

Genus **PARAPHLOEOBIUS**, JORDAN

brevis, JORDAN コヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 145, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CACCORHINUS**, SHARP

oculatus formosanus, JORDAN ミナミヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 144, (1912).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EXILLIS**, PASCOE

longicornis, PASCOE オホヒゲナガザウ
Ann. Mag. Nat. Hist. V., p. 43, (1860).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa, India, Malay archipelago.

Subfamily **ANOCERINAE,** JORDAN

Genus **APOLECTA,** PASCOE

paraplesia, JORDAN クダヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 145, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo, Fuhôshô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ARAECERUS,** SCHÖNHERR

fasciculatus, DE GEER ワタヨヒゲナガザウ
Ins. V., p. 276, t. 16, f. 2, (*Curculio*) (1775).
Loc. Distr.—Kagi, Heitô.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus **DEROPYGAS,** SHARP

didymus, JORDAN コウセンヒゲナガザウ
Nov. Zool. XIX., p. 251, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

CURCULIONIDAE 象鼻蟲科

(*Curculiones Adelognathi*)

Tribe: **SITONINI**

Genus **EUGNATHUS,** SCHÖNHERR

distinctus, ROELOFS コフキザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XVI., p. 179, (1873).
Loc. Distr.—Tainan, Heitô, Kôshun, Shôkwa, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

cleroides, VOSS フタオビコフキザウ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 215, 222, (1915).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CNEORRHININI**

Genus **DERMATOXENUS,** MARSHALL

caesicollis, GYLLENHAL コシロコフキザウ
in Schönh. Gen. Curc. I., p. 619, (*Lagotomus*) (1833).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Formosa, Java.

Tribe: TANYMECINI

Genus TANYMECUS, Schönherr

circumdatus, Wiedemann ハイイロザウ
Germ. Nag. IV., p. 156, (*Curculio*) (1821).
Loc. Distr.—Tainan, Shinkwa, Heitô.
Gen. Distr.—Assam, Burma, Punjab, Nepal, China, Formosa.

Genus HYPOMECES, Schönherr

squamosus, Fabricius ワタオホアヲザウ
Ent. Syst. I., 2, p. 452, (*Curculio*) (1792).
Loc. Distr.—Taihoku, Taichû, Horisha, Tainan, Heitô, Kôshun, Hôkotô.
Gen. Distr.—Burma, Siam, Sumatra, Java, Philippines, China, Formosa.

Genus CHLOROPHANUS, Germar

lineolus, Motschulsky キベリオホアヲザウ
Etud. Ent., p. 54, (1853).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—China Formosa.

Genus SCEPTICUS, Roelofs

tigrinus, Roelofs スナムグリヘウタンザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. XVI., p. 161, (*Piazomias*) (1873).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus SYMPIEZOMIAS, Faust

cribricollis, Kono ホソヘウタンザウ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIV., p. 189, (1930).
Loc. Distr.—Kôshun, Tainan, Horisha, Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: PACHYRRHYNCHINI

Genus METAPOCYRTUS, Heller

Subgenus TRACHYCYRTUS, Heller

immeritus, Boheman アカアシカタザウ
Gen. Curc., 8, p. 395, (*Apocyrtus*) (1845).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Genus **PACHYRRHYNCHUS,** GERMAR

yamianus, KANO スヂカタザウ
Kontyû, Tokyo, III., p. 237, f. 2, (1929).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa.

tobafolius, KANO コウトウカタザウ
Kontyû, Tokyo, III., p. 237, f. 1, (1929).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa.

insularis, KANO モンシロカタザウ
Kontyû, Tokyo, III., p. 238, f. 3, (1929).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa.

sonani, KONO ソナンカタザウ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. Japan, XXIV., p. 194, (1930).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa.

sarcitis kotoensis, KONO マルモンカタザウ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. Japan, XXIV., p. 193, (1930).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa.

orbifer, WATERHOUSE ムツメカタザウ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 20, (1841).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Tribe: **EPISOMINI**

Genus **EPISOMUS,** SCHÖNHERR

takahashii, KONO タカハシコブザウ
Ins. Mats. II., p. 166, (1928).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

albiguttatus, MATSUMURA シラホシマルザウ
Schädl. u. Nützl. Ins. v. Zuckerrohr Formosas, p. 34, t. XXVII, f. 9; t. XXIV, f. 9, (1910).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

lentus, ERICHSON シロスヂマルザウ
Nov. Acta. Acad. Leop., p. 263, (1834).
Loc. Distr.—Kôshun, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Tribe: **PHYLLOBIINI**

Genus **PHYTOSCAPHUS,** Schönherr

formosanus, Matsumura アラゲザウ
Schädl. u. Nützl. Ins. v. Zuckerrohr Formosas, p. 34, XXVII., f. 9; t. XXIV, f. 9, (1910).
Loc. Distr.—Horisha, Rinkiho, Tansui, Shinsha.
Gen Distr.—Formosa.

Genus **CORIGETUS,** Desbrochers

brunneus, Matsumura トビイロアヲザウ
Schädl. u. Nützl. Ins. v. Zuckerrohr Formosas, p. 32, t. XXVII, f. 7, (*Myllocerus*) (1910).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MYLLOCERUS,** Schönherr

canoixoides, Kono オビクチブトザウ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIV., p. 213, t. 2, f. 11, (1930).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Formosa.

rostralis, Kono コオビクチブトザウ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XX., p. 214, t. 2, f. 12, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

setosus, Kono クロクチブトザウ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIV., p. 214, t. 2, f. 3, (1930).
Loc. Distr.—Ibaho.
Gen. Distr.—Formosa.

guttulus, Matsumura ウスアヲクチブトザウ
Schädl. u. Nützl. Ins. v. Zuckerrohr Formosas, p. 33, XXVII, f. 10; t. XXIV, f. 7, (1910).
Loc. Distr.—Shinsha, Hoppo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EPISOMOIDES,** Kono

albinus, Matsumura シロコナザウ
Schädl. u. Nützl. Ins. v. Zuckerrohr Formosas, p. 33, t. XXVII, f. 8, (1910).
Loc. Distr.—Shôkwa, Shiushiu, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **OTIORRHYNCHINI**

Genus **CALOMYCTERUS,** Roelofs

variabilis, Kono ウスイロメナガザウ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIV., p. 224, t. 2. f. 5, (1930).
Loc. Distr.—Kôshun, Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

(*Curculiones Phanerognathi*)

Tribe: **CLEONINI**

Genus **XANTHOCHELUS,** Chevrolat

perlatus, Fabricius オオホハスヂゾウ
Syst. El. II., p. 516, (*Curculio*) (1801).
Loc. Distr.—Taichiu, Horisha.
Gen. Distr.—Java, Burma, China, Formosa.

Tribe: **LIXINI**

Genus **TENGUZO,** Kono

bipustulatus, Kono テングカヲヲゾウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 53, (1929).
Loc. Distr.—Tappan, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LIXUS,** Fabricius

auriculatus, Sahlberg カムチヤホソゾウ
Spec. Ins. I., p. 40, (1823).
Loc. Distr.—Horisha, Taihoku.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

aethiops, Herbst チビカヲヲゾウ
in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) VI., p. 48, t. 62, f. 7, (*Curculio*) (1795).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—India, Formosa.

rufitibialis, Kono アカアシカヲヲゾウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 55, (1929).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

akonis, Kono アカウカヲヲゾウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 56, (1929).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

madaranus, Kono マダラカヲヲゾウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 57, (1929).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LARINUS,** Germar

variegatus, Kono マダラゴボウゾウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 61, (1929).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

ovalis katoi, Kono ヒメゴボウザウ
Ins. Mats. IV., Nos. 1 & 2, p. 61, (1929).
Loc. Distr.—Taihoku, Taichiu.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **MENEMACHINI**

Genus **ACICNEMIS,** Lacordaire

bickhardti, Hubenthal ビツクハルドトゲアシザウ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 8, p. 126, (1919).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

postica, Hubenthal アトモントゲアシゲウ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 8, p. 73, (1919).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

nobilis, Hubenthal トゲアシザウ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 8, p. 94, (1919).
Loc. Distr.—Kankau, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

biarcuata, Hubenthal ユミガタトゲアシザウ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 8, p. 95, (1919).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Hubenthal ザウタトゲアシザウ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 8, p. 106, (1919).
Loc. Distr.—Alikang, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

laeta, Hubenthal ヒメトゲアシザウ
Arch. Naturg. LXXXIII., A. 8, p. 133, (1919).
Loc. Distr.—Sokutsu, Pilam, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CEUTHORRHYNCHINI**

Genus **MECYSMODERUS,** Schönherr

consularis, Schönherr モンスヂサルザウ
Journ. Linn. Soc. Lond. Zool. X., p. 482, (1870).
Loc. Distr.—Tansui.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **BARIINI**

Genus **BARIS,** Germar

saccharivora, Matsumura カムチヤヒメザウ
Schädl. u. Nützl. Ins. v. Zuckerrohr Formosas, p. 35, pl. XXVII, f. 14, ♀, (1910).
Loc. Distr.—Taihoku, Shôkwa, Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LYSTRUS,** Pascoe

tibialis, Kono カタビロザウ
Ins. Mats. II., No. 4, p. 175, t. IV, f. 13, (1928).
Loc. Distr.—Shôkwa.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **ZYGOPINI**

Genus **MECOPUS,** Schönherr

bispinosus, Weber アシナガクモザウ
Obsc. Ent., p. 94, (*Rynchaenus*) (1801).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Java, Sumatra, Borneo, Indo-China, Formosa.

Tribe: **BALANINI**

Subtribe: **PSEUDOBALANININA**

Genus **CAPRONINUS,** Heller

plicatulus, Heller シギザウモドキ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVI., 2, p. 128, (1925).
Loc. Distr.—Takao, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

plicatulus var. **definitus,** Heller
Stett. Ent. Zeit. LXXXVI., 2, p. 129, (1925).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **BALANININA**

Genus **BALANINUS,** Germar

alboscutellatus, Roelofs ナツグミギシザウ
Ann. Soc. Ent. Belg. L., p. 159, (1874).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

breviscapus, Heller モトフトヒゲシギザウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVIII., 2, p. 193, (1927).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

capillatus, Heller ヅクゲシギザウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVIII., 2, p. 194, (1927).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

geniculatus, Heller サメハダシギザウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVIII., 2, p. 195, (1927).
Loc. Distr.—Taihôrinshô.
Gen. Distr.—Formosa.

meleagris, HELLER マダラシギゾウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVIII., 2, p. 195, (1927).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

reitteri, HELLER ライタシギゾウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVIII., 2, p. 196, (1927).
Loc. Distr.—Taiharoku.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, HELLER ザウタシギゾウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVIII., 2, p. 196, (1927).
Loc. Distr. Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

simius spretus, HELLER マダラシギゾウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVII[illegible] 2, p. 197, (1927).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—Formosa, China.

nigromaculatus, KONO クロモンシギゾウ
Ins. Mats. V., Nos. 1 & 2, p. 19, (1930).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

confucius, HELLER エヴクスシギゾウ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVIII., 2, p. 190, (1927).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, China.

Tribe: **ERIRHINI**

Genus **ECHINOCNEMUS,** SCHÖNHERR

squameus, BILLBERG タイワンイネゾウ
Enum. Ins., p. 42, (1820).
Loc. Distr.—Takao, Tainan, Kôshun, Shôkwa, Kuraru.
Gen. Distr.—China, Formosa, Japan proper.

bipunctatus, ROELOFS イネゾウ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. 123, (1874).
Loc. Distr.—Baibara, Horisha, Shôkwa, Tappan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **TACHYGONINI**

Genus **IXALMA,** PASCOE

guttulum, KONO シミノコギリゾウ
Ins. Mats. II., No. 4, p. 169, pt. VI, f. 15, (1923).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: CALANDRINI

Genus CALANDRA, Clairville

oryzae, Linné コクゾウ
Amoen. Ac. VI., p. 395, (*Curculio*) (1763).
Loc. Distr.—Taihoku, Takao, Heitô, Taichû.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

granaria, Linné グラナリヤコクゾウ
Syst. Nat. Ed. X., p. 378, (*Curculio*) (1768).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

Genus LAOGENIA, Pascoe

formosana, Heller タテスヂゾウ
Ent. Blätt. XXIII., p. 9, (1927).
Loc. Distr.—Kôsempo, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus AUTONOPIS, Pascoe

tenuicornis, Heller タイワンネブトゾウ
Ent. Blätt. XXIII., p. 12, (1927).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus RHYNCHOPHORUS, Herbst

ferrugineus, Olivier ヤシオホゾウ
Encycl. Meth. V., p. 473, (*Curculio*) (1790).
Loc. Distr.—Tainan, Kôshun.
Gen. Distr.—India, Sunda Islands, Formosa.

longimanus, Fabricius タイワンオホゾウ
Syst. Ent., p. 147, (*Curculio*) (1775).
Loc. Distr.—Horisha, Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus COSMOPOLITES, Chevrolat

sordidus, Germar ハセウゾウ
Ins. Spec. Nov., p. 293, (1824).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Reunion, Brasil, Java, Ceylon, Malacca, Saigon, China, Formosa, Philippines.

Genus SPHENOCORYNUS, Schönherr

perelegans, Fairmaire ヨツメヒラゾウ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 15, (1893).

Loc. Distr.—Ranrun, Kuraru.
Gen. Distr.—Loo-Choo (Ishigaki), Formosa.

cinereus, Illiger シロヨツメザウ
Wiedem. Arch. I., 2, p. 115, t. 1, f. 2, (1800).
Loc. Distr.—Tainan, Kôshun.
Gen. Distr.—Sumatra, Java, Formosa.

Genus **OMMATOLAMPUS,** Schönherr

paratarioides, Heller ビロドオホザウ
Not. Leyd. Mus. XVIII., p. 246, (1896).
Loc. Distr.—Baibara.
Gen. Distr.—Formosa, Luzon.

Tribe: **CRYPTODERMINI**

Genus **CRYPTODERMA,** Ritsema

fortunei, Waterhouse シロオビザウ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 172, (1853).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, China, Japan proper.

Tribe: **ALCIDINI**

Genus **ALCIDES,** Schönherr

trifidus taiwanus, Kono オジロアシナガザウ
Ins. Mats. IV., No. 3, p. 139, (1930)
Loc. Distr.—Ranrun, Honrisha.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Heller オホオジロアシナガザウ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 19, (1922).
Loc. Distr.—Ibaho, Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa, Cambodja, Tonkin.

erro, Pascoe ホホジロアシナガザウ
Journ. Linn. Soc. Lond., p. 182, (1883).
Loc. Distr.—Riyohen.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

takahashii, Kono タカハシアシナガザウ
Ins. Mats. IV., No. 3, p. 140, (1930).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

albomaculatus, Hono シラホシアシナガザウ
Ins. Mats. IV., No. 3, p. 140, (1930).
Loc. Distr.—Shinkwa.
Gen. Distr.—Formosa.

scenicus, Faust シロスヂアシナガザウ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, p. 256, (1894).
Loc. Distr.—Taipin, Horisha, Shirin.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

ashinagazo, Kono シロオビアシナガザウ
Ins. Mats. IV., No. 3, p. 142, (1930),
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

roelofsi, Lewis ムラスヂアシナガザウ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. 152, (1875).
Loc. Distr.—Horisha, Shōkwa.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **ORCHESTINI**

Genus **ORCHESTES,** Illiger

matsumuranus, Kono マツムラノミザウ
Ins. Mats. V., No. 1, p. 26, (1930).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **NANOPHYINI**

Genus **NANOPHYES,** Schönherr

chibizo, Kono コチビザウ
Ins. Mats. IV., No. 4, p. 152, (1930).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosensis, Kono オホチビザウ
Ins. Mats. IV., No. 4, p. 153, (1930).
Loc. Distr.—Akau, Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa.

miwai, Kono ミワチビザウ
Ins. Mats. IV., No. 4, p. 154, (1930).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—Formosa.

plumbeus, Motschulsky オホクロチビザウ
Bull. Soc. Nat. Mosc. II., p. 444, (1866).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Tribe: **EURHYNCHINI**

Genus **CYLAS,** Latreille

formicarius, Fabricius アリモドキザウ
Ent. Syst. Suppl., p. 174, (*Brentus*) (1793).

Loc. Distr.—Anping, Fuhôshô, Hoozan, Kankau, Kôsempo, Suisharyô, Taihôrin. Taihôrinshô.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Tribe: **APIONINI**

Genus **APION,** Herbst

Subgenus **PIEZOTRACHELUS,** Schönherr

sauteri, Wagner ザウタホソクチザウ
Soc. Ent. XXIV., p. 27, (1909).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **CONAPION,** Motschulsky

araneiforme, Wagner ワゲナホソクチザウ
Soc. Ent. XXIV., p. 27, (1909).
Loc. Distr.—Kankau, Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

schenklingi, Wagner シェンクリングホソクチザウ
Suppl. Ent. III., p. 23, (1914).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanum, Wagner タイワンホソクチザウ
Suppl. Ent. III., p. 25, 2a, f. ♂, (1914).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formsa.

pallidirostre formosicola, Wagner クチアカホソクチザウ
Suppl. Ent. III., p. 29, (1914).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

morosum pictum, Wagner ナガホソクチザウ
Soc. Ent. XXIV., p. 26, (1909).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **ATTELABINI**

Genus **ISOLABUS,** Voss

elongaticeps, Voss ヒメアヲアシナガオトシブミ
Stett. Ent. Zeit. LXXXV., p. 279, (1924).
Loc. Distr.—Taihôrin, Musha, Shinchiku.
Gen. Distr.—Formosa, China.

Genus **PARAMECOLABUS,** JEKEL

Subgenus **CATALABUS,** VOSS

pallidipennis, VOSS ウスイロアシナガオトシブミ

Stett. Ent. Zeit., LXXXVI., p. 220, (1925).

Loc. Distr.—Baibara.

Gen. Distr.—Formosa, India.

Genus **HENICOLABUS,** VOSS

Subgenus **ALLOLABUS,** VOSS

hypomelas, FAIRMAIRE アカアシナガオトシブミ

Ann. Soc. Ent. Fr. VIII (5)., p. 130, (*Attelabus*) (1878).

Loc. Distr.—Horisha, Ibaho, Hoozan.

Gen. Distr.—Formosa.

octospilotus, JEKEL ヤホシアシナガオトシブミ

Ins. Saunders. II., p. 201, ♂, ♀, (1860).

Loc. Distr.—Horisha.

Gen. Distr.—Formosa, Ceylon.

Genus **LAMPROLABUS,** JEKEL

bispinosus, GYLLENHAL トゲオトシブミ

in Schönh. Gen. Spec. Curc. I., 1, p. 204, (*Attelabus*) (1833).

Loc. Distr.—Kōtōsho.

Gen. Distr.—Formosa, India.

Tribe: **EUOPINI**

Genus **EUOPS,** SCHÖNHERR

Subgenus **SYNAPTOPS,** JEKEL

striata, VOSS スヂルリオトシブミ

Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 279, (1924).

Loc. Distr.—Tainan.

Gen. Distr.—Formosa.

chinensis, VOSS オホルリオトシブミ

Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 166, (1922).

Loc. Distr.—Taitō, Kōshun, Rikiriki, Horisha, Taihōrin, Kankau, Kōsempo, Hokuto, Chōsokei.

Gen. Distr.—Formosa, China.

chinensis f. **murpurea,** KONO

Ins. Mats. II., No. 1, p. 42, (1927).

Loc. Distr.—Horisha.

Gen. Distr.—Formosa.

matsumurana, Kono マツムラルリオトシブミ
Ins. Mats. II., No. 1, p. 42, (1927).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

indigena, Voss ケシルリオトシブミ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 278, (1924).
Loc. Distr.—Kankau, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **HOPLAPODERINI**

Genus **HOPLAPODERUS,** Jekel

gemmatus, Thunberg カバイロマダラオトシブミ
Diss. Ent. Nov. Ins. spec. III., 68, tab. f. 80, (*Attelabus*) (1784).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—India, Java, Siam, Laos, South China, Formosa.

hystrix f. **orientalis,** Voss トゲマダラオトシブミ
Stett. Ent. Zeit. LXXXVII., p. 36, 40, (1926).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, Burma.

Genus **PAROPLAPODERUS,** Voss

Subgenus **PAROPLAPODERUS,** s. str.

shirakii, Kono トゲゴマダラオトシブミ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX., p. 44, t. V, f. 13, 13a, (1930).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa.

pardaloides, Voss オホゴマダラオトシブミ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 284, ♂, ♀, (*Hoplapoderus*) (1924).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **GOMADARANUS,** Kono

vitticeps, Jekel エノキゴマダラオトシブミ
Ins. Saunders. II., p. 184, (*Apoderus* subg. *Hoplapoderus*) (1860).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, China.

vitticeps f. **tristoides,** Voss
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 284, (1924).
Loc. Distr.—Kankau, Kosempo, Taihôrin, Sokutsu, Hoozan, Paroe.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Subgenus **ERYCAPODERUS,** Voss

validus nigroguttatus, Kono オホカタビロオトシブミ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX., p. 51, (1930).
Loc. Distr.—Kusukusu.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHYMATAPODERUS,** Voss

monticola, Voss キバラコブオトシブミ
Stett. Ent. Zeit. LXXX., p. 72, 75, ♂, ♀, (1926).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **TOMAPODERUS,** Voss

coeruleipennis, Schilsky ガマヅミセアヲオトシブミ
in Kuster, Käfer Eur. XL., p. DD, Nr. 75, (*Apoderus* subg. *Hoplapoderus*) (1903).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

flaviceps, Desbrochers ムナグロセアヲオトシブミ
Journ. Asist. Soc. Bengal, LIX., 2, p. 218, (*Apoderus*) (1890).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa, India.

Tribe: **APODERINI**

Genus **APODERUS,** Olivier

Subgenus **APODERUS,** s. str.

mushanus, Kono ムシヤオトシブミ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX., p. 59, (1930).
Loc. Distr.—Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **HETERAPODERUS,** Voss

brachialis, Voss アカオトシブミ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 282, (1924).
Loc. Distr.—Sokutsu, Hoozan, Taihōrin, Kōsempo, Kankau, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **LEPTAPODERUS,** Jekel

nigroapicatus, Jekel アトグロアカオトシブミ
Ins. Saunders. II., p. 175, (Subg. *Leptapoderus*) (1860).
Loc. Distr.—Kankau, Taihōrin, Kōsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—China, Formosa.

sejugatus, Voss ヒメアカオトシブミ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 283, (1924).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihōrin, Sokutsu, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **TRACHELOPHORINI,** Voss
Genus **CENTROCORYNUS,** Jekel

scutellaris, Gyllenhal ホソクビナガオトシブミ
in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1, p. 191, (1833).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—India, Burma, Formosa.

Genus **CYCNOTRACHELUS,** Jekel

formosanus, Voss アヲツルクビオトシブミ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 281, ♂, ♀, (*Apoderus* subg. *Cycnotrachelus*) (1924).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

flavotuberosus, Jekel キボシツルクビオトシブミ
Ins. Saunders. II., p. 163, t. 3, f. 3, ♂, ♀, (*Apoderus* subg. *Cycnotrachelus*) (1860).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Darjeeling, Tenasserim, Formosa.

Genus **PARACYCNOTRACHELUS,** Voss

longiceps, Motschulsky オホツルクビオトシブミ
in Schrenk's Reisen Amurland, II., p. 173, t. 10, f. 20, (*Apoderus*) (1860).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Siberia, Amur, Kamtschatka, Japan proper, Korea, China, Formosa.

Genus **PARATRACHELOPHORUS,** Voss

nodicornis, Voss アカヒゲナガオトシブミ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 280, ♂, f. (1924).
Loc. Distr.—Taihōrin, Kōsempo, Hoozan, Fuhōshō.
Gen. Distr.—Formosa.

katoi, Kono カトウヒゲナガオトシブミ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX., p. 75, (1930).
Loc. Distr.—Sōzan.
Gen. Distr.—Formosa.

vossi, Kono クロヒゲナガオトシブミ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX, p. 75, (1930).
Loc. Distr.—Kwankō, Hori, Kwarenkō, Hinokiyama.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: AULETINI

Genus AULETOBIUS, DESBROCHERS

nitens, KONO ヒゲアカサメハダチョウキリ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX., p. 32, (1930).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Formosa.

tuberculatus, VOSS タイワンサメハダチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 278, (1921).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

subtuberculatus, VOSS コサメハダチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 278, (1921).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

uniformis formosanus, VOSS スグリサメハダチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 277, (1921).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: RHYNCHITINI

Genus ADERORRHINUS, SHARP

venustus, KONO キバラヒゲチョウキリ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX., p. 29, (1930).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus EUGNAMPTUS, SCHÖNHERR

sauteri, VOSS ザウタホソチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 230, (1921).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

taihorinensis, VOSS タイワンアラホソチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 279, (1921).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

distinctus, KONO チビホソチョウキリ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XXIX., p. 30, (1930).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DEPORAUS,** Samouelle

rufiventris, Voss シリアカイクビチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 280, (1921).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NEODEPORAUS,** Kono

femoralis, Kono モモブトイクビチョウキリ
Ins. Mats. II., No. 4, p. 176, f, (1928).
Loc. Distr.—Nôkô.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **RHYNCHITES,** Herbst

pilositessellatus, Voss ケナガチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 281, (1921).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

schenklingi, Voss シェンクリングチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 282, (1921).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

erythropterus, Voss ベニチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 282, (1921).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

bisulcatus, Voss フタスヂチョウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 283, (1921).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **BYCTISCINI**

Genus **TAIWANOBYCTISCUS,** Kono

separandus, Voss アヲハマキチョウキリ
Koleopt. Rundsch. XVI., p. 191 (*Bycticus*) (1930-31).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

separandus f. mariana, Voss
Arch. Naturg. LXXXVII., p. 7, (1921).
Loc. Distr.—Taihanroku, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Voss スヂハマキチヨウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., A. 11, p. 295, (*Bycticus*) (1921).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LISTROBYCTISCUS,** Voss

patruelis, Voss チビチヨウキリ
Arch. Naturg. LXXXVII., p. 6, (*Bycticus*) (1921).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ASPIDOBYCTISCUS,**

lacunipennis coelaris, Voss ヒナチヨウキリ
Koleopt. Rundsch. XVI., p. 224, (19[illegible].
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

PLATYPODIDAE 長小蠹科

Genus **CROSSOTARSUS,** Chapuis

piceus, Chapuis トゲジリオホナガコシンクヒ
Monogr. des Platyp., p. 56, f. 3, (1865).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

wallacei, Thomson ヒゲバオホナガコシンクヒ
Archiv. Ent. I., p. 343, (*Platypus*) (1857).
Loc. Distr.—Kôtôsho, Kôshun.
Gen. Distr.—Malay (Penang), Borneo, Sumatra, Formosa.

externe-dentatus, Fairmaire ツマグロナガコシンクヒ
Rev. Mag. Zool., p. 51, (*Platypus*) (1850).
Loc. Distr.—Kôshun (Kusukusu, Kankau, Kuraru).
Gen. Distr.—Fiji, Tahiti, Hawaii, Japan proper, Formosa.

flavomaculatus, Strohmeyer モンキナガコシンクヒ
Ent. Mitteil. I., p. 40, f. 1, (1912).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, Strohmeyer ツヤトゲバナガコシンクヒ
Ent. Mitteil. I., p. 41, f. 1, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

niponicus, Blandford ヤマトナガコシンクヒ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 130, (1894).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, STROHMEYER ザウタナガコシンクヒ
Ent. Bältt. IX., p. 164, (1913).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

rengetensis, NIIJIMA et MURAYAMA レンゲチナガコシンクヒ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XV., p. 208, (1925).
Loc. Distr.—Rengechi.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PLATYPUS,** HERBST

lewisii, BLANDFORD ヨツバナガコシンクヒ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 134, (1894).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

serverini, BLANDFORD ツマボソナガコシンクヒ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 135, (1894).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

solidus, WALKER セイロンナガシコンクヒ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 286, (1859).
Loc. Distr.—Fuhōshō.
Gen. Distr.—Ceylon, India, Sunda Islands, Formosa.

lepidus, CHAPUIS エグリナガコシンクヒ
Monogr. d. Platyp., p. 282, (1865).
Loc. Distr.—Kusukusu.
Gen. Distr.—Celebes, Philippines, Sunda Islands, Malacca, Java, Formosa.

lepidus formosanus, NIIJIMA et MURAYAMA
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XV., p. 214, pl. 12, f. 3-4; pl. XIV, f. 21-28, (1925).
Loc. Distr.—Rengechi.
Gen. Distr.—Formosa.

formosanus, NIIJIMA et MURAYAMA シリブトナガコシンクヒ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XV, p. 215, pl. 12, f. 5-6; pl. XIV, f. 29-34, (1925).
Loc. Distr.—Rengechi.
Gen. Distr.—Formosa.

horishensis, MURAYAMA ホリシヤナガコシンクヒ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XIX., p. 284, (1928).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **DIAPUS,** CHAPUIS

quinquespinatus, CHAPUIS イヲバナガコシンクヒ
Monogr. d. Platyp., p. 334, f. 201, (1865).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Java, New Guinea, Borneo, Celebes, Morty.

formosanus, NIIJIMA et MURAYAMA メスモンナガコシンクヒ
Journ. Fac. Agr., Hokkaido, Imp. Univ. XV, p. 217, pl. 12, f. 7-8; pl. 15, f. 35-47, (1925).
Loc. Distr.—Rengechi.
Gen. Distr.—Formosa.

IPIDAE 小蠹科

(*Scolytidae*)

(I. PILIDENTATAE)

Genus **DACTYLIPALPUS,** CHAPUIS

transversus, CHAPUIS コウトウコシンクヒ
Synops. Scol., p. 220, (1873).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Andaman, Java, Philippines, Malacca, Formosa.

(II. SPINIDENTATAE)

Genus **CRANIODICTICUS,** BLANDFORD

macdonatus, BLANDFORD モンコシンクヒ
Ann. Mag. Nat. Hist. XV., p. 317, (1895).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **HYORRHYNCHUS,** BLANDFORD

lewisi, BLANDFORD レビスコシンクヒ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 60, (1894).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Genus **HYLESINUS,** FABRICIUS

despectus, WALKER シヴノコシンクヒ
Ann. Mag. Nat. Hist. III., p. 251, (1859).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **IPS**, De Geer

scitus, Blandford ツツコシンクヒ
Ind. Mus. Not. III., p. 63, (*Pityogenes*) (1893).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Ceylon, East-India, Formosa.

Genus **OZOPEMON**, Hagedorn

tuberculatus, Strohmeyer トゲコシンクヒ
Ent. Mitteil. I., Nr. 1, p. 38, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

(**III. AETIDENTATAE**)

Genus **XYLEBORUS**, Eichhoff

validus, Eichhoff クロツヤムネマルコシンクヒ
Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII., p. 202, (1875).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Taihôrin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

semiopacus, Eichhoff アカツヤムネマルコシンクヒ
Rat. Tom., p. 334, (1879).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Hongkong, India, Formosa.

obliquecauda, Motschulsky ナガムネマルコシンクヒ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI., II, p. 315, (*Phlocotrogus*) (1963).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Penang, Ceylon.

formicatus, Eichhoff チビムネマルコシンクヒ
Berl. Ent. Zeitschr. XII., p. 151, (1868).
Loc. Distr.—Arisan, Kappanzan.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

amorphus, Eggers ニイジマコシンクヒ
Ent. Blätt. XXII., p. 147, (1926).
Loc. Distr.—Found in *Acacie*.
Gen. Distr.—Formosa.

sexspinosus, Motschulsky ムツトゲムネマルコシンクヒ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI. I., p. 515, (*Eurylactylus*) (1863).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Philippines, Borneo, New Guinea, Ceylon, Sumatra, Burma, Camerun, East Africa, Formosa.

Suborder III. LAMELLICORNIA 腮角亞目

PASSALIDAE 長鍬形科

Genus CERACUPES, SHARP

arrowi, HELLER ミツノナガクハガタ
Ann. Soc. Ent. Belg. LV., p. 256-7, f. (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus ACERAIUS, KAUP

grandis hirsutus, KUWERT オホナガクハガタ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 163, (1891).
Loc. Distr.—Kôsempo, Polisha, [illegible]-Hi-Ku, Chip-Chip, Lake Candidius, Fuhôshô, Hoozan, Sokutsu, Taihôrin, Taihôrinshô, Suisharyô, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, India, Ceylon, Malay, Indo-China, Java, Borneo, Sumatra.

Genus LEPTAULAX, KAUP

dentatus, WEBER コガタノナガクハガタ
Obse. Ent. I., p. 82, (1801).
Loc. Distr.—Kôsempo, Chikutôki, Taihôrinshô, Hoozan, Fuhôshô, Polisha, Chip-Chip, Sokutsu, Suisharyô.
Gen. Distr.—Through-out the oriental region and eastwards to Australia.

bicolor, FABRICIUS ヒメナガクハガタ
Syst. El. II., p. 256, (1801).
Loc. Distr.—Kôsempo, Polisha.
Gen. Distr.—India, Sunda Islands, Siam, Formosa.

LUCANIDAE 鍬形蟲科

Subfamily LUCANINAE

Genus LUCANUS, SCOPOLI

ferriei, PLANET オキナワミヤマクハガタ
Naturaliste, p. 251, f. 15, (1898).
Loc. Distr.—Kyûhabon.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

formosanus, PLANET タイワンミヤマクハガタ
Naturaliste, p. 36 und 47, (1899).
Loc. Distr.—Baibara, Kyûhabon, Suisha, Arisan, Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

swinhoei, PARRY ヒメミヤマクハガタ（ツノボソミヤマクハガタ）
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 370, t. 4, f. 4, (1874).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **RHAETULUS,** WESTWOOD

crenatus, WESTWOOD トゲシカクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 353, t. 8, f. 4, ♂, (1871).
=*minor,* KRIESCHE, Arch. Naturg. LXXXVI., A. 8, p. 96, 1920, (1921).
Loc. Distr.—Baibara, Niitaka, Arisan, Urai.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, MÖLLENKAMP ザウタシカクハガタ
Ent. Mitteil. 1., No. 1, p. 6, (1912).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **ODONTOLABINAE**

Genus **NEOLUCANUS,** THOMSON

championi, PARRY マルバネクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 20, (1864).
Loc. Distr.—Hassenzan, Taiheizan
Gen. Distr.—China, Formosa.

lama var. **angulatus,** HOPE ドロマルバネクハガタ
Cat. Luc., p. 17, (1845).
Loc. Distr.—Kôsempo, Chip-Chip, Musha, Baibara, Arisan, Baron.
Gen. Distr.—Formosa, Sylhet.

swinhoei, BATES アカマルバネクハガタ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 346, f. 2♂, (1866).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Ryohen, Taiheizan, Arisan, Suisharyô, Kôsempo, Hokuto, Chip-Chip. Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

saundersi, PARRY タテヅノマルバネクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 20, t. 9, f. 3, (1864).
Loc. Distr.—Taiheizan.
Gen. Distr.—Formosa, North India.

vendri, DUDICH オホマルバネクハガタ
Ent. Blätt. XIX., p. 17-18, (1923).
Loc. Distr.—Lake Candidius (Nichigetsutan).
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **ODONTOLABIS,** HOPE

siva, HOPE オニクヤクハガタ
Cat. Luc., p. 5, 16, (1845).

=*carinatus*, Bates, Proc. Zool. Soc. Lond., p. 346, (1866).
=*parryi*, Boileau, Naturaliste, XXVII., p. 47, f. ♂, (1905).
Loc. Distr.—Nôkô, Musha, Baibara, Kyûhabon, Arisan, Shuisha, Hassenzan, Kôsempo, Kankau, Suisharyô, Sokutsu, Urai.
Gen. Distr.—Formosa, Sylhet.

Subfamily **CLADOGNATHINAE**

Genus **PSALIDCREMUS**, Motschulsky

inclinatus, Motschulsky ノコギリクハガタ
Etud. Ent. VI., p. 29, f. 11, (1857).
Loc. Distr.—Niitaka.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

Genus **METOPODONTUS**, Hope

blanchardi, Parry フタテンアカクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 337, t. 5, f. 2, ♂, (1873).
Loc. Distr.—Baibara, Kyûhabon, Tompo, Ranrun, Arisan.
Gen. Distr.—Mongoria, Formosa.

?biplagiatus, Westwood モンアカクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 200, t. 10, f. 4, (1885).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—Nepal, Tonkin, Siam, Cochin-China, Formosa.

?foveatus, Hope タイワンアカクハガタ
Trans. Linn. Soc. XVIII., p. 530, (1842).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

Genus **CYCLOMMATUS**, Parry

tarandus, Thunberg ツノブトホソアカクハガタ
Mem. Mosc. I., p. 190, t. 12, f. 1, (1806).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

scutellaris, Möllenkamp ホソアカクハガタ
Ent. Mitteil. I., Nr. I, p. 7, (1912).
=*Metopodontus occipitalis*, Miwa, Ins. Mats. II., No. 1, p. 26, ♀, (1927).
Loc. Distr.—Baibara, Hoozan, Karapin.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

Genus **PRISMOGNATHUS**, Motschulsky

formosanus, Nagel タイワンオニクハガタ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 214-215, f. 2, (1928).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **DORCINAE**

Genus **HEMISODORCUS**, Thomson

formosanus, Miwa ウスバクハガタ
Ins. Mats. III., Nos. 2 & 3, p. 75, f. 2 ♂, ♀, (*Leptinopterus*) (1929).
Loc. Distr.—Taiheizan, Kwarenkô, Kayahara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EURYTRACHELUS**, Thomson

platymelus, Saunders ヒラタクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 50, t. 3, f. 7, (1854).
=*titanus sika*, Kriesche, Arch. Naturg. LXXXVI., A. 8, p. 118, 1920, (1921).
=*titanus*, Miwa, Ins. Mats. II., No. 1, p. 27 & 29, (1927).
Loc. Distr.—Kankau, Teraso, Taihôrinshô, Chip.-Chip, Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa, Korea, Japan proper, Loo-Choo.

reichei, Hope セスヂツヤクハガタ
Proc. Ent. Soc. Lond., p. 83, (1842).
Loc. Distr.—Baibara, Niitaka, Arisan.
Gen. Distr.—Formosa, Sylhet.

?rectus, Motschulsky コクハガタ
Etud. Ent., VI., p. 29, ♂, (*Psalidostomus?*) (1857).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

rubrofemoratus, Vollenhoven アカアシクハガタ
Tijdschr. v. Ent. VIII., p. 152, t. 2, f. 1, 2, (1845).
Loc. Distr.—Hoozan, Kayahara, Kyûhabon.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

striatipennis, Motschulsky スヂクハガタ
Etud. Ent. X., p. 17, (*Macrodoreas*) (1861).
Loc. Distr.—Arisan, Urai.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, China, Formosa.

Genus **DORCUS**, Mac Leay

schenklingi, Möllenkamp ツノナガヒラタクハガタ
Suppl. Ent., No. 2, p. 20, t. 2, (*Eurytrachelus*) (1913).
Loc. Distr.—Baibara, Kôsempo, Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

hopei var. **formosanus**, Miwa ヒラタクハガタ
Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XIX., No. 103, p. 351, f. 1, 2, (1929).
Loc. Distr.—Hoppo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **GNAPHALORYX**, Burmeister

velutinus, Thomson サビクハガタ
Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II., p. 426, (1862).
Loc. Distr.—Baibara, Shinchiku, Baron, Musha.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

taurus, Fabricius クロサビクハガタ
Syst. Ent. II., p. 250, (1793).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Formosa.

Genus **METALLACTULUS**, Ritsema

parvulus, Hope ヒメヒラタクハガタ
Cat. Luc., p. 25, (*Doreus*) (1845).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

Genus **AEGUS**, Mac Leay

formosae, Bates タイワンネブトクハガタ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 347, (1866).
Loc. Distr.—Arisan, Baibara, Niitaka.
Gen. Distr.—Formosa.

labilis, Westwood クチブトクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 54, t. 11, f. 5, (1864).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Polisha, Suisharyō.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

laevicollis, Saunders エグリネブトクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 54, t. 4, f. 8, ♂, (1854).
Loc. Distr.—Musha, Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa, China.

Subfamily **FIGULINAE**

Genus **NIGIDIUS**, Mac Leay

formosanus, Bates タイワンヘウタンクハガタ
Proc. Zool. Soc. Lond. II., p. 347, (1866).
Loc. Distr.—Tansui.
Gen. Distr.—Formosa.

acutangulus, Heller ヒメヘウタンクハガタ
Ent. Mitteil. VI., p. 173, (1917).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NIGIDIONUS**, KRIESCHE

parryi, BATES オニヘウタンクハガタ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 347, (1866).
Loc. Distr.—Hoozan, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **FIGULUS**, MAC LEAY

binodulus, WATERHOUSE チビクハガタ
Ent. Monthl. Mag. IX., p. 277, (1973).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

punctatus, WATERHOUSE マメクハガタ
Ent. Monthl. Mag. IX., p. 278, (1873).
Loc. Distr.—Musha, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subfamily **AESALINAE**

Genus **AESALUS**, FABRICIUS

? asiaticus, LEWIS マダラクハガタ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 340, t. 14, f. 5, (1883).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

SCARABAEIDAE 金龜蟲科

Subfamily **OCHODAEINAE**

Genus **OCHODAEUS**, SERVILLE

maculatus, WATERHOUSE アカマダラセンチコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 95, (1875).
Loc. Distr.—Suisharyô, Kôsempo, Arisan, Kôshun, Taitô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Subfamily **GEOTRUPINAE**

Tribe: **BOLBOCERINI**

Genus **BOLBOCERAS**, KIRBY

quadridens, KOLBE トゲムネセンチコガネ
Stett. Ent. Zeit. LV., p. 171, (1894).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—Burma, India, Formosa.

calanus, Westwood オホクリイロセンチコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist., p. 354, (1848).
Loc. Distr.—Kiirun.
Gen. Distr.—Formosa, Bombay.

Genus **BOLBOCEROSOMA** Schaeffer

nigroplagiatum, Waterhouse ムネアカセンチコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 96, (1875).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

Genus **KOLBEUS,** Boucomont

coreanus, Kolbe テフセンコルベコガネ
Arch. Naturg. LII., p. 188, t. 11, f. 27, (1886).
Loc. Distr.—Kôsempo, Horisha.
Gen. Distr.—Korea, Loo-Choo, Formosa, Yunnan, Cochin-China, Assam.

Genus **BOLBOTRYPES,** d'Olsoufieff

davidi, Fairmaire エグリセンチコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV., p. 6, (1891).
Loc. Distr.—Nantô. Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa, China, Manchuria, Korea.

Tribe: **GEOTRUPINI**

Genus **GEOTRUPES,** Latreille

Subgenus **PHELOTRUPES**

substriatellus, Fairmaire クロセンチコガネ
Not. Leyd. Mus., p. 242, (1897).
Loc. Distr.—Arisan, Nôkô, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Central China, Formosa.

laevistriatus formosanus, Miwa タイワンセンチコガネ
Ins. Mats. IV., No. 4, p. 164, f. 1, (1930).
Loc. Distr.—Arisan, Horisha, Taiko, Rakuraku.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **COPRINAE**

Tribe: **SCARABAEINI**

Genus **GYMNOPLEURUS,** Illiger

granulatus, Fabricius コブヒラタコガネ (コブタマオシコガネ)
Ent. Syst. I., p. 65, (*Scarabaeus*) (1792).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—India, Formosa.

assamensis, WATERHOUSE アカガネヒラタコガネ（アカガネタマオシコガネ）
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V., p. 411, (1890).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—Assam, Himalaya, Burma, Formosa, Korea.

sinuatus, OLIVIER タイワンクロヒラタコガネ（クロタマオシコガネ）
Ent. I., Scarab. p. 160, pl. 21, f. 19, (*Scarabaeus*) (1789).
Loc. Distr.—Nantô, Horisha, Musha, Kôshun, Kwashôtô, Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Java, Siam, Yunnan, China, Hainan, Formosa.

melanarius, HAROLD ツヤヒラタコガネ（ツヤタマオシコガネ）
Col. Hefte I., p. 76, (1867).
Loc. Distr.—Taitô.
Gen. Distr.—Sumatra, Formosa.

Genus **SISYPHUS,** LATREILLE

indicus, HOPE インドアシナガダイコク（インドアシナガタマオシコガネ）
in Gray's Zool. Misc., p. 22, (1831).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—India, Formosa.

bowringi, WHITE ボウリングアシナガダイコク（ボウリングアシナガタマオシコガネ）
Ann. Mag. Nat. Hist. XIV., p. 423, (1844).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

longipes, OLIVIER アシナガダイコク（アシナガタマオシコガネ）
Ent. I., Scarab., p. 164, p. 19, f. 177, (*Scarabaeus*) (1789).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—India, Formosa.

thoracicus, SHARP コウトウアシナガダイコク（コウトウアシナガタマオシコガネ）
Col. Hefte XIII., p. 39, (1875).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Borneo, Java, Singapore, Formosa.

Genus **PANELUS** LEWIS

parvulus, WATERHOUSE マメガムシガタコガネ
Ent. Monthl. Mag. X., p. 175, (*Temnoplectron*) (1874).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

Tribe: **COPRINI**

Genus **PARAPHYTUS,** HAROLD

dentifrons, LEWIS ツツガタコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI., p. 376, f. 3, 4, (1895).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Loo-Choo (Ôshima), Formosa.

Genus **SYNAPSIS**, Bates

davidi, Fairmaire ダビドダイコク
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII., p. 95, pl. 4, f. 5, (1878).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **HELIOCOPRIS**, Hope

midas, Fabricius ミダスダイコク
Syst. Ent. I., p. 21, (*Scarabaeus*) (1775).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, India, Persia.

Genus **CATHARSIUS**, Hope

molossus, Linné タイワンダイコク
Syst. Nat. X., I, p. 347, (*Scarabaeus*) (1758).
Loc. Distr.—Taihoku, Taihôrin, Horisha, Anping, Kôshun.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Burma, Sumatra, Java, Central-Africa, China, Formosa.

javanus, Lansberg ジャバノダイコク
Tijdschr. v. Ent. XXIX., p. 7, (1886).
Loc. Distr.—Gyochi, Tainan, Anping.
Gen. Distr.—Java, Formosa.

pithecius, Fabricius ピテシウスダイコク
Syst. Ent. I., p. 21, (*Scarabaeus*) (1775).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—India, China, Formosa.

Genus **COPRIS**, Geoffroy

confusius, Harold タイワンコダイコク
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, X., p. 48, (1877).
Loc. Distr.—Baibara, Anping, Koshun.
Gen. Distr.—Hongkong. Formosa.

acutidens, Motschulsky ゴホンダイコク
Etud. Ent. IX., p. 13, (1860).
Loc. Distr.—Taihoku, Shichiseiton, Kôsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

triprartitus, Waterhouse コダイコク
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 74, (1875).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

reflexus, FABRICIUS コウトウマメダイコク
Mant. Ins. I., p. 15, (*Scarabaeus*) (1787).
Loc. Distr.—Kōtōsho.
Gen. Distr.—China, Philippines, Malay, Borneo, Siam, Burma, Java, Formosa.

cariniceps, FELSCHE スヂアシダイコク
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 348, (1910).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

propinquus, FELSCHE マメダイコク
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 347, (1910).
Loc. Distr.—Kōsempo, Sokutsu, Hoozan, Musha, Taiheizan, Kusukusu.
Gen. Distr.—Formosa, China.

Tribe: **ONITINI**

Genus **ONITIS,** FABRICIUS

falcatus, WULFEN ホリシヤヒラタダイコク
Descr. Capens. Ins., p. 14, t. 2, f. 17, (*Scarabaeus*) (1786).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, Assam, Himalaya, Nepal.

philemon, FABRICIUS フイレモンヒラタダイコク
Syst. El. I., p. 30, (1801).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Malay, Siam, Burma, Tenasserim, Silhet, Ceylon, China, Sunda Islands, Formosa.

Tribe: **ONITICELLINI**

Genus **ONITICELLUS,** SERVILLE

pallipes, FABRICIUS ゴマフツノコガネ
Spec. Ins. I., p. 33, (*Scarabaeus*) (1781).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Europe, Asia.

sagittarius, FABRICIUS コウシユンツノコガネ
Syst. Ent., p. 24, (*Scarabaeus*) (1775).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—India, Malay, Java, Indo-China, China, Formosa.

vertagus, FABRICIUS クリイロツノコガネ
Ent. Syst. Suppl., p. 30, (*Scarabaeus*) (1798).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Indio-China, Assam, Manipur, Formosa.

phanaeoides, WESTWOOD ツノコガネ
Roy. Himal. Ent., p. 55, t. 9, f. 3, (1839).

Loc. Distr.—Sokutsu, Kankau, Kôsempo, Shinchiku, Kanshirei, Kobayashi, Rokkiri, Taitô.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Indo-China, India.

Tribe: ONTHOPHAGINI

Genus **CACCOBIUS**, Thomson

gonoderus, Fairmaire キベリコエムマコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXII., p. 17, (1888).
Loc. Distr.—Kankau, Kuraru.
Gen. Distr.—Indo-China, Yunnan, Formosa.

Genus **ONTHOPHAGUS**, Latreille

ater, Waterhouse クロマルエムマコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 76, (1875).
Loc. Distr.—Hoozan, Arisan, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, Celebes.

anguicornis, Boucomont コウセンエムマコガネ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XLVI., p. 211, (1914).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen. Distr.—Indo-China, Formosa.

lenzi, Harold レンツエムマコガネ
Abh. Nat. Ver. Bremen, p. 290, (1874).
Loc. Distr.—Tainan, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, China, Formosa, Malay.

anguliceps, Boucomont カドアシエムマコガネ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, XLVI., p. 210, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo, Taihôrin, Sokutsu, Raisha.
Gen. Distr.—India, Formosa.

angulatus, Redtenbacher カクムネエムマコガネ
in Hügel, Kaschm., p. 522, t. 24, f. 6, (1848).
Loc. Distr.—Kankau, Arisan, Rantaizan.
Gen. Distr.—India, Indo-China, China, Formosa.

nitidus, Waterhouse ツヤエムマコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 78, (1875).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

armatus, Blanchard シヴノエムマコガネ
Voy. Pole Sud., p. 98, t. 7, f. 9, 10, (1853).
Loc. Distr.—Anping, Tainan Taihoku, Nantô.
Gen Distr.—Sunda Islands, Indo-China, Formosa.

formosanus, GILLET タイワンエムマコガネ
Ann. Soc. Sc. Brux. XLIV., p. 67, (1924).
Loc. Distr.—Taihōrin, Hoozan, Kankau, Naifunpo, Jūgofunshō.
Gen. Distr.—Formosa.

tragus, FABRICIUS ツノブトエムマコガネ
Ent. Syst. ..., p. 56, (*Scarabaeus*) (1792).
Loc. Distr.—Anping, Tainan, Pilam, Taihōrin, Nantō.
Gen. Distr.—India, Malay, Indo-China, China, Formosa.

turmaris, GILLET アカガネエムマコガネ
Ann. Soc. Sc. Brux. XLIV., p. 66, (1924).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

mendicus, GILLET ヒメツヤエムマコガネ
Ann. Soc. Sc. Brux. XLIV., p. ..., (1924).
Loc. Distr.—Taihōrin, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, GILLET ザウタエムマコガネ
Ann. Soc. Sc. Brux. XLIV., p. 68, (1924).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo, Kuraru, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

nitidiceps, FAIRMAIRE ツヤアシエムマコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII., p. 304, (1893).
Loc. Distr.—Taihōrin, Tainan, Anping, Kankau.
Gen. Distr.—Malay, Indo-China, Formosa.

taurinus, WHITE セマダラエムマコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. XIV., p. 424, (1844).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Kagi, Taihōrin, Kōsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Indo-China, East China, Formosa.

acuticollis, GILLET トガリエムマコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. LXVII., p. 255, (1927).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

trituber, WIEDEMANN ミフトゲエムマコガネ
Zool. Mag. II., 1, p. 17, (1823).
Loc. Distr.—Taihōrin, Kōsempo, Tainan, Anping, Heitō, Kankau, Horisha, Makazayazaya.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Indo-China, Formosa.

seniculus, FABRICIUS アカホシミドリエムマコガネ
Spec. Ins. I., p. 23, (*Scarabaeus*) (1781).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—India, Tenasserim, Malacca, Cambodja, Hainan, Hongkong, Formosa.

sonani, MIWA ソナンエムマコガネ
Ins. Mats. IV., No. 4, p. 171, f. 2, (1930).
Loc. Distr.—Funkiko, Rantaizan, Sikikum.
Gen. Distr.—Formosa.

tricornis, WIEDEMANN オホミツノエムマコガネ
Zool. Mag. II., 1, p. 10, (1823).
Loc. Distr.—Taihoku, Nantô, Horisha, Rokkiri.
Gen. Distr.—India, Indo-China, Malay, Java, China, Formosa.

hirsutulus, LANSBERG ヴガロエムマコガネ
Not. Leyd. Mus. V., p. 67, 70, (1883).
Loc. Distr.—Hoozan, Nôkô.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Formosa.

centricornis, FABRICIUS マノエムマコガネ
Ent. Syst. Suppl., p. 33, (*Copris*) (1798).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Ceylon, Siam, Java, Hongkong, Formosa.

orientalis, HAROLD コウシユンエムマコガネ
Col. Hefte IV., p. 83, (1868).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Assam, Andaman, Burma, Malay, Borneo, Hongkong, Formosa.

proletarius, HAROLD ヨツモンエムマコガネ
Col. Hefte XIII., p. 89, (1875).
Loc. Distr.—Sôzan.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

dama, FABRICIUS ルリエムマコガネ
Ent. Syst. Suppl., p. 32, (*Copris*) (1798).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—India, Malay, Formosa.

luridipennis, BOHEMANN アヲムネエムマコガネ
Resa Eugen., p. 45, (1858).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—East Asia.

lunatus, HAROLD ヒメエムマコガネ
Col. Hefte IV., p. 84, (1868).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Indo-China, China, Formosa.

lutosopictus, FAIRMAIRE アカマダラエムマコガネ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 69, (1897).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Loo-Choo (Ishigakishima), Formosa.

argyropygus, GILLET トビエムマコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. LXVII., p. 256, (1927).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

dapcauensis, Boucomont チビエムコガネ
Vitalis Faune Indoch. IV., p. 30, 58, ♂, (1921).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, Indo-China.

Subfamily **TROGINAE**

Genus **TROX,** Fabricius

obscurus, Waterhouse オホコブスヂコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 98, (1875).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, Siam.

opacotuberculatus, Motschulsky ヒメコブスヂコガネ
Etud. Ent. IX., p. 14, (1860).
Loc. Distr.—Horisha, Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Siam, North India.

scaber, Linné チビコブスヂコガネ
Syst. Nat. Ed. XII., p. 573, (*Scarabaeus*) (1767).
Loc. Distr.—Rokkiri, Hokkō.
Gen. Distr.—Cosmopolite.

chinensis, Bohemann シナコブスヂコガネ
Resa Eugen., p. 52, (1858).
Loc. Distr.—Pilam, Kankau, Hōkotō.
Gen. Distr.—South China, Formosa.

Subfamily **APHODIINAE**

Tribe: **APHODIINI**

Tribe **APHODIUS,** Illiger

lewisi, Waterhouse レビスマグソコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 92, (1875).
Loc. Distr.—Kagi, Taihōrin, Tainan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Philippines, Assam, Ceylon.

pilosus, Harold オホマグソコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. XVIII., p. 183, 190, (1874).
Loc. Distr.—Musha, Baibara, Taihōrin, Suisharyō, Kōsempo, Tainan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Hindustan.

rugosostriatus, Waterhouse スヂマグソコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 92, (1875).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

urostigma, Harold マグソコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. VI., p. 170, (1862).
Loc. Distr.—Taihoku, Taihōrin, Tainan, Anping, Hoozan, Kōsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Hainan, Hongkong, Yunnan, Java, Borneo, Sumatra, Penang, Malabar, Assam, Sylhet, Ceylon.

lividus, OLIVIER ウスイロマグソコガネ
Ent. I., 3, p. 86, pl. 26, f. 222, (*Scarabaeus*) (1789).
Loc. Distr.—Taihōrin, Tainan, Pilam.
Gen. Distr.—Formosa, China, Java, Celebes, Ceylon, India, Abyssinia, Australia, Hawaii, Mexico.

obsoletus, WATERHOUSE キバネマグソコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 88, (1875).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

reichei, HAROLD ライヘマグソコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. III., p. 210, (1859).
Loc. Distr.—Kōsempo, Chikutōki.
Gen. Distr.—New Guinea, India, Java, Celebes, Philippines, Formosa, China.

moestus, FABRICIUS キベリマグソコガネ
Syst. El. I., p. 78, (1801).
Loc. Distr.—Suisharyō, Kankau, Akau.
Gen. Distr.—Formosa, Hongkong, Malay, India, Ceylon, Arabia, Africa.

sinuatus, HAROLD チャイロマグソコガネ
Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII., p. 614, (1860).
Loc. Distr.—Kōsempo, Kōshun.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines, Java, India.

australasiae, BOHEMANN コクロマグソコガネ
Resa Fugen., p. 50, (1858).
Loc. Distr.—Horisha, Kankau.
Gen. Distr.—Sidney, Sumatra, Java, Celebes, Formosa.

carinulatus, MOTSCHULSKY マメマグソコガネ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI., 2, p. 461, (1863).
Loc. Distr.—Tainan, Kōtōsho.
Gen. Distr.—Ceylon, India, Formosa.

pallidicinctus, WATERHOUSE チビマグソコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 85, (1875).
Loc. Distr.—Taihōrin, Tainan, Kōsempo.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

marginellus, FABRICIUS タイワンマグソコガネ
Spec. Ins. I., p. 21, (*Scarabaeus*) (1731).
Loc. Distr.—Taihōrin, Tainan, Anping, Kankau, Kōsempo, Kwashōtō.
Gen. Distr.—Formosa, Hongkong, Siam, Malay, Celebes, Borneo, Java, India, Ceylon, Africa.

marginellus var. **priseus,** MOTSCHULSKY
Etud. Ent. VII., p. 56, (1858).
Loc. Distr.—Taihoku, Taihōrin, Kōsempo, Kōshun.
Gen. Distr.—Burma, Celebes, New-Guinea, Formosa.

segmentaroides, SCHMIDT ウスモンマグソコガネ
Soc. Ent. XXIV., 1909/10, p. 11, (1909).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Assam, Burma, Annam, Philippines, China, Formosa.

russatus, Erichson キスヂマグソコガネ
Doubl. Verz. Seneg. Ins., p. 7, (1842).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Siam, India, Senegal.

orientalis, Harold ツヤハダマグソコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. VI., p. 147, (1862).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Celebes, China, Formosa.

costatulus, Schmidt ヒメスヂマグソコガネ
Entomol. Wochenbl. XXV., p. 47, (*Melinopterus*) (1908).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—Hongkong, Hainan, Formosa.

chinensis, Harold シナマグソコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. V., p. 105, (1861).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

elongatulus, Fabricius クリイロマグソコガネ
Syst. El. I., p. 68, (1801).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Bengal, China, Formosa, America.

crenatus, Harold クロマグソガコネ
Berl. Ent. Zeitschr. VI., p. 141, 142, (1862).
Loc. Distr.—Akau.
Gen. Distr.—Malay, Siam, Philippines, Java, Ceylon, Formosa.

globulus, Harold セマルマグソコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. III., p. 207, (1859).
Loc. Distr.—Anping, Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Hongkong, Formosa.

sorex, Fabricius オホキバネマグソコガネ
Ent. Syst. I., p. 23, (*Scarabaeus*) (1792).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, India, Australia, Africa.

elegans, Allibert オホフタテンマグソコガネ
Rev. Zool., p. 18, (1847).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China, Tibet, India.

kotoensis, Miwa コウトウマグソコガネ
Ins. Mats. IV., No. 4, p. 174, (1930).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **OXYOMUS,** Casternau

cameratus, Schmidt マルマグソコガネ
Entomol. Wochenbl. XXV., p. 47, (1908).

Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Genus **SAPROSITES,** Redtenbacher

japonicus, Waterhouse ヤマトヒメマグソコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 93, (1875).
Loc. Distr.—Kôsempo, Arisan, Musha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

narae, Lewis ナラヒメマグソコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI., p. 382, (1895).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, Philippines, Malay, Borneo, Andaman, Assam.

Tribe: PSAMMOBIINI

Genus **PSAMMOBIUS,** Heer

convexus, Waterhouse セマルケシマグソコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 94, (1875).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, India.

indicus, Harold インドケシマグソコガネ
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, X., p. 100, (1877).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, Celebes, India, Madagascar.

Genus **RHYSSEMUS,** Mulsant

inscitus, Walker コガシラツツマグソコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 207, (1858).
Loc. Distr.—Anping, Tainan, Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Ceylon, Formosa.

Genus **TRICHIORHYSSEMUS,** Clouet

hirsutus, Clouet ツツマグソコガネ
Mém. Soc. Ent. Belg. VIII., p. 28, 35, (1901).
Loc. Distr.—Taihôrin, Tainan, Anping.
Gen. Distr.—Sunda Islands, Formosa.

Tribe: **RHYPARINI**

Genus **RHYPARUS,** Westwood

philippinensis, Arrow オホセスヂツツマグソコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV., p. 538, (1905).
Loc. Distr.—Kôsempo, Musha, Arisan.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

helephoroides, FAIRMAIRE ソクラマダソコガネ
Not. Leyd. Mus. XV., p. 145, (1893).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Borneo, Formosa.

peninsularis, ARROW セスヂツラマダソコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV., p. 537, (1905).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo, Taipin.
Gen. Distr.—Penang, Perak, Formosa.

Subfamily **HYBOSORINAE**

Genus **PHAEOCHROUS,** CASTERNAU

emarginatus, CASTERNAU フチトリアツバコガネ
Hist. Nat. Ins. II., p. 109, (1840).
Loc. Distr.—Alikang, Kôsempo, Sokutsu, Taihôrin, Anping, Kankau, Horisha, Baibara, Niitaka.
Gen. Distr.—Formosa, Hainan, Philippines, Penang, New Guinea, Sumatra, Borneo, Java, India, Australia, Queensland.

Subfamily **HOPRIINAE**

Genus **DICHELOMORPHA,** BURMEISTER

delauneyi, FLEUTIAUX デラウネイコガネ
Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VIII., p. 62, t. 4, f. 3, (1887).
Loc. Distr.—Tainan, Kappanzan.
Gen. Distr.—Annam, Formosa.

Genus **ECTINOHOPLIA,** REITTENBACHER

chrysura, REITTER コウシュンアシナガコガネ
Verh. Nat. Ver. Brunn. LXI., (Best.-Tab. 51), p. 108, (1903).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Burma, Formosa.

sulphuriventris, REITTENBACHER キバラアシナガコガネ
Reis. Nov. Zool. II., Col. p. 63, t. 2, f. 10, (1868).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Hongkong, Shanghai, Formosa, Japan proper.

formosana, MOSER タイワンアシナガコガネ
Stett. Ent. Zeit., p. 362, (1919).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

arrowi, MIWA (Nom. Nov.) アロウアシナガコガネ
=*formosana,* ARROW, Proc. Zool. Soc. Lond. XIX., p. 209, (1921) (Nec. MOSER).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo.
Gen Distr.—Formosa.

Genus **HOPLIA**, Illiger

reini, Heyden ライソアシナガコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr. XXIII., p. 339, (1879).
Loc. Distr.—Horisha, Sankakuho.
Gen. Distr.—Japan (Kiushiu), Formosa.

squamacea, White コナアシナガコガネ
Ann. Nag. Nat. Hist. XIV., p. 424, (1844).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—China, Hongkong, Hainan, Formosa.

elegantula, White コウトウアシナガコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. XIV., p. 424, (1844).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Hongkong, Hainan, Formosa.

gracilipes, Lewis キアシナガコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVI., p. 389, (1895).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Loo-Choo (Oshima), Formosa.

Subfamily **SERICINAE**

Genus **SERICA**, Mac Leay

famelica, Brenske コウシュンビロドコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. XLII., p. 391, (1897).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, China.

formosana, Moser タイワンヒメビロドコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 237, (1915).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

horishana, Nijima et Kinoshita ホリシヤビロドコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. IV., p. 3, 78, T. 1, f. 3, 4, (1927).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

nigroguttata, Brenske クロテンビロドコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. XLII., p. 389, ♂, ♀, (1897).
Loc. Distr.—Horisha, Kôshun.
Gen. Distr.—China, Formosa.

nigromaculosa, Fairmaire クロモンビロドコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV., p. 196, (1891).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **MALADERA**, MULSANT

salebrosa, BRENSKE ヒメビロドコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. XLII., p. 428, ♂, ♀, (1897).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa, Celebes.

japonica, MOTSCHULSKY アカビロドコガネ
Etud. Ent. IX., p. 15, (*Serica*) (1860).
Loc. Distr.—Horisha, Taipin.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

Genus **AUTOSERICA**, BRENSKE

sinica, HOPE コビロドコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond. IV., p. 3, (*Serica*) (1845).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Hainan, Hongkong, Formosa.

formosae, BRENSKE タイワンビロドコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. LIII., p. 210, ♂, ♀, (1898).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Korea, Formosa.

sauteri, MOSER ザウタビロドコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXIX., p. 213, (1918).
Loc. Distr.—Kōsempo, Sokutsu, Kagi.
Gen. Distr.—Formosa.

invenusta, MOSER サビビロドコガネ
Stett. Ent. Zeit., p. 212, (1918).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

ovatula, FAIRMAIRE チヤイロビロドコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV., (*Serica*) (1891).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Korea, Formosa, China.

infuscata, MOSER ススイロビロドコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 340, (1915).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—Formosa, China, Korea.

stridula, BRENSKE シナビロドコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. XLII., p. 401, (1897).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, China.

labariosa, BRENSKE タイナンクロビロドコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. XLII., p. 399, 401, (1897).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—China, Formosa.

saitoi, Nijima et Kinoshita サイトウビロドコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. IV., p. 72, t. I. f. 7; t. III, f. 1, (1927).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **NEOSERICA,** Brenske

macrophthalma, Moser コウセンビロドコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXIX., p. 219, (1918).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

obscura, Blanchard ウスグロビロドコガネ
Cat. Col. Ent. I., 79, (1850).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Genus **GASTROSERICA,** Brenske

marginalis, Brenske フチトリビロドコガネ
Mém. Soc. Ent. Belg. II., p. 10/51, 52, ♂, ♀, (1894).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Tonkin, Shanghai, Formosa.

bicolor, Nijima et Matsumura シマビロドコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. Sapporo, Japan, II., p. 220, t. II, f. 8, (1923).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PACHYSERICA,** Brenske

marmorata, Blanchard ウスグモビロドコガネ
Cat. Col. Ent. I., p. 77, (*Omaloplia*) (1850).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, North India.

Genus **ANOMALOPHYLLA,** Reitter

barberi, Sharp バルベルビロドコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XI., p. 469, ♂, ♀, (*Melasserica*) (1903).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—South India, Formosa.

Subfamily **MELOLONTHINAE**

Genus **APOGONIA**, Kirby

amida, Lewis ヒメカンショコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVII., p. 332, (1896).
Loc. Distr.—Takao, Chikutôki.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

sauteri, Moser ザウタカンショコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXIX., p. 232, (1918).
Loc. Distr.—Takao, Kankau, Sokutsu, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

splendida, Boheman ツヤカンショコガネ
Resa Eugen. Col., p. 55, (1858).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

rufobrunnea, Moser アカチヤカンショコガネ
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **CYPHOCHILUS**, Waterhouse

insulanus, Moser シロコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXIX., p. 242, (1918).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HOLOTRICHIA**, Hope

sinensis, Hope タイワンクロコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond. IV., p. 8, (1845).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—India, Hainan, Formosa.

formosana, Moser タイワンクリイロコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. LII., p. 470, (1903).
Loc. Distr.—Fuhôshô, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

kiotoensis, Brenske クロコガネ
Mém. Soc. Ent. Belg. II., p. 19, 68, ♂, ♀, (1894).
Loc. Distr.—Taipin, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

lata, Brenske オホクロコガネ
Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII., p. 163, ♂, ♀, (1892).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Shanghai, Hongkong, Tonkin, Formosa.

geilenkeuseri, BRENSKE ガイレンケウセルコガネ
in Reitt. Verh. Nat. Ver. Brun. XVII., 1901, (Best.-Tab. 50), p. 175, (1902).
Loc. Distr.—Tainan, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa, China.

sauteri, MOSER ザウタクロコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg., p. 436, (1913).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

horishana, NIIJIMA et KINOSHITA ホリシヤクロコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II. p. 52, 222, t. II, f. 3; t. IV, f. 9, (1923).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

parallela, MOTSCHULSKY ホソクロコガネ
Etud. Ent. III., p. 64, (*Lachnosterna*) (1854).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—North China, Japan proper, Tsushima, Korea, Shanghai, Thibet, Formosa.

pruinosa, NIIJIMA et KINOSHITA タイワンオホクロコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II., p. 51, 221, t. IV, f. 4, 10, (1923).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MICROTRICHIA,** BRENSKE

formosana, MOSER ヒメクロコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 273, (1913).
Loc. Distr.—Alikang, Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LASIOPSIS,** ERICHSON

? sahlbergi, MANNERHEIM ザールベルゲコガネ
Bull. Soc. Nat. Mosc. XXII., 1, p. 239, (*Rhizotrogus*) (1849).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Dauria, Siberia, Formosa.

formosanus, NIIJIMA et KINOSHITA タイワンキコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. IV., p. 21, 83, t. 1, f. 14, t. III, f. 6, (1927).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **GRANIDA,** MOTSCHULSKY

albolineata, MOTSCHULSKY シロスヂコガネ
Etud. Ent. X., p. 8, (1861).

Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa, Japan proper.

Genus **POLYPHYLIA**, Harris

formosana, Nijima et Kinoshita タイワンヒゲコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II., p. 69, 229, t. IV, f. 22; t. XI, f. 2, (1923).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HEPTOPHYLLA**, Motschulsky

formosana, Nijima et Kinoshita タイワンナガチャコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. IV., p. 28, 84, t. III, f. 20; t. III, f. 8, (1927).
Loc. Distr.—Horisha, Tompo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MELOLONTHA**, Fabricius

insulana, Moser タイワンコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXIX., p. 346, (1918).
Loc. Distr.—Karapin.
Gen. Distr.—Formosa.

insulana var. **taihokuensis**, Nijima et Kinoshita
Res. Bull. Col. Ex. Forest, Col. Agr. Hokkaido, Imp. Univ. II., p. 65, (1923).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

umbraculata, Burmeister タイワンヒメコフキコガネ
Handb. Ent. IV., 2, p. 418, (1855).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Hongkong, Formosa.

serrulata, Gyllenhal ヘイトウコフキコガネ
in Schönh. Syn. Ins. I., 3, p. 168, App. p. 73, (1817).
Loc. Distr.—Heitō.
Gen. Distr.—India, Manila, Hongkong, Formosa.

Genus **SCHOENHERRIA**, Burmeister

argus, Burmeister ウズマダラコガネ
Handb. Ent. IV., 2, p. 419, (*Melolontha*) (1855).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—Java, Malacca, Sumatra, Kulu, Penang, Formosa.

Genus **GYMNOGASTER,** Blanchard

ezakii, Nijima et Kinoshita ホソコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II., p. 70, 223, t. II, f. 1, 2, (1923).
Loc. Distr.– Urai, Kobayashi.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **EUCHIRINAE**
Genus **CHEIROTONUS,** Hope

macleayi formosanus, Ohaus ニシキコガネ（テナガコガネ）
Ent. Rundsch. XXX., p. 142, (1913).
Loc. Distr.—Horisha, Kyûhabon.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfaily **RUTELINAE**
(Ruterinae Homalochelidae)
Tribe: **RUTELINI**
Subtribe: **PARASTASIINA**
Genus **PARASTASIA,** Westwood

confluens, Westwood チビバラスタシヤコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. VIII., p. 303, (1841).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines, Malay, Malacca, Andaman, Nicobar, Timor, New-Guinea.

canaliculata, Westwood タイナンバラスタシヤコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. VIII., p. 204, 303, (1841).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau, Tainan.
Gen. Distr.—Formosa, Philippines.

formosana, Ohaus タイワンバラスタシヤコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 122, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **ANOMALINI**
Subtribe: **ANOMALINA**
Genus **ANOMALA,** Samouelle
Subgenus **ANOMALA** s. str.

flavofasciata, Arrow キオビスヂコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IX., p. 72, (1912).
Loc. Distr.—Tattaka.
Gen. Distr.—Sikkim, Tonkin, Formosa.

viridicostata, NONFRIED ルリスヂコガネ
Ent. Nachr. XVIII., p. 86, (1892).
Loc. Distr.—Kōshun.
Gen. Distr.—South China, Formosa.

jonasi, OHAUS ジョナスコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 326, (1915).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

jonasi var. **obscurior,** OHAUS
Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, p. 4, (1916).
Loc. Distr.—Nantō.
Gen. Distr.—Formosa.

auracoides, OHAUS ホソスヂコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 327, (1915).
Loc. Distr.—Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

limbifera, OHAUS タイワンヒメスヂコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 330, (1915).
Loc. Distr.—Kagi, Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

poecilochalcea, OHAUS ムシヤスヂコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 325, f. 17, (1915).
Loc. Distr.—Horisha, Musha.
Gen. Distr.—Formosa.

streptopyga, OHAUS オハウススヂコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 329, (1915).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

streptopyga var. **fuscoviolacea,** OHAUS
Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, p. 7, (1916).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

streptopyga var. **viridirufa,** OHAUS
Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, p. 7, (1916).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

libidinosa, OHAUS クリイロスヂコガネ
Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, p. 5, (1916).
Loc. Distr.—Kōsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

polijanor, OHAUS ヒメスヂコガネ
Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, p. 4, (1916).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

sagax, Ohaus アメイロスヂコガネ
Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, p. 6, (1916).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

sauteri, Ohaus ザウタスヂコガネ
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 329, (1915).
Loc. Distr.—Kankau, Anping.
Gen. Distr.—Formosa.

siniopyga, Ohaus タイホリンスヂコガネ
Arch. Naturg. LXXXII., A. 4, p. 8, (1916).
Loc. Distr.—Taihorin.
Gen. Distr.—Formosa.

corrugata, Bates リウキウスヂコガネ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 243, (1866).
Loc. Distr.—Tansui.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

palleola, Gyllenhal ヒメウスキスヂコガネ
in Schönh. Syn. Ins. I., 3, Append. p. 107, (*Melolontha*) (1817).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—East-India, Formosa.

sinica, Arrow ヒメアヲスヂコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVI., p. 231, (1915).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—South China, Formosa.

aulax, Wiedemann アヲスヂコガネ
Zool. Mag. II., p. 93, (*Melolontha*) (1823).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha.
Gen. Distr.—South China, Formosa.

fasciolata, Ohaus キオビスヂコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 123, (1925).
Loc. Distr.—Takao.
Gen. Distr.—Formosa.

badia, Ohaus タイワンチヤイロスヂコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 127, (1925).
Loc. Distr.–Horisha, Nantô.
Gen. Distr.—Formosa.

edentula, Ohaus キザンスヂコガネ (ムシスヂコガネ)
Arch. Naturg. LXLI., p. 128, (1925).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

phaeogastra, Ohaus タイナンスヂコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 129, (1925).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

erubescens, OHAUS クロヒメスヂコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 129, (1925).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

hoplocosmeta, OHAUS ホクトスヂコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 125, (1955).
Loc. Distr.—Hokuto.
Gen. Distr.—Formosa.

holosericioides, NIIJIMA et KINOSHITA ヒメキンスヂコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. IV., p. 50, 85, t. II, f. 11; t. III, f. 9, (1927).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

dimidiata, HOPE インドアヲドウガネ
in Gray's Zool. Misc., p. 23, (*Euchlora*) (1831).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Nepal, India, Formosa.

ishidai, NIIJIMA et KINOSHITA イシダスヂコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. IV., p. 52, 86, t. II, f. 2; t. III, f. 10, (1927).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **APROSTERNA,** HOPE

inconcinna, BATES クロチヤスヂコガネ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 343, (1866).
Loc. Distr.—Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **EUCHLORA,** MAC LEAY

xanthopleura, ARROW リウキウドウガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII., p. 402, (1913).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

castaneoventris, BATES ハラアカドウガネ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 344, (1866).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

cupripes, HOPE アカアシドウガネ
Proc. Zool. Soc. Lond. VII., p. 68, (1839).
Loc. Distr.—Taihoku.
Gen. Distr.—East India, South China, Formosa.

cupripes var. **coerulescens,** OHAUS
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 331, (1915).
Loc. Distr.—Taihorin.
Gen. Distr.—Formosa.

expansa, BATES タイワンアヲドウガネ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 343, (1866).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Tainan, Kagi.
Gen. Distr.—Formosa.

trachypyga, BATES ミカンアヲドウガネ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 344, (1866).
Loc. Distr.—Sokutsu, Taihorin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PHYLLOPERTHA,** STEPHENS

okinaensis, OHAUS タイワンセマダラコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 130, (1925).
Loc. Distr.—Takao, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

chalcoides, OHAUS タイワンクロヒメスヂコガネ
Arch. Naturg. LXLI., p. 131, (1925).
Loc. Distr.—Taihōrin.
Gen. Distr.—Formosa.

formosana, NIIJIMA et KINOSHITA タイワンウスチヤコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. IV., p. 61, 86, t. II, f. 15, (1927).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **MIMELA,** KIRBY
Subgenus **MIMELA** s. str.

excisipes, REITTER タイワンツヤコガネ
Verh. Nat. Ver. Brunn. XLI., p. 54, (1903).
Loc. Distr.—Hoozan.
Gen. Distr.—Central China, Formosa.

ignicauda, BATES ベイツツヤコガネ
Proc. Zool. Soc. Lond., p. 345, (1866).
Loc. Distr.—Shinchiku, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

splendens, GYLLENHAL ルリツヤコガネ
in Schönh. Syn. Ins. I., 3, Append. p. 110, (*Melolontha*) (1817).
Loc. Distr.—Kōsempo, Kankau, Suisharyō.
Gen. Distr.—Japan proper, China, Formosa.

splendens var. **cyanicollis,** Ohaus
Stett. Ent. Zeit. LXXVI., p. 96, (1915).
Loc. Distr.—Kwarenkô, Pinan.
Gen. Distr.—Korea, Formosa.

testaceoviridis, Blanchard キイロツヤコガネ
Cat. Coll. Fat. Col., p. 197, (1850).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—China, Formosa.

Subtribe: **POPILLIINA**
Genus **POPILLIA,** Serville

indigonacea, Motschulsky ルリマメコガネ
Etud. Ent. II., p. 47, (1853).
Loc. Distr.—Kwarenkô, Musha, Niitaka, Arisan.
Gen. Distr—Amur, Kor[illegible] North China, Formosa.

quadriguttata, Fabricius キバネマメコガネ
Mant. Ins. II., Append. p. 377, (*Trichius*) (1787).
Loc. Distr.—Horisha, Musha.
Gen. Distr.—North China, Formosa.

chlorion, Newman カンカウマメコガネ
Mag. Nat. Hist. (3) II., p. 337, (1838).
Loc. Distr.—Kankau.
Gen. Distr.—Madras, Formosa.

formosana, Arrow タカサゴマメコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII., p. 40, 45, (1913).
Loc. Distr.—Tainan, Kagi.
Gen. Distr.—Formosa.

histeroides, Gyllenhal チヤバネマメコガネ
in Schönh. Syn. Ins. I., 3, Append. 66, (*Rutela*) (1817).
Loc. Distr.—Kankau, Sokutsu, Taihorin, Kôsempo, Kanshirei.
Gen. Distr.—East India, Formosa.

mongolica, Arrow モウコマメコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII., p. 40, 43, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Hoozan, Taihôrin, Sokutsu, Philam.
Gen. Distr.—South China, Formosa.

sauteri, Ohaus ザウタマメコガネ
Archiv Naturg. LXXXII., A. 4, p. 2, (1916).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

taiwana, Arrow タイワンマメコガネ
Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII., p. 40, 44, (1913).
Loc. Distr.—Taihoku, Kusukusu.
Gen. Distr.—Formosa.

(Rutelinae Orthochilidae)

Tribe: **ADORETINI**

Subtribe: **ADORETINA**

Genus **ADORETUS,** Laporte de Casternau

Subgenus **ADORETUS,** s. str.

convexus, Burmeister セダカチヤイロコガネ

Handb. Ent. IV., 2. p. 531, (1855).

Loc. Distr.—Kôshun.

Gen. Distr.—Tonkin, Hongkong, Formosa.

Subgenus **LEPADORETUS,** Reiter

sinicus, Burmeister シナチヤイロコガネ

Handb. Ent. IV., 2, p. 532, (1855).

Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau, Hoozan, Koroton.

Gen. Distr.—China, Formosa, India, Java to Timor, Hawaii.

Subgenus **CHAETADORETUS,** Ohaus

cribratus, White コウシュンチヤイロコガネ

Ann. Mag. Nat. Hist. XIV., p. 424, (1844).

Loc. Distr.—Kôshun.

Gen. Distr.—South China, Siam, Java, Formosa.

formosanus, Ohaus タイワンチヤイロコガネ

Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 503, f. 38, (1914).

Loc. Distr.—Taihorin, Koroton, Anping, Pilam, Kôsempo, Kôshun, Hoozan.

Gen. Distr.—Formosa.

hirsutus, Ohaus アラゲチヤイロコガネ

Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 503, f. 37, (1914).

Loc. Distr.—Koroton.

Gen. Distr.—South China, Formosa.

Subfamily **DYNASTINAE**

Genus **XYLOTRUPES,** Hope

dichotomus, Linné カブトムシ (サイカチムシ)

Mant. Plantor. VI., p. 529, (*Scarabaeus*) (1771).

Loc. Distr.—Baibara, Horisha.

Gen. Distr.—Japan proper, Formosa, China, Philippines, Darjeeling.

gideon, Linné ヒメカブトムシ

Syst. Nat. Ed. I., 2, p. 541, (*Scarabaeus*) (1758).

Loc. Distr.—Baibara, Kyûhabon.

Gen. Distr.—Java, Formosa.

Genus **EUPHILEURUS,** ARROW

chinensis, FALDERMAN コカブトムシ
Mem. Ac. St. Petersb. II., p. 370, t. 4, f. 4, (1835).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa, Japan proper.

Genus **ORYCTES,** ILLIGER

rhinoceros, LINNÉ タイワンカブトムシ
Syst. Nat. I., p. 346, (*Scarabaeus*) (1758).
Loc. Distr.—Tainan, Horisha.
Gen. Distr.—Ceylon, Sumatra, Philippines, Formosa, Loo-Choo, Korea.

Genus **ALISSONOTUM,** ARROW

impressicolle, ARROW ホリシヤクロマルコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 3[illegible], (1908).
Loc. Distr.—Horisha, Sinkwa.
Gen. Distr.—Burma, Tonkin, Formosa.

crussum, ARROW インドクロマルコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 323, (1908)
Loc. Distr.—Tainan, Takao.
Gen. Distr.—Assam, Silhet, Burma, Tenasserim, Formosa.

pauper, BURMEISTER ヒメクロマルコガネ
Handb. Ent. V., p. 94, (*Heteronychus*) (1847).
Loc. Distr.—Kagi, Horisha.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

Subfamily **TRICHIINAE**

Genus **TRICHIUS,** FABRICIUS

bifasciatus, MOSER タイワントラハナムグリ
Berl. Ent. Zeitschr. XLVI., p. 532, (1901).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo.
Gen. Distr—Tonkin, Formosa.

bowringi, THOMSON ボウリングトラハナムグリ
Arch. Ent. I., p. 118, (1857).
Loc. Distr.—Anping.
Gen. Distr.—Shanghai, Formosa.

cupreipes, BOURGOIN カラカネトラハナムグリ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 175, (1915).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

diversicolor, BOURGOIN ヒメトラハナムグリ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 177, (1915).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kōsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **VALGINAE**

Genus **CHROMOVALGUS**, KOLBE

laetus, ARROW コウシユンヒラタハナムグリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX., p. 408, (*Valgus*) (1887).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

formosanus, MOSER タイワンヒラタハナムグリ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 598, (1915).
Loc. Distr.—Taihôrin, Kôsempo, Sokutsu, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **HYBOVALGUS**, KOLBE

thoracicus, MOSER タイナンヒラタハナムグリ
Ann. Soc. Ent. Belg. LV., p. 128, (1911).
Loc. Distr.—Tainan.
Gen. Distr.—Formosa.

Subfamily **CETONIINAE**

Tribe: **GOLIATHINI**

Subtribe: **GOLIATHINA**

Genus **DICRANOCEPHALUS**, BURMEISTER

bourgoini, POUILLANDE タイワンツノコガネ
Insecta, IV., p. 293, (1914).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

bowringi, PASCOE ボウリングツノコガネ
Journ. Ent. II., 1863/66, p. 25, (1863).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—North-China, Formosa.

Subtribe: **HETERORRHININA**

Genus **HETERORRHINA**, WESTWOOD

macleayi, KIRBY マツクリカナブン
Trans. Linn. Soc. Lond. XII., p. 408, t. 21, f. 11, (*Cetonia*) (1818).
Loc. Distr.—Kôshun,
Gen. Distr.—Luzon, Bohol, Panaon, Formosa,

nigritarsis, HOPE クロアシカナブン
in Gray's Zool. Misc., p. 24, (*Cetonia*) (1831)
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Nepal, Darjeeling, Pendschab, Formosa.

Genus **TRIGONOPHORUS**, Westwood

dilutus, Bourgoin ツノカナブン
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 438, (1914).
Loc. Distr.—Suisharyô.
Gen. Distr.—Formosa.

gracilipes, Westwood キアシカナブン
Trans. Ent. Soc. Lond. IV., 1845/47, p. 88, t, 5, f. 5, (1845).
Loc. Distr.—Kanshirei.
Gen. Distr.—Assam, Sikkim, Bhutan, Formosa.

varians, Bourgoin タイワンカナブン
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 437, (1914).
Loc. Distr.—Hoozan, Taihôrin, Kôsempo, Sokutsu, Chip-Chip, Anping, Karapin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EUCHLOROPUS**, Arrow

laetus, Fabricius ルリヒメカナブン
Syst. El. II., p. 150, (*Cetonia*) (1801).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Sumatra, Borneo, Siam, Assam, Madagascar, Bengal, Formosa.

Genus **INGRISMA**, Fairmaire

insulana, Moser ルリホソカナブン
Stett. Ent. Zeit. LXXVII., p. 141, (1916).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

parallelicеps, Bourgoin コウセンホソカナブン
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 446, (1914).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Subtribe: **RHOMBORRHININA**

Genus **COSMIOMORPHA**, Saunders

modesta, Saunders クリイロカナブン
Trans. Ent. Soc. Lond. XI., 1852/53, p. 29, t. 3, f. 1, ♂, 2, ♀, (1852).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—North-China, Formosa.

similis, Fairmaire タイワンチャイロカナブン
Ann. Soc. Ent. Fr. XLVIII., p. 621, (1899).
Loc. Distr.—Taihoku, Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **RHOMBORRHINA**, Hope

Subgenus **RHOMBORRHINA**, s. str.

unicolor formosana, Moser タイワンアヲカナブン
Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, p. 313, (1909).
Loc. Distr.—Tainan, Kôsempo, Kankau.
Gen. Distr.—Formosa.

polita, Waterhouse クロカナブン
Trans. Ent. Soc. Lond., p. 113, (1875).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

insularis, Moser ムラサキカナブン
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 293, (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

nigra, Saunders アヲグロカナブン
Trans. Ent. Soc. Lond. II., 1852/53, p. 29, t. 3, f. 3, (1852).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—China, Formosa.

resplendens, Swartz ルリカナブン
in Schönh. Syn. Ins. I., 3, Append. p. 51, (*Cetonia*) (1817).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—China, Burma, Formosa.

splendida, Moser キンカナブン
Ann. Soc. Ent. Belg. LVII., p. 156, (1913).
Loc. Distr.—Taihôrin, Alikang.
Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **TORYNORRHINA**, Arrow

apicalis, Westwood ツマアヲカナブン
Arc. Ent., 1841/43, p. 118, t. 30, f. 2, (*Rhomborrhina*) (1842).
Loc. Distr.—Kusukusu.
Gen. Distr.—Nepal, Sikkim, Bhamo, Formosa.

aurora, Bourgoin アカガネカナブン
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 447, (1914).
Loc. Distr.—Chip-Chip, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

fulvopilosa, Moser ケバネカナブン
Ann. Soc. Ent. Belg. LV., p. 120, (1911).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—China, Formosa.

pilifera, MOSER モゼルカナブン
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 579, (1914).
=*formosana,* MOSER, Deutsch, Ent. Zeitschr., p. 562, (1912).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **GYMNETINI**
Subtribe: **MACRONOTINA**
Section **CLINTERIIDES**
Genus **CLINTERIA,** BURMEISTER

aeneofusca, BOURGOIN クロハナムグリモドキ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 467, (1915).
Loc. Distr.—Kôsempo, Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

klugi, HOPE アカボシハナムグリモドキ
in Gray's Zool. Misc., p. 25, (*Cetonia*) (1831).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Bombay, Bengal, Formosa.

spuria, BURMEISTER キボシハナムグリモドキ
Handb. Ent. V., p. 555, (1847).
Loc. Distr.—Arisan.
Gen. Distr.—Kaschmir, Assam, Bhutan, Burma, Formosa.

Section **MACRONOTIDES**
Genus **COELODERA,** HOPE

nigroscutellaris formosana, MOSER ホソボエグリコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 297, (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo, Karapin, Chip-Chip.
Gen. Distr.—Formosa.

penicillata, HOPE スヂダカエグリコガネ
in Gray's Zool. Misc., p. 25, (1831).
Loc. Distr.—Kanshirei.
Gen. Distr.—Nepal, Sikkim, Assam, Burma, Formosa.

Genus **MACRONOTA,** HOFFMANNSEGG

flavofasciata formosana, MOSER キオビエグリコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 298, (*Carolina*) (1910).
Loc. Distr.—Sokutsu.
Gen. Distr.—Formosa.

lata, BOURGOIN チヤイロエグリコガネ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 158, (1913).
Loc. Distr.—Kôsempo, Yamanotaiko.
Gen. Distr.—Formosa.

kagiensis, NIIJIMA et KINOSHITA カギエゲリコガネ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II., no. 2, p. 231, t. I, f. 15, (1923).
Loc. Distr.—Kagi.
Gen. Distr.—Formosa.

viridula, NIIJIMA et KINOSHITA アヲエゲリコガネ
Res. Bull. Col. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II., no. 2, p. 232, t. I, f. 6, (1923).
Loc. Distr.—Taiheizan.
Gen. Distr.—Formosa.

nigricollis, JANSON ヨツボシエゲリコガネ
Cist. Ent. II., 1875/82, p. 604, (*Ataenia*) (1881).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Assam, Burma, Formosa.

ornata, SAUNDERS シロスヂエゲリコガネ
Trans. Ent. Soc. Lond. II., 1852/53, p. 31, t. 3, f. 5, (*Taeniodera*) (1852).
Loc. Distr.—Taipin.
Gen. Distr.—East China, Formosa.

perrandieri, FAIRMAIRE ヨツスヂエゲリコガネ
Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII., p. 294 (*Taeniodera*) (1893).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Arisan.
Gen. Distr.—Assam, Indo-China, Formosa.

procera, BOURGOIN ミスヂエゲリコガネ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 160, (1915).
Loc. Distr.—Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

proxima, BOURGOIN クロフエゲリコガネ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 156, (1915).
Loc. Distr.—Horisha, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **EUSELATES,** J. THOMSON

schoenfeldti, KRAATZ シエンフエルドエゲリコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 72, (1893).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Hongkong, Hainan, Formosa.

tonkinensis formosana, MOSER チヤイロエゲリコガネ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 298, (1910).
Loc. Distr.—Horisha, Baibara.
Gen. Distr.—Formosa.

Tribe: **CETONIINI**

Subtribe: **CETONIINA**

Genus **CETONIA**, FABRICIUS

Subgenus **EUCETONIA**, SCHOCH

prasinata, BOURGOIN キンヘリハナムグリ

Bull. Soc. Ent. Fr., p. 174, (1915).

Loc. Distr.—Musha, Kwarenkō.

Gen. Distr.—Formosa.

Genus **LIOCOLA**, C. G. THOMSON

brevitarsis, LEWIS シラホシハナムグリ

Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV., p. 463, (*Cetonia*) (1879).

Loc. Distr.—Horisha.

Gen. Distr.—Japan proper, China, East Siberia, Formosa.

formosana, MOSER タイワンシラホシハナムグリ

Ann. Soc. Ent. Belg. LIV., p. 357, (1910).

Loc. Distr.—Kōsempo, Sokutsu.

Gen. Distr.—Formosa.

speculifera, SWARTZ ミドリハナムグリ

in Schönh. Syn. Ins. I., 3, Append. p. 53, (*Cetonia*) (1817).

Loc. Distr.—Heitō.

Gen. Distr.—Himalaya, Kashmir, China, Formosa, Japan proper.

Genus **POTOSIA**, MULSANT

Subgenus **POTOSIA**, s. str.

grisea, NIIJIMA et KINOSHITA カバイロハナムグリ

Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II., no. 2, p. 234, t. V., f. 7, (1923).

Loc. Distr.—Horisha, Kanshirei.

Gen. Distr.—Formosa.

Subgenus **CALOPOTOSIA**, REITTER

aerata, ERICHSON シロテンハナムグリ

Nov. Acta. Halle XVI., p. 240, (*Cetonia*) (1834).

Loc. Distr.—Anping, Tainan.

Gen. Distr.—China, Japan proper, Korea, Formosa.

aerata var. **submarmorea**, BURMEISTER

Handb. Ent. III., p. 460, (*Cetonia*) (1842).

Loc. Distr.—Tainan.

Gen. Distr.—Formosa, China.

formosana, Moser タイワンシロテンハナムグリ
Ann. Soc. Ent. Belg. LIV., p. 357. (1910).
Loc. Distr.—Kôsempo, Kankau, Sokutsu, Musha, Kwashôtô, Kôtôsho, Pilam, Chip-Chip, Taihôrin, Taihoku.
Gen. Distr.—Formosa.

ishigakia, Fairmaire イシガキハナムグリ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 14, (*Cetonia*) (1898).
Loc. Distr.—Kwarenkô.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

Subgenus **CETONISCHEMA,** Reitter

famelica, Janson シナハナムグリ
Cist. Ent. II., p. 539, 1875-82, (*Cetonia*) (1879).
Loc. Distr.—Hôkotô.
Gen. Distr.—Mongolia, Yunnan, Central China, Formosa.

Subtribe: **GLYCYPHANINA**

Genus **PROTAETIA,** Burmeister

culta, Waterhouse ニシキハナムグリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV., p. 247, (1879).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Pilam.
Gen. Distr.—Formosa.

ferruginea, Gory & Percheron アカハナムグリ
Mon. Cet. p. 57, 196, t. 35, f. 3, (*Cetonia*) (1833).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

fusca, Herbst ウスグロハナムグリ
Natursyst. Käf. III., p. 257, t. 32, f. 4, (*Cetonia*) (1790).
Loc. Distr.—Horisha, Musha, Tainan.
Gen. Distr.—China, Formosa, Tenasserim, Burma, Malacca, Assam, Bengal, Polynesia, North-Queensland, North-West Australia, Mauritius.

taiwana, Nijima et Kinoshita ハイイロハナムグリ
Res. Bull. Col. Agr. Ex. Forest, Hokkaido, Imp. Univ. II., no. 2, p. 235, t. II, f. 4, (1923).
Loc. Distr.—Horisha.
Gen. Distr.—Formosa.

guerini, Eydoux グエリンハナムグリ
Rev. Zool., p. 265, (*Cetonia*) (1839).
Loc. Distr.—Kôtôsho.
Gen. Distr.—Philippines, Formosa.

orientalis, Gory & Percheron コウノハナムグリ
Mon. Cet., p. 56, 193, t. 34, f. 6, (*Cetonia*) (1833).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Himalaya, Kashmir, China, Formosa, Japan proper.

spinosa, Moser トゲハナムグリ
Ann. Soc. Ent. Belg. LV., p. 122, (1911).
Loc. Distr.—Taihôrin.
Gen. Distr.—Formosa.

Genus **PYROPOTOSIA,** Reitter

pryeri, Janson プライヤハナムグリ
Ann. Mag. Nat. Hist. (6) I., p. 195, (*Cetonia*) (1888).
Loc. Distr.—Kwarenkô.
Gen. Distr.—Loo-Choo, Formosa.

Genus **ANTHRACOPHORA,** Burmeister

crucifera, Olivier ジウジハナムグリ
Ent. I., 6, p. 39, t. 5, f. 29, (*Cetonia*) (1789).
Loc. Distr.—Rokkiri.
Gen. Distr.—India, Formosa.

rusticola, Burmeister ススハナムグリ
Handb. Ent. III., p. 624, (*Anthracophora*) (1842).
Loc. Distr.—Arisan, Horisha.
Gen. Distr.—Japan proper, Korea, Askold, China, Formosa.

Genus **GLYCYPHANA,** Burmeister

fulvistemma, Motschulsky クロハナムグリ
in Schrenk's Reisen Amurl., p. 135, (1860).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Dauria, Mongolia, Japan proper, Korea, Formosa.

catena, Arrow ミカドハナムグリ
Fauna Brit. Ind. Lamell. I., p. 120, 122, f. 29, (1910).
Loc. Distr.—Baikei.
Gen. Distr.—India, Formosa.

horsfieldi, Hope ホルスフイルドハナムグリ
in Gray's Zool. Misc., p. 25, (*Cetonia*) (1831).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kôsempo.
Gen. Distr.—Formosa, Nepal, Bhutan.

incongrua, Janson シロヘリヒメハナムグリ
Cist. Ent. II., 1875/82, p. 388, (1878).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu, Hoozan.
Gen. Distr.—Formosa.

tonkinensis, Moser トンキンヒメハナムグリ
Deutsch. Ent. Zeitschr., p. 594, (1914).
Loc. Distr.—Pilam.
Gen. Distr.—Tonkin, Formosa.

Genus **OXYCETONIA,** Arrow

costigera, Bourgoin セスヂヒメハナムグリ
Bull. Soc. Ent. Fr., p. 168, (1915).
Loc. Distr.—Kôsempo, Sokutsu.
Gen. Distr.—Japan proper, Formosa.

forticula, Janson アヤハナムグリ
Cist. Ent. II., 1875/82, p. 608, (1881).
Loc. Distr.—Taipin, Kwarenkô.
Gen. Distr.—Japan proper, Loo-Choo, Formosa.

jucunda, Faldermann コアヲハナムグリ
Mém. Acad. Petersb. II., p. 386, t. 4, f. 4-5, (*Cetonia*) (1835).
Loc. Distr.—Sokutsu, Kankau, Kôsempo, Hoozan, Kôtôsho.
Gen. Distr.—Nepal, Bengal, Sikkim, Assam, Siberia, Korea, China, Formosa, Japan proper, Cal[illegible]nia.

versicolor, Fabricius フタイロコハナムグリ
Syst. Ent., p. 51, (*Cetonia*) (1775).
Loc. Distr.—Kôshun, Taitô.
Gen. Distr.—Assam, Madras, Ceylon, Madagascar, Mauritius, Bourbon, Formosa.

Tribe: **CREMASTOCHILINI**

Subtribe: **MACROMINA**

Genus **CAMPSIVRA,** Hope

javanica, Gory & Percheron ジヤバホソコガネ
Mon. Cet., p. 53, 148, t. 23, f. 5, (*Macroma*) (1833).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—Java, Sikkim, Assam, Burma, Siam, Cambodja, Malacca, China, Formosa.

Subtribe: **CREMASTOCHILINA**

Genus **CALLYNOMES,** Westwood

davidis, Fairmaire ダビドホソコガネ
Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII., p. 107, t. 3, f. 6, (1878).
Loc. Distr.—Sokutsu, Baibara.
Gen. Distr.—China, Formosa.

ADDENDA

BORCHMANN, F.—Die Gattung Cteniopinus Seidlitz (*Alleculidae*).
(Koleopt. Rundsch. XVI., pp. 143-164, 1930).
Cteniopinus foveicollis, n. sp. p. 154.
Cteniopinus ater, n. sp. p. 160.

HELLER, K. M.—H. Sauter's Formosa-Ausbeute (*Curculionidae*).
(Wien. Ent. Zeit. XLVIII., 2, pp. 96-112, 1931).
TANYMECINI
Tanymecus (Asemus) misellus, n. sp. p. 97, Hab.—Kagi, Anping, Chip-Chip.
TRACHYPHLOEINI
Trachyodes marshalli, n. sp. p. 93, Hab.—Takao.
HYLOBIINI
Carcilia mesosternalis, n. sp. p. 99, Hab.—Kôsempo.
Euthicus excisus, n. sp. p. 100, Hab.—Suisharyô.
NANOPHYIINI
Nanophyes basilineatus, n. sp. p. 101, Hab.—Kôsempo.
CRYPTORRHYNCHINI
Parempleurus (n. g.) **dentirostris,** n. sp. p. 102, Hab.—Taihôrinshô.
Therebus orthocnemis, n. sp. p. 103, Hab.—Fuhôshô.
Mecistocerus thaiwanus, n. sp. p. 104, Hab.—Kôsempo, Alikang.
Orochlesis anteplagiata, n. sp. p. 104, Hab.—Takao.
Sclerolips horridus, n. sp. p. 105, Hab.—Sokutsu.
ZYGOPINI
Chirozetes alboguttatus, n. sp. p. 106, Hab.—Fuhôshô, Taihôrinshô.
Chirozetes (Mesochirozetes n. subg.) **formosanus,** n. sp. p. 108, Hab.—Kôsempo.
Heurippa x-album, n. sp. p. 109, Hab.—Fuhôshô.
CARANDRINI
Prodioctes formosanus, n. sp. p. 110, Hab.—Zentai, Kôsempo.
Anathymus tricolor, n. sp. p. 110, Hab.—Hoozan, Fuhôshô.
Cercidocerus erubescens, n. sp. p. 111, Hab.—Kôsempo, Hoozan.

HOSCHECK, A.—Beitrag zur Kenntniss der Buprestiden (*Col.*) III.
(Mitt. Zool. Mus. Berlin, XVII., 1, pp. 133-164, 1931).
Polyctesis igorrata ab. **aenea,** n. ab. p. 136, Hab.—?

KANO, T.—Description of two New Species of Formosan Cicindelidae (*Col.*).
(Proc. Imp. Acad. VII., No. 2, pp. 69-71, 1931).
Therates kotoensis, n. sp. p. 69, Hab.—Kôtôsho.
Cicindela niitakana, n. sp. p. 69, Hab.—Nankotaizan, Niitaka, Tsugitaka, Daisetsu.

——— Some New or Unrecorded Cetonid-Beetles from Formosa.
(Ann. Zool. Japon. XIII., No. 2, pp. 127-134, 1931).
Trichius elegans, n. sp. p. 127, f. 1, Hab.—Taiheizan.
Trichius taiheizanus, n. sp. p. 128, f. 2, Hab.—Taiheizan.
Trichius uraiensis, n. sp. p. 130, f. 3, Hab.—Urai.
Callynomes davidi nigra, n. subsp. p. 131, Hab.—Naihunpo.
Macronota monaldaoi, n. sp. p. 132, Hab.—Hakku, Habon, Baikei.
Macronota nigricolor, n. sp. p. 133, Hab.—Hori.
Macronota perrandieri ab. **extensa,** n. ab. p. 134, Hab.-Taiheizan.
?Agestrata orichalcea, LINNÉ
Amoen. Acad. VII., p. 507, (*Scarabaeus*) (1769).
Loc. Distr.—Kuraru.
Gen. Distr.—India, Malay, Sunda Islands, China, Formosa.

Oxycetonia jucunda bealiae, Gory et Percheron
Monogr. Cet., p. 282, pl. 54, f. 8, (*Cetonia*) (1833).
Loc. Distr.—Hori.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Kano, T.—A List of Scarabaeini of Japan-Empire (日本領土產蜣螂科ナスカラベ昆蟲目錄).
(Kontyû, V., No. 2, pp. 86-91, 1931).

Scarabaeus erichsoni, Harold コウシユンスカラベ
Col. H., p. 94, (1867).
Loc. Distr.—Kôshun.
Gen. Distr.—India, Formosa.

Kleine, R.—Catalogue of Indian Insects, 11. Brenthidae, pp. 13-50, (1926).

Carcinopisthius oberthuri, Senna=*Pseudothaphroderes formosanus,* Bolkay

Caenorychodes planicollis, Fabricius=*C. indicus,* Kirsch

Kolbe, H. J.—Damaster auf Formosa.
(Ent. Nachr. VIII, p. 340, 1887).

Kono, H.—Die Trypoxylus-Arten aus Japan und Formosa (*Col.: Scarabaeidae*).
(Ins. Mats. V., No. 4, p. 179, 1931)

Trypoxylus tsunobosonis, Kono=*Xylotrechus dichotomus* in Formosa.

Krekich-Strassaldo.—Beitrage zur Kenntnis Indischer Anthiciden, II.
(Folia Zoologica et Hydrobiologica III., No. 1, pp. 1-41, 1931).

Formiconus fuscipes, n. sp. p. 9, Hab.—Kôsempo.

Laboissier, V.—Contribution a L'étude des Galeruchini de l'Indo-chine et du Yunnan, avec déscriptions de nouveaux génres et éspèces.
(Ann. Soc. Ent. Fr. XCVI., pp. 37-62, 1927).

Periclitena vigoris, Hope
in Gray's Zool. Misc., p. 29, (*Galleruca*) (1831).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—India, Burma, Java, Formosa.

Clitenella (n. g.) **fulminans,** Faldermann
Mém. Acad. Petr. II., p. 438, t. 5, f. 8, (*Galleruca*) (1835).
Loc. Distr.—?
Gen. Distr.—China, Formosa.

——— Observations sur les Galeruchini asiatiques principalement du Tonkin et du Yunnan et déscriptions de nouveaux génres et éspèces.
(Ann. Soc. Ent. Fr. XCIX., pp. 325-370, 1930).

Semacia sexmaculata, n. sp. p. 336, Hab.—?

Morphosphaera formosa, n. sp. p. 337, Hab.—Kôsempo.

Leuthner, F.—A Monograph of the Odontolabini, a subdivision of the Coleopterous Family Lucanidae.
(Trans. Zool. Soc. Lond. XI., pp. 385-491, 1885).

Odontolabis siva, Hope (new to Formosa).

Matumura, S.—6000 Illustrated Insects of Japan-Empire (日本昆蟲大圖鑑) pp. 179-189, (1931).

Agonum daimio, Bates スヂゴミムシ
Distr.—Japan proper, Korea, China, Formosa.

Harpalus capito, Morawitz オホゴモクムシ
Distr.—Japan proper, Korea, Siberia, Formosa.

Pullus dorcatomoides, Weise ツマアカヒメテントウ
Distr.—Japan proper, Formosa.

Attagenus japonicus, Reitter ヒメカツヲブシムシ

Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

Dermestes tessellatocollis, Motschulsky ケアカカツヲブシムシ

Distr.—Japan proper, Korea, Siberia, Formosa.

Dermestes coarctatus, Harold トビカツヲブシムシ

Distr.—Japan proper, Formosa.

Helochares striatus, Sharp チビガムシ

Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.

?Melanotus legatus, Candèze クシコメツキ

Distr.—Kurile, Japan proper, Korea, Formosa?

?Melanotus elythrophygus, Candèze コガタノコメツキ

Distr.—Japan proper, Formosa.

?Metademius tabacci, Matsumura タバコカツコウ

Distr.—Formosa.

?Aeolesthes holosericea, Fabricius タイワンビロドカミキリ

Distr.—India, China, Formosa.

Phaedon brassicae, Baly ダイコハムシ (サルハムシ)

Distr.—Japan proper, Formosa.

Rhaphidopalpa femoralis, Motschulsky ウリハムシ

Distr.—Japan proper, China, Formosa?

Lema lewisi, Baly レビスクビホソハムシ

Distr.—Japan proper, Formosa?

Luperodes quadriguttatus, Motschulsky カタホシウリハムシ

Distr.—Japan proper, Formosa.

Pagria flavopustulata, Baly クロバサルハムシ

Distr.—Japan proper, Formosa.

Paraulaca quadriplagiata, Baly ヨツボシハムシ

Distr.—Japan proper, Formosa.

Penclitena fulminans, Faldermann ジウジハムシ

Distr.—China, Formosa.

Eobia ambusta, Lewis ヴゲロカミキリモドキ

Distr.—Japan (Kiushiu), Loo-Choo, Formosa.

Mimela lucidula, Hope コガネムシ

Distr.—Japan proper, Loo-Choo, Korea, Formosa, China.

Miwa, Y.—An enumeration of the Coprophagid-Coleoptera from Formosa, with a table of the geographical distribution.
(Ins. Mats. IV., No. 4, pp. 163-180, 1931).

——— On the Tenebrionidae from Formosa.
(Kontyû, V., No. 1, pp. 17-28, 1931).

——— 臺灣產甲蟲雜記 (Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXI., No. 114, pp. 185-188, 1931).

——— 同　上 (3) (ibid., No. 116, pp. 300-302).

Gonocephalum plonotum, Walker ホソスナモグリ Hab.—Hori.

G. aequatoriale, Blanchard コムネスナモグリ Hab.—Kôshun, Kôtôsho.

G. subspinosum, Fairmaire ヘリウススナモグリ Hab.—Hori.

Platydema tricuspis, Motschulsky アカアシモグリゴミダマシ Hab.—Shinchiku.

P. detersum, Walker ヒラタモグリゴミダマシ Hab.—Shinchiku.

P. chalceum, Gebien ルリツヤゴミダマシ Hab.—Musha.

Ceropria sulcifrons, Harold アヤセマルゴミダマシ Hab.—Hori.

C. subocellata, Casternau & Brulle スヂブトアヤゴミダマシ Hab.—Hori.

Alphitobius laevigatus, Fabricius ホソヒゲゴミダマシ Hab.—Hori.

Triborium castaneum, Herbst コクヌストモドキ Hab.—Taihoku.

Anthracias tenuis, FAIRMAIRE タイトウホソゴミダマシ Hab.—Taitô.
Hemicera zigzaga, MARSEUL ヤマトアヤキマワリモドキ Hab.—Hori.
Campsiomorpha imperialis var. **formosana,** PIC=*Camaria spectabilis* in Formosa.
Misolampidius clavicrus, MARSEUL クビナガキマワリモドキ Hab.—Musha.
Ophthalmaia quadrimaculata, GEBIEN ヨツモンチビゴミダマシ Hab.—Shinchiku.

OLIVIER, E.—Déscriptions de Lampyrides nouveaux (*Col.*).
(Bull. Soc. Ent. Fr., p. 286, 1910).

WATERHOUSE, C. O.—Characters of new Species of Dryops from Formosa (*Coleoptera: Parnidae*).
(Ann. Mag. Nat. Hist. (5) I., p. 491, 1878).

YOKOYAMA, K.—Coleoptera of Japan (日本の甲蟲及續日本の甲蟲) (1930 & 1931).
Calleida onoba, BATES アヲアトキリゴミムシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Bembidion adustum, SCHAUM ツマキミヅギハゴミムシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Chlaenius costiger, CHAUDOIR スヂアヲゴミムシ
Distr.—Japan proper, Korea, Formosa.
Ilybius apicalis, SHARP スナムグリゲンゴロウ
Distr.—Saghalien, Japan proper, Korea, China, Formosa.
Orectochilus punctipennis, SHARP コオナガミヅスマシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Creophilus maxillosus, LINNÉ オホハネカクシ
Distr.—Saghalien, Japan proper, Formosa.
?Paederus idea, LEWIS アヲバアリガタハネカクシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Cucujus mniszechii, FAIRMAIRE ルリヒラタムシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Xanthochroa waterhousei, HAROLD アヲカミキリダマシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Cryptocephalus approximatus, BALY バラルリハムシ
Distr.—Amur, Manchuria, Korea, Japan proper, Formosa.
Adoxus japanus, MOTSCHULSKY トビサルハムシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Purpuricenus temminckii, GUÉRIN-MÉNÉVILLE ベニカミキリ
Distr.—Japan proper, Formosa, China.
Eutetrapha variicornis, BATES シナカミキリ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Baris deplanata, ROELOFS ヒメザウムシ
Distr.—Japan proper, Formosa.
Cryphalus exignus, BRANDFORD クハヒメコシンクヒ
Distr.—Japan proper, Formosa.
?Aphodius solskyi, HARLD マグソコガネ
Distr.—Siberia, Japan proper, Formosa.

YOSHIDA, T.—Classification of Formosan Prioninae (*Col.: Cerambycidae*)
(Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, XXI., No. 116, pp. 266-279, 1931).
Megopis (Aegosoma) sinica cornicula, n. subsp. p. 273, 279, Hab.—Rito-zan.
Macrotoma (Zooblax) crenata, FABRICIUS
Syst. El. II., p. 264, (1801).
Loc. Distr.—Arisan, Tainan.
Gen. Distr.—India, Ceylon, Burma, China, Formosa.

IV. 學 名 索 引

INDEX TO SCIENTIFIC NAMES

A

PAGE.

abbreviatus 39
abdominale 31
abdominalis 168
abnormale 95
abnormalis 168
abnormipes 168
ABRAEINAE 50
ABRAEUS 51
ABRYNA 206
absimilis 145
abstersus 12
ACANTHOCININI 212
acastus 125
accensa 100
ACERAIUS 270
ACHRYSONINI 220
ACICNEMIS 253
ACMAEODERA 120
ACMAEODERINI 120
ACORYNUS 243
ACROTHINIUM 188
ACROTRICHIS 47
ACTOBIUS 32
acuminatum 97
acuminatus 16
acutangulus 274
acuticollis 119
acuticollis 281
acutidens 278
acutoides 214
acutus 142
ACYLOPHORUS 34
ADELOCERA 127
ademptus 182
ADERORRHINUS 264
adjutor 126

PAGE.

admirabilis 92
admotus 65
ADORETINA 300
ADORETINI 300
ADORETUS 300
ADOXUS 314
adpressus 62
adustum 314
advena 68
aedificator 203
AEGOSOMA 196, 314
aegrota 226
AEGUS 274
aenea 311
aeneipennis 32
aeneocuprea 122
aeneocuprea 122
aeneofusca 305
aenescens 58
AEOLESTHES 210, 313
AEOLODERMA 131
aequalis 6
aequalis 31
aequalis 119
aequatoriale 313
aequatus 11
aequecostatus 154
aerata 307
AESALINAE 275
AESALUS 275
aesopus 123
AETHALODES 197
aethiops 252
affinis 119
affinis 182
AGABINI 18
AGABUS 18

	PAGE.
agapanthina	210
AGELASTA	293
AGESTRATA	311
AGETOCERA	190
agilis	32
AGLAOPHIS	236
AGONISCHIUS	143
AGONUM	312
AGRILINI	122
AGRILUS	123
AGRIOTES	143
AGRIOTIDES	144
AGRYPNINAE	127
AGRYPNUS	127
AHASVERUS	68
ajax	124
akauensis	44
akonis	90
akonis	252
alaomorphus	142
ALAUS	120
ALBANA	208
albicans	132
albidiceps	117
albiguttatus	250
albinus	251
albocinctum	228
albocyanescens	1
albofasciatus	232
alboguttata	200
alboguttatus	311
albolineata	84
albolineata	292
albomaculata	204
albomaculatus	257
albomarginatus	25
alboobliquatus	2
albopicta	209
albopilosum	166
albosuturellatus	254
ALCIDES	257
ALCIDINI	257
alcyanea	220
ALEOCHARA	40
ALEOCHARAE	40
ALEOCHARINAE	36
ALEOCHARINI	40
ALESIA	87
algae	151

	PAGE.
alienum	186
ALISSONOTUM	301
ALLAEOMETRUS	238
ALLECULA	169
ALLECULODES	170
ALLOCHOTES	115
ALLOLABUS	260
ALLOTRAEUS	223
ALPHITOBIUS	157, 313
alternans	92
alternans	203
alternans	210
alternans	247
alternata	163
altestrigata	175
AMARYGMINAE	165
AMARYGMUS	165
ambigenus	198
AMBLYOPUS	70
ambusta	313
americana	77
amicus	24
AMIDA	90
amida	291
AMMOBIUS	152
AMORPHOCEPHALINI	240
amorphus	269
AMPHICROSSUS	64
amplus	61
amplus	154
AMYSTROPS	62
ANACLASIGER	44
ANACOLINI	197
ANADASTUS	74
ANAGLYMMA	58
analis	100
analis	159
analis	182
analis	189
ANAPLEUS	50
anancyloides	203
ANANESIOTES	241
ANASPIDINI	175
ANASPIS	175
ANATHESIS	131
ANATHYMUS	311
anceyi	161
ANCHASTUS	134
anchis	243

	PAGE.
ANCHISTA	11
anchoralis	4
ANCISTRIA	67
ANCISTRIINAE	67
ANCYCLONOTINI	203
ANCYLOPUS	82
ANCYRONA	59
andamanensis	72
ANEMIA	152
anguicornis	280
angulata	3
angulaticeps	238
angulatus	137
angulatus	271
angulatus	280
anguliceps	178
anguliceps	280
angusta	195
angusta	200
angusta	207
angustata	64
angustatus	143
angustior	74
angustipennis	246
anisocera	167
ANISOMERISTES	48
ANISOSTRIA	168
annularis	233
annulicorne	201
annuliventris	38
ANOCERINAE	248
ANOMALA	294
ANOMALINA	294
ANOMALINI	294
ANOMALOPHYLLA	290
ANOMOGNATHUS	37
anpingensis	136
antennalis	40
antennata	196
antennatus	17
antennatus	31
antennatus	197
anteplagiata	311
ANTHAXIA	122
ANTHICOCLERUS	114
anthicoides	114
ANTHICUS	181
ANTHRACIAS	162, 314
ANTHRACOPHORA	309
ANTHRENINAE	93
ANTHRENUS	93
anticemaculata	234
antiqua	148
anulicornis	214
AORIA	187
APALIMNA	203
APATENIA	244
APHANOBIUS	142
APHARINA	43
APHODIINAE	283
APHODIINI	283
APHODIUS	283, 314
APHRODISIUM	229
apicale	225
apicalis	176
apicalis	304
apicalis	314
apicata	71
apicipennis	109
APION	259
APIONINI	259
aplota	245
APOBLETES	55
APODERINI	262
APODERUS	262
APOGONIA	291
APOLECTA	248
APOMECYNA	209
APOMECYNINI	209
APOPHYLIA	191
APOTOMOPTERUS	5
approximatus	314
APRIONA	202
APROSTERNA	297
aptera	1
ARAECERUS	248
araneiforme	259
araneipes	235
arcuata	84
argenteus	123
argillaceus	129
agyropygus	282
argus	233
ARIARATHUS	161
arisana	71
arisanum	219
arisanum	231
arisanus	141

PAGE.
arisanus 145
ARISTOBIA 200
ARMATOCILLENUS 7
armatus 37
armatus 280
ARNYLLIUM 42
AROMIA 229
ARRHAPHES 134
ARRHENODINI 240
arrowi 270
arrowi 287
ARTACTES 163
ARTHROMACRA 168
ASAMANGULIA 193
ASAPERDA 210
ASAPHEPTERUM 238
ASCLERA 173
ASCLERINI 172
ASEMINI 219
ASEMORHINUS 242
ASEMUM 219
ASEMUS 311
ashinagazo 258
asiatica 40
asiaticum 223
asiaticus 238
asiaticus 279
ASOSYLUS 79
asperatus 152
aspersa 202
ASPIDIMERUS 87
ASPIDOBYCTISCUS 266
ASPIDOMORPHA 194
assamensis 277
assimilis 214
ASTATHES 218
ASTENUS 27
ASTILBUS 39
ASYMBIUS 80
ATENISODUS 42
ater 280, 311
ATHETA 38
ATHETAE 38
ATHOINAE 140
ATHOLUS 57
ATHOUS 140
ATIMURA 210
ATRACTOCERUS 110
atratus 54

PAGE.
atriceps 153
ATRICHONOTA 82
atricollis 106
atricolor 104
atripennis 71
atripennis 108
atripennis 110
atripennis 213
atrithorax 169
atrithorax 232
ATTAGENUS 312
ATTALUS 108
ATTELABINI 259
ATTENUATA 97
AULACOCHILUS 69
AULACONOTUS 211
aulax 296
AULETINI 264
AULETOBIUS 264
auracoides 295
auratus 130
auricolor 146
auriculatus 252
auripennis 222
auripilosa 45
auriventris 126
auropictus 124
aurora 304
aurulenta 3
australasiae 284
australis 20
AUTONOPIS 256
AUTOSERICA 289
axyrides 86
axyridis 86
AZARELIUS 167

B

BACANIUS 50
bacchus 125
baculina 210
badia 296
badiipennis 139
BADISTER 13
baibaranus 137
bajulus 122
BALANINI 254
BALANININA 254

	PAGE.
BALANINUS	254
BALISTICA	148
balyi	192
BARALIPTON	196
barbatum	223
barberi	290
BARIINI	253
BARIS	253, 314
BARYRRHYNCHUS	241
basalis	32
basalis	222
basalis	233
BASANOPSIS	156
BASILEPTA	187
basilineatus	311
BASITROPIS	247
batesi	3
batesi	155
batesi	231
BATRAXIS	42
BATRIBORBUS	42
BATRISINI	41
BATRISOCENUS	41
BATRISODES	41
BATOCERA	201
BATOCERINI	201
bealiae	312
BELIONOTA	122
bellula	73
BELONUCHUS	33
BELOPHERINI	241
BEMBIDION	7, 314
bengalensis	70
BEROSINI	97
BEROSUS	97
berus	130
beryllinus	200
biangulata	9
biarcuata	253
bicarinatus	133
bickhardti	253
bicolor	28
bicolor	39
bicolor	107
bicolor	161
bicolor	189
bicolor	192
bicolor	216
bicolor	230

	PAGE.
bicolor	270
bicolor	290
bicoloripes	110
bicoloripes	112
bicoloripes	216
bicornis	25
bicuspis	119
bicuspis	243
BIDESSUS	17
bidentatus	37
bifasciana	212
bifasciatus	301
bifossulatus	80
bifoveatus	8
bilamellata	170
bilineatus	108
bilobicollis	240
bilobus	204
bimaculata	107
bimaculata	200
bimaculatum	229
bimaculatus	27
bimaculatus	46
bimaculatus	94
bimaculatus	109
bimaculatus	132
bimaculatus	199
bimaculicollis	234
birmanicus	239
bina	171
binodosa	206
binodosus	197
binodulus	275
binotata	11
binotaticollis	216
biocellatus	205
bioculata	15
bioculata	198
bipapulatus	128
biplagiata	85
biplagiata	100
biplagiatus	272
bipunctatum	176
bipunctatus	255
bipustulatus	252
birmanicus	67
birmanicus	112
birmanicus	239
bispinicollis	132

	PAGE.
bispinosus	254
bispinosus	260
bissexsignatus	186
bisulcatus	239
bisulcatus	265
BITOMA	78
bituberculatus	80
bivittatus	35
blanchardi	272
BLAPTINAE	149
BLAPS	149
BLEDIUS	25
BLEPEPHAEUS	201
bohemani	194
BOLBOCERAS	275
BOLBOCERINI	275
BOLBOCEROSOMA	276
BOLBORESTHES	170
BOLBOTRYPES	276
boleti	56
BOLITOBIINI	34
BOLITOBIUS	34
BOLITOCHARAE	37
BOLITOCHARINI	36
BOLITOPHAGINAE	153
BOLITRIUM	158
bonvouloiri	146
bonzicus	51
BORBORESTHES	170
borealis	8
boreti	56
BOROLINUS	22
BOSTRYCHOPSIS	119
BOTHRIDERES	80
BOTHRIDERINI	80
BOTRYONOPA	192
bourgoini	302
bowringi	9
bowringi	43
bowringi	187
bowringi	188
bowringi	235
bowringi	301
bowringi	302
bowringi	277
brachialis	262
BRACHICHILA	11
BRACHIDA	36
brachmana	131
BRACHYGLUTINI	42
BRACHYNUS	11
BRACHYPEPLUS	61
brachys	8
BRACHYTRYCHERUS	81
BRADYCELLUS	14
BRADYMERUS	153
brahminus	132
braminus	180
BRAPS	149
brassicae	313
brettinghamae	6
breviceps	238
brevilineatus	104
brevinotatus	104
brevipennis	227
brevipes	28
brevis	247
breviscapus	254
brevitarsis	307
brevithorax	190
BROSCOSOMA	7
BRUCHUS	182
brucki	83
brunneicollis	46
brunneipennis	145
brunnescens	89
brunneus	120
brunneus	144
brunneus	251
bukleyi	208
BULENIDES	105
bullatum	58
BUMETOPIA	205
BUPRESTINI	121
buqueti	232
BYCTISCINI	265
BYRRHINUS	94

C

	PAGE.
CACCOBIUS	280
CACCORHINUS	247
CACIA	202
cadaverinus	93
CAEDIUS	152
CAENOLANGURIA	75
caenonus	243
CAENORYCHODES	312

	PAGE.
caeruleipennis	262
caesicollis	248
CAGOSHIMA	213
CALANDRA	256
CALANDRINI	256, 311
calanus	276
CALLEIDA	314
callicantus	193
CALLICHROMA	229
CALLICHROMINI	228
callichromus	166
CALLIDIINI	231
CALLIDIOPINI	223
CALLIDIUM	231
CALLILANGURIA	74
CALLIMERUS	112
CALLIPOGONINI	196
CALLIRRHIPIS	148
callizonus	233
CALLYNOMES	310, 311
CALOCHROMUS	102
CALODERA	40
CALODERAE	40
CALODROMINI	237
CALODROMUS	237
CALOMYCTERUS	251
CALOPOTOSIA	307
CALOSIRPHA	46
CALOSOMA	4
calybaeus	61
calypso	87
CAMARIA	164
cambodiensis	132
cambodjensis	54
cameratus	285
CAMPSIOMORPHA	314
CAMPSIVRA	310
CAMPSOLACON	129
CAMPSOSTERNUS	130
CAMPTOMYNE	212
CAMPTOSOMES	185
canalicollis	58
canaliculata	294
canaliculatus	239
canalifrons	50
cancellata	4
candezei	110
candezellus	144
canoixoides	251
CANTHARIS	98
CANTHYDRUS	16
cantori	221
capillatus	254
capitalis	75
capito	13
capito	211
capito	312
CAPRONINUS	254
capucinus	119
CARABINAE	4
CARABUS	5
carbonarium	166
CARCILIA	311
CARCINOPISTHIUS	240, 312
CARCINOPS	52
cardinalis	91
cardinalis	257
CARDIOHYPNUS	137
CARDIOPHORINAE	135
CARDIOPHORUS	136
CARDIOTARSUS	135
carduelis	137
carenifrons	69
carinatus	54
carinatus	154
carinatus	272
carinicephalus	142
cariniceps	279
carinicollis	220
carinifrons	113
carinifrons	179
carinipennis	118
carinula	162
carinulatus	284
carolina	198
CARPHURUS	109
CARPOPHILINAE	61
CARPOPHILUS	61
carnivorus	92
cashmirensis	143
CASSIDA	195
CASSIDINAE	194
castanea	6
castanea	174
castaneoventris	297
castaneum	313
castaneus	48
castaneus	137

	PAGE.
castaneus	145
castanicolor	48
casternaui	134
CATALABUS	260
CATAPIESTUS	161
CATASCOPUS	11
catena	309
CATHARSIUS	278
CATOPINAE	47
CATOPINI	47
caudata	207
CAUTIRES	105
cavernosus	43
cavifrons	21
cavifrons	161
CEBRIORHIPIS	149
CEDUS	244
celatum	53
CELOSTERNA	200
centricornis	282
CENTROCORYNUS	263
CENTROPHTHALMUS	44
CENTRURA	197
CEPHALOBYRRHUS	94
cephalotes	159
cephalotes	178
CERACUPES	270
ceramboides	113
CERAMBYCINAE	219
CERAMBYCINI	220
CERAMBYX	221
cerata	102
CERATIA	189
CERCIDOCERUS	311
CERCYON	96
CERCYONINI	96
CEREOPSIUS	201
CERESIUM	224
CEROBATES	239
CEROGRIA	167
CEROPRIA	156, 313
certus	106
cervinus	199
CERYLONINAE	79
cerylonoides	55
CETONIA	307
CETONIINA	307
CETONIINAE	302
CETONIINI	307
CETONISCHEMA	308
CEUTHORRHYNCHINI	253
ceylanense	30
ceylanensis	28
ceylonica	36
ceylonica	47
ceylonica	91
ceylonicus	77
CHAETADORETUS	300
chalceum	313
chalcoides	298
CHALCOLEPIDIINAE	130
CHALCOPHORA	121
CHALCOPHORINI	121
chalcosoma	186
championi	271
CHEIROTONUS	294
CHELIDONIUM	230
CHELONARIUM	94
CHELORHINUS	237
CHENORYCHODES	241
chevrolati	99
chibizo	258
CHILOCORUS	87
CHILOMENES	84
chinensis	16
chinensis	29
chinensis	56
chinensis	86
chinensis	101
chinensis	121
chinensis	121
chinensis	153
chinensis	172
chinensis	177
chinensis	183
chinensis	194
chinensis	199
chinensis	232
chinensis	260
chinensis	383
chinensis	285
chinensis	301
CHIROZETES	311
CHLAENIUS	11, 314
CHLAMYDINAE	186
CHLAMYS	186
CHLORIDOLUM	229
chlorion	209

	PAGE.
CHLOROPHANUS	249
CHLOROPHORUS	233
chlorospila	214
CHOEROMORPHA	203
CHOLLIDES	196
CHREONOMA	219
chroloticus	27
CHROMOVALGUS	302
CHRYSOBOTHRINI	122
CHRYSOBOTHRIS	122
CHRYSOBRACTEON	7
CHRYSOCHROA	120
CHRYSOCHROINI	120
chrysocomus	147
CHRYSODEMA	121
chrysomaculata	215
CHRYSOMELA	188
CHRYSOMELINA	188
chrysomeloides	189
chrysothrix	220
chrysura	287
cichorii	176
CICINDELA	2, 311
CICINDELINA	2
CICINDELINAE	1
CICINDELINI	1
ciliatum	42
cilo	240
cimicoides	23
cincta	84
cinereus	257
cinnyris	230
ciprinus	137
circularis	58
circumcinctus	33
circumdactus	12
circumdata	194
circumdatus	249
circumscriptus	234
circumusta	86
CIS	120
CISSITES	178
CISTELINA	171
CISTELOMORPHA	171
citrinipes	213
citrinus	101
CLADISCUS	112
CLADOGNATHINAE	272
CLADOPHORUS	106
CLADOXENINAE	76
clarus	204
clathratus	183
clauda	166
clavicornis	2
clavicrus	314
clavigera	224
CLAVIGERINAE	44
CLEOMENIDA	236
CLEOMENINI	236
CLEONINI	252
CLEORINA	188
CLERINAE	111
CLERINI	113
cleroides	208
cleroides	248
CLINTERIA	305
CLINTERIIDES	305
CLITENELLA	312
CLITINI	232
CLIVINA	6
closteroides	196
clytellus	236
CLYTRA	185
CLYTRASOMA	185
CLYTRINAE	185
CLYTUS	233
CNEGLOSSINI	110
CNEOCNEMIS	158
CNEORANE	190
CNEORRHININI	248
CNODALONINAE	163
coarctatus	313
coccinatus	65
coccinea	40
COCCINELLA	83
coccinellina	83
coccineus	226
coelaris	266
coelestinus	14
coelestis	42
coelestis	57
COELODERA	305
COELOPHORA	85
COELOSTOMA	95
coenosa	206
coeruleipennis	262
coerulescens	298
coeruleus	118

	PAGE.
cognata	168
COLASPOSOMA	187
collaris	73
colligens	246
COLLYRINI	1
COLLYRIS	1
COLOBORHOMEUS	228
COLOBICUS	78
colombius	53
coloratus	147
COLPODES	14
COLYDIINAE	78
COLYMBETINAE	17
comes	218
comitata	16
communis	243
composita	174
compressicornis	39
COMPSOCERINI	231
comptus	8
comptus	136
comptus	183
CONAPION	259
concinnulus	68
concinua	37
concolor	27
concolor	47
concolor	147
confertus	29
confluens	294
confucii	53
confucii	181
confucius	255
confusius	278
congener	56
congestus	18
conglobata	84
congruus	110
conicicollis	43
conicollis	31
conjuncta	215
CONODELINAE	131
CONOSOMA	34
consanguinea	63
conspicua	2
consularis	253
contemtus	89
contemtus	199
contingens	62
contortus	232
conuiva	231
convexus	286
convexus	300
coomani	137
COPELATINI	17
COPELATUS	17
COPRINAE	276
COPRINI	277
COPRIS	278
COPROPORUS	35
COPTENGIS	71
COPTOCEPHALA	185
COPTODERA	11
COPTOLABRUS	5
COPTOPS	203
CORAEBUS	122
corallinus	236
coreanus	276
coriaceum	152
coriaria	152
CORIGETUS	251
cornicula	314
cornutus	159
coronata	184
corpulentina	193
corrugata	296
CORTICARIA	77
CORYMBITES	141
CORYMBITINAE	141
CORYNETES	116
CORYNETINAE	115
CORYNETINI	116
CORYNODES	188
COSMIOMORPHA	303
COSMOPOLITES	256
COSSYPHINAE	160
COSSYPHUS	160
costata	190
costata	197
costatulus	285
costatus	80
costiger	314
costigera	310
costipennis	102
cothurnata	178
coxalis	27
COXELINI	79
CRANIODICTICUS	268

	PAGE.
CRASPEDONOTUS	7
crassicornis	23
crassicornis	24
crassicornis	172
crassifemoralis	239
crassipes	151
crassiuscula	36
crassus	103
CREMASTOCHILIA	310
CREMASTOCHILINI	310
CREMNOSTETHUS	138
crenata	150
crenata	314
crenatus	271
crenatus	285
crenicollis	65
crenulicolle	158
CREOPHILUS	314
CREPIDACTYLA	14
cribratus	300
cribriceps	180
cribricollis	249
cribropygum	54
crinipes	80
crinitus	181
CRIOCEPHALUS	219
CRIOCERINAE	184
CROSSOCELIS	166
CROSSOGLOSSA	15
CROSSOTARSUS	266
cruciata	240
crucifera	309
cruenta	70
cruralis	41
cruralis	170
crussum	301
CRYPHALUS	314
CRYPTARCHINAE	65
CRYPTICINAE	153
CRYPTICUS	153
CRYPTOCEPHALINAE	185
CRYPTOCEPHALUS	185, 314
CRYPTODERMA	257
CRYPTODERMINI	257
cryptohypnoidus	135
CRYPTOLAEMUS	88
CRYPTOPHILUS	77
CRYPTOPLEURUM	96
CRYPTORRHYNCHINI	311
CRYPTOSTOMES	192
CRYTOBIUM	30
CSIKIA	141
CTENIOPINUS	171, 311
CTENISOPHUS	43
CTENISTINI	43
ctessias	125
CUCUJINAE	65
CUCUJUS	65, 314
culminatus	12
culta	308
CUPES	21
cuprarius	165
cupreosplendens	121
cupreipes	301
cupripes	297
cupripes	298
cursitans	47
curteapicalis	175
curticornis	172
curticornis	228
CURTOS	102
curvatipes	98
curvatofasciatus	234
curvicollis	57
curvipes	156
cyaneocephala	15
cyaneocephala	46
cyaneocincta	46
cyaneolimbatus	163
cyaneus	111
cyanicollis	299
cyanoptera	218
CYBISTER	18
CYBISTERINI	18
CYCLICA	186
CYCLOMMATUS	272
cyclonotus	50
cyclops	15
CYCLOTOMA	83
CYCNOTRACHELUS	263
CYLAS	258
CYLIDRUS	111
CYLINDREPOMUS	204
cylindricus	154
cylindriformis	3
CYLISTOSOMA	55
CYLLODES	64
CYMINDIS	15

PAGE.
CYPHAGOGUS 237
CYPHALEINAE 163
CYPHOCHILUS 291
CYPHON 111
CYPTURUS 58
CYRIOGETON 165
CYRTANASPIS 175
CYRTOMORPHUS 70
CYRTONOPS 219
CYRTONOTUS 14

D

DACININI 71
DACTYLIPALPUS 268
DACTYLISPA 193
DACTYLOSTERNUM 95
daimio 312
dama 282
DAMASTER 5
DANAE 82
dapcauensis 283
DAPHISIA 216
DASCILLINAE 110
DASCILLINI 110
DASCILLUS 110
DASYCETOCLERUS 114
DASYLINDA 218
davidi 129
davidi 187
davidi 276
davidi 278
davidi 311
davidis 103
davidis 202
davidis 310
debilicornis 29
debilis 103
decemguttata 3
decemguttata 92
decempunctata 189
decempunctata 213
decempunctatus 18
decipiens 225
decolor 8
decolorata 201
definitus 254
dejeani 13
delauneyi 287
PAGE.
delavayi 149
delicatula 206
delicatulus 103
deliciolus 12
DELOYALA 195
DEMONAX 235
DENDROCELLUS 10
DENDROPHILINAE 52
DENDROPHILUS 52
DENDROTROGUS 246
densus 22
dentatus 270
DENTICOLLINAE 146
DENTICOLLIS 146
dentifrons 277
dentirostris 311
depistor 57
deplanata 314
DEPORAUS 265
depressa 49
depressa 179
depressum 152
depressus 158
depressus 160
DERCETES 191
DERE 236
DERETAPHRINI 79
DERMATOXENUS 248
DERMESTES 92, 313
DERMESTINAE 92
DEROPYGAS 248
DEROSPHAERUS 160
DESERA 10
desjardinsi 81
despectus 268
detersum 313
deusta 107
devastans 136
devastata 3
DIACLINA 158
DIALEGES 222
DIAMESUS 46
DIAPERINAE 154
diaperinus 157
DIAPERIS 154
DIAPHANES 101
DIAPUS 268
DIATELIUM 48
DIAUGIS 41

	PAGE.
DIBELONETES	27
DICELOSTERNUS	236
DICHELOMORPHA	287
dichotomus	300
dicksoni	94
DICLEPIDIINAE	131
DICRAEOSIS	154
DICRANOCEPHALUS	302
DICTYOTOPTERUS	238
didymus	248
dificilis	113
DIHAMMATUS	104
DIHAMMUS	199
DILOPHOTES	106
dilutipennis	38
dilutum	36
dilutus	30
dilutus	303
dimatoides	141
dimidiata	38
dimidiata	229
dimidiata	237
dimidiatum	95
dimidiatus	61
dimidiatus	62
DINEUTES	20
DINODERUS	118
DIOCHARES	198
DIOCHUS	31
DIOMUS	90
dionea	84
DIORYCHE	10
DIPHYLLUS	76
DIRECTARIUS	245
DIRHAGINAE	148
DIRHAGUS	148
discedens	190
DISCHISSUS	13
discicollis	124
discoidalis	34
discoidalis	68
discoidalis	157
discoidalis	244
discolor	64
discolor	87
discors	240
dissimilis	148
DISTENINI	219
distenoides	226
distinctus	248
distinctus	264
DITONEUES	105
DIURUS	242
diversenotata	215
diversepunctatus	181
diversicollis	105
diversicolor	301
diversipes	114
diversus	214
dives	3
dives	164
dochroa	115
dohrni	9
DOLICAON	30
DOLICHOCTIS	12
DOLIEMA	159
dolosa	103
dominator	103
dominicana	120
dönitzi	7
DORCASCHEMATINI	204
DORCATOMA	118
dorcatomoides	312
DORCINAE	273
DORCUDIONINI	197
DORCUS	273
DORMAEOLUS	147
dorsalis	64
dorsalis	183
dorsalis	209
DORYSTHENES	196
douei	234
DRILOSILIS	109
DRYPTA	15
dubia	39
duodecimpustulatus	113
duodecimstriatus	57
DURBOS	44
dux	82
DYNASTINAE	300
dyptychus	134
dysallus	243
DYTISCINAE	18

E

	PAGE.
ebeninus	139
eburifera	223

	PAGE.
ECHIASTER	28
ECHINOCNEMUS	255
ECHTHISTATUS	197
ECTINOHOPLIA	287
edentula	141
edentula	296
ELATER	132
ELATERINAE	132
elegans	60
elegans	137
elegans	138
elegans	285
elegans	311
elegantula	235
elegantula	288
elegantulus	16[illegible]
ELESII	22
ELEUSIS	22
elisae	3
ellipticus	219
elongata	9
elongata	49
elongata	73
elongaticeps	259
elongatulus	285
elongatum	151
elongatus	21
elongatus	130
elysii	5
ely[illegible]ropygus	313
emarginata	67
emarginatus	287
ENCAUSTES	70
ENCAUSTINI	70
ENCYALESTHES	160
ENCYCLOPINI	226
ENDELUS	126
ENDOMYCHINAE	81
ENDOMYCHINI	83
endomychoides	71
ENHYDRINAE	20
ENISPIA	208
ENNOMETES	148
ENOCHRUS	97
ENOPLIINI	115
EOBIA	172, 313
EOPHILEURUS	301
EOPORIMIMUS	212
EPANIA	227

	PAGE.
EPHIES	226
EPICAUTA	177
EPICEDIA	198
EPIERUS	53
EPIGLENEA	218
EPILACHNA	91
EPILICAS	110
EPIPEDOCERA	236
EPISCAPHA	72
EPISCAPHIUM	48
EPISCAPHULA	72
epipleuralis	189
episcopalis	218
EPISOMINI	250
EPISOMOIDES	251
EPISOMUS	250
EPURAEA	63
epuraeoides	62
ERETES	18
ERETINI	18
erichsoni	312
ERIRHINI	255
EROTYLATHRIS	80
EROTYLINI	69
EROSCHEMINI	227
erro	257
erubescens	297
erubescens	311
ERYCAPODERUS	262
erythrocephalum	166
erythropterus	265
ERYTHRUS	228
eschscholtzi	141
EUBRIANAX	110
EUBRIINAE	110
EUCETONIA	307
EUCHIRINAE	294
EUCHLORA	297
EUCHLOROPUS	303
EUCNEMINAE	146
EUCOMATOCERA	212
EUCONNUS	44
EUCTEANUS	83
EUCYRTUS	163
eucides	8
EUGNAMPTUS	264
EUGNATHUS	248
EULICHAS	110
EUMORPHINI	81

PAGE.
EUMORPHUS 81
EUMORPINAE 186
EUOPINI 260
EUOPS 260
EUPODES 184
EUPROMUS 200
EUPYROCHROA 178
EURHYNCHINI 258
EURYARTHRUM 228
EURYBATUS 231
EURYPODA 196
EURYTRACHELUS 273
EUSEBOIDES 205
EUSELATES 306
EUSILPHA 46
EUSTEMMUS 45
EUSTRA 6
EUSTRANGALIA 226
EUTAENIA 201
EUTETRAPHA 213, 314
EUTHICUS 311
EUTOCHIA 157
EUXESTINAE 80
EUXESTUS 80
excisa 157
excisipes 298
excisus 311
excultus 235
exignus 314
exilis 158
EXILLIS 247
EXOCENTRUS 212
EXOSTERNINI 58
exoticus 219
expansa 298
explanaticollis 99
exsanguis 101
extensa 311
externe-dentatus 266
exularis 160
ezakii 294

F

fabricii 18
fagi 68
fainana 98
fainanense 49
fainanensis 99
fainanensis 105
fainanensis 178
fainanensis 185
fainanensis 206
fainanensis 234
fairmairei 97
FALAGRIAE 37
FALAGLA 37
falcatus 279
faldermanni 228
fallaciosa 122
fallax 92
FALSOGASTRALLUS 118
famelica 288
famelica 308
fasciata 77
fasciata 208
fasciatus 243
fasciculatus 248
fascinatus 242
fasciolata 296
fastigata 244
feae 59
femoralis 265
femoralis 313
femorata 218
femoratus 11
ferriei 270
ferruginea 308
ferrugineum 96
ferrugineum 151
ferrugineum 158
ferrugineum 176
ferrugineus 23
ferrugineus 66
ferrugineus 256
FIGULINAE 274
FIGULUS 275
filiformis 75
filiformis 102
filiformis 211
filum 159
fimbriatum 34
fischeri 195
flabellata 176
flabellatus 103
flava 146
flavicans 97
flauiceps 126

PAGE.

flaviceps 262
flavicollis 107
flavicornis 35
flavipennis 31
flavipes 82
flavipes 119
flavipes 168
flavipes 180
flavipes 224
flavitarsis 229
flaviventris 191
flavocinctus 32
flavofasciata 294
flavofasciata 305
flavoguttata 198
flavomaculatus 2
flavopictum 155
flavopictus 34
flavopustulata 313
flavotuberosus 263
flavus 16
flexuosus 76
floralis 181
florilega 172
formicarius 258
formicatus 269
FORMICONUS 180, 312
formosa 231
formosa 312
formosae 23
formosae 25
formosae 26
formosae 27
formosae 32
formosae 35
formosae 36
formosae 194
formosae 274
formosae 289
formosana 1
formosana 10
formosana 11
formosana 14
formosana 16
formosana 62
formosana 87
formosana 90
formosana 92
formosana 99

PAGE.

formosana 100
formosana 101
formosana 127
formosana 137
formosana 144
formosana 148
formosana 156
formosana 170
formosana 171
formosana 172
formosana 173
formosana 174
formosana 175
formosana 182
formosana 185
formosana 186
formosana 188
formosana 193
formosana 201
formosana 202
formosana 203
formosana 206
formosana 207
formosana 208
formosana 209
formosana 211
formosana 215
formosana 216
formosana 217
formosana 218
formosana 221
formosana 227
formosana 256
formosana 287
formosana 288
formosana 291
formosana 292
formosana 293
formosana 294
formosana 298
formosana 299
formosana 304
formosana 305
formosana 305
formosana 306
formosana 307
formosana 308
formosana 314
formosanae 190

PAGE.

formosanum 48
formosanum 58
formosanum 116
formosanum 166
formosanum 238
formosanum 259
formosanus 5
formosanus 7
formosanus 9
formosanus 10
formosanus 21
formosanus 35
formosanus 45
formosanus 66
formosanus 75
formosanus 81
formosanus 91
formosanus 93
formosanus 103
formosanus 104
formosanus 106
formosanus 111
formosanus 113
formosanus 115
formosanus 123
formosanus 127
formosanus 129
formosanus 131
formosanus 136
formosanus 140
formosanus 144
formosanus 151
formosanus 155
formosanus 165
formosanus 167
formosanus 169
formosanus 179
formosanus 180
formosanus 182
formosanus 184
formosanus 193
formosanus 197
formosanus 203
formosanus 204
formosanus 225
formosanus 227
formosanus 228
formosanus 233
formosanus 239

PAGE.

formosanus 240
formosanus 246
formosanus 247
formosanus 251
formosanus 259
formosanus 263
formosanus 264
formosanus 266
formosanus 267
formosanus 268
formosanus 270
formosanus 272
formosanus 273
formosanus 274
formosanus 276
formosanus 281
formosanus 292
formosanus 294
formosanus 300
formosanus 302
formosanus 311
formosanus 312
formosanus 314
formosensis 132
formosensis 141
formosensis 168
formosensis 177
formosensis 258
formosianus 76
formosicola 259
formosum 50
formosus 21
formosus 101
formosus 164
FORMOSOGALERUCELLA 190
FORNAX 147
forticula 310
fortunei 72
fortunei 130
fortunei 184
fortunei 219
fortunei 228
fortunei 257
foveatus 272
foveicollis 61
foveicollis 311
foveifrons 107
foveolatus 66
fragilis 25

PAGE.

fraterna 37
fraterna 218
fraudator 199
frequens 138
fricator 216
frontalis 245
fruhstorferi 2
fulgidissima 120
fuliginosa 4
fuliginosa 169
fuliginosus 170
fuliginosus 233
fulminans 190
fulminans 312
fulminans 313
fulva 210
fulveola 216
fulvidus 221
fulvipes 183
fulvistemma 309
fulvopilosa 304
fumatus 13
funebris 110
funereus 61
fungi 38
funginum 161
fungorum 58
fur 117
furcata 194
furcata 206
furcatus 34
fusca 295
fuscicollis 10
fuscipennis 39
fuscipennis 217
fuscipes 27
fuscipes 141
fuscipes 312
fuscoaenescens 165
fuscoviolacea 308
fuscula 77
fuscus 139
fuscus 143
fusiforme 7
futahoshii 90

G

GALERITA 14
GALERUCINAE 189
gaschkewitchi 188
GASTRALLUS 117
GASTROCENTRUM 112
GASTROSERICA 290
GAURODYTES 18
GAUROMAIA 164
gazella 242
gazellae 162
gebleri 213
geilenkeuseri 292
gemma 130
gemmatus 261
GEMPYLODES 79
GEMPYLODINI 79
geniculata 10
geniculata 178
geniculatus 254
GEOTRUPES 276
GEOTRUPINAE 275
GEOTRUPINI 276
germari 202
gerstaeckeri 81
gestroi 104
GIBBINAE 117
GIBBIUM 117
gibbosipennis 207
gibbosus 226
gideon 300
gigantea 14
gigantulus 25
gigas 247
gilsoni 10
glechoma 216
GLENEA 214
GLENEINI 214
GLENIDA 214
GLIPA 174
GLISCHROCHILUS 65
globicollis 23
globosa 220
globulus 285
GLYCYPHANA 309
GLYCYPHANINA 308
GLYPHONYX 145
glyphysternus 172
GNAPHALORYX 274
GNATHOCERUS 159
GNATHOLEA 223

	PAGE.
GNATHONCUS	51
GNESIS	164
GNYPETA	38
GOLIATHINA	302
GOLIATHINI	302
GOMADARAEUS	251
gonager	182
GONOCEPHALUM	151, 313
GONOCNEMIS	167
gonolerus	167
gonoderus	280
gorhami	102
gorhami	177
gracilicornis	42
gracilipes	238
gracilipes	303
gracilis	144
gracilitarsis	99
grammica	245
GRAMMOSTETHUS	57
granaria	256
grande	49
grandipennis	191
grandis	85
grandis	270
GRANIDA	292
granigera	37
granulatus	276
granulipennis	133
gratus	141
grayi	91
grayi	232
grisea	307
griseopennis	217
griseosellata	179
griseostriatus	105
guerini	110
guerini	308
guttulum	255
guttulus	251
GYMNETINI	305
GYMNOGASTER	294
GYMNOPLEURUS	276
GYRININAE	20
GYRINUS	20
GYROPHAENAE	36

H

	PAGE.
haagi	78
HABRISSUS	246
haematipennis	119
haemorrhoidale	155
HALIPLUS	19
HALTICINAE	191
HALYZIA	84
hardwickeri	83
HAPTONCUS	62
HARPALINAE	7
HARPALUS	312
HECTARTHRUM	66
HECYRA	206
HECYRINI	206
helephoroides	287
helferi,	25
HELICHUS	94
HELIOCOPRIS	278
helleri	59
HELLUODES	12
HELOCHARES	97, 313
HELODINAE	111
HELOPINAE	165
HELOTA	59
helopioides	164
HEMICERA	163, 314
HEMIOPS	146
hemipterus	61
hemipterus	228
HEMIRRHIPINAE	129
HEMISODORCUS	273
HENICOLABUS	260
henrietta	202
HEPHTOPHYLLA	293
HEPTODONTA	2
HESPEROPHANES	222
HESPEROPHANUS	222
HETERAPODERUS	262
HETERASPIS	186
HETEROBOSTRYCHUS	119
HETEROCERUS	98
HETERODERES	131
HETEROGLENEA	216
HETERORRHINA	302
HETERORRHININA	302
HETEROTARSINAE	162
HETEROTARSUS	162
HETEROZEMUS	238
HEURIPPA	311
HEXAGONIA	9

	PAGE.
hexaspilota	85
higoniae	49
HIGONIUS	240
higonius	115
hilaris	198
hilleri	115
hilleriana	78
HIPPODAMIA	83
HIPPOPSINI	211
hirsutulus	232
hirsutus	270
hirsutus	286
hirsutus	300
hirticornis	177
hirtus	39
hirtus	191
hislopi	72
HISPA	193
hispida	200
HISPINAE	192
HISTER	56
HISTERINAE	53
HISTERINI	55
histeroides	209
histrio	243
HODOCERUS	147
HOLOLEPTA	49
HOLOLEPTINAE	49
HOLOLIUS	13
holoplaeum	224
holosericea,	313
holosericioides	297
HOLOSTROPHUS	173
HOLOSUS	22
HOLOTRICHIA	291
holoxantha	217
honorata	184
HOMALOSOMA	13
HOMALOTA	37
HOMALOTAE	37
HOMOCERUS	242
HOMONOEINI	205
honestus	103
hopei	273
HOPLANDRIA	39
HOPLANDRIAE	39
HOPLAPODERINI	261
HOPLAPODERUS	261
HOPLIA	288
HOPLOCERAMBYX	221
hoplocosmeta	297
HOPLOPISTHIUS	240
HOPRIINAE	287
HORATOCERA	148
horikawae	21
horishana	288
horishana	292
horishanus	88
horishanus	133
horishanus	135
horishanus	138
horishanus	237
horishensis	267
horni	32
horni	35
horni	54
horni	96
horni	123
horni	126
horni	148
horni	162
horni	193
hornianus	124
horridus	311
horsfieldi	235
horsfieldi	309
horsti	120
humerale	34
humeralis	61
humeralis	66
humeralis	135
humilis	22
HYBOCEPHALINI	43
HYBOSOMA	72
HYBOSORINAE	287
HYBOVALGUS	302
HYDATICUS	18
HYDRAENA	95
HYDRAENINAE	95
HYDROBIINI	97
HYDROCANTHINI	16
hydrophiloides	95
hydropicus	197
HYDROPORINAE	16
HYDROUS	97
HYDROVATINI	16
HYDROVATUS	16
HYDRPHILINAE	97

PAGE.

HYLESINUS 268
HYLOBIINI 311
HYLOPHILUS 179
HYMENALIA 170
HYORRHYNCHUS 268
HYPHOPORUS 17
HYPHYDRINI 17
HYPHYDRUS 17
HYPNOIDINAE 134
HYPNOIDUS 134
HYPOCACCUS 51
HYPOCESCHRUS 219
hypocrita 11
HYPOMECES 249
hypomelas 260
HYPOPHLOEUS 159
hystrix 261

I

ICHTHYURUS 108
idae 16
idea 314
IDGIA 107
ignicauda 298
igorrata 312
ILYBIUS 314
immaturus 35
immeritus 249
immite 224
imperialis 65
imperialis 314
implicita 43
impolita 101
impressicolle 301
impressicollis 23
impressicollis 58
impressicollis 99
impressus 246
inaequalis 65
inapicalis 181
incauta 92
incisus 245
inclinatus 272
inconcinna 297
incongrua 309
incurvatus 233
INDALMUS 81
indiana 83

PAGE.

indica 50
indica 91
indica 194
indicum 94
indicus 20
indicus 27
indicus 30
indicus 31
indicus 51
indicus 82
indicus 94
indicus 98
indicus 163
indicus 219
indicus 277
indicus 286
indicus 312
indigaceus 188
indigena 261
indigonacea 299
inducta 38
induta 156
induta 221
inermis 212
infans 244
infranitens 122
infuscata 289
INGRISMA 303
inlimbatus 105
innotata 174
INOPEPLINI 65
INOPEPLUS 65
inscitus 286
insignis 241
inspecularis 4
insulana 293
insulana 303
insulanus 291
insularis 36
insularis 40
insularis 75
insularis 86
insularis 193
insularis 241
insularis 250
insularis 304
insulicola 123
interjecta 186
intermedia 122

PAGE.

intermedia 156
intermedius 19
intermedius 131
interruptus 70
intersecta 154
intrusus 125
invenusta 289
IPHRA 225
IPIDIA 63
IPS 269
IRIDESSUS 14
irregularis 162
ISARIDA 153
ISCHNODACTYLUS 155
ishidae 86
ishidai 297
ishigakia 308
ISOLABUS 250
ISOMIRA 171
ISOMORPHUS 238
ITHONE 85
ITHYPHENES 61
ITHYSTENINI 242
ito 237
IXALMA 255

J

jacobyi 191
janso[illegible] 76
janthinus 69
japana 186
japana 195
japanus 314
japonensis 149
japonica 6
japonica 46
japonica 82
japonica 84
japonica 102
japonica 121
japonica 175
japonica 202
japonica 217
japonica 289
japonicum 30
japonicus 13
japonicus 17
japonicus 18

PAGE.

japonicus 19
japonicus 28
japonicus 47
japonicus 183
japonicus 211
japonicus 231
japonicus 245
japonicus 246
japonicus 286
japonicus 312
japonicus 65
janus 195
javana 150
javanica 310
javanicus 67
javanus 10
javanus 55
javanus 108
javanus 278
jekeli 57
jonasi 295
JONTHOCERUS 238
jousselini 21
jucunda 121
jucunda 310
jucunda 312
jugosa 207

K

kagiana 102
kagiensis 306
kaleea 4
kaleea 296
kankauensis 217
kankauensis 233
kankani 75
kankani 145
katoi 253
katoi 263
kawamurae 128
kikuchii 85
kikuchii 127
kikuchii 167
kikuchii 168
kiotoensis 291
kirbyanus 81
klugi 305
kokuronis 90

	PAGE.
KOLBEUS	276
konoi	171
kosempoensis	25
kosempoensis	26
koshunensis	102
koshunensis	129
koshunensis	133
koshunus	90
kotoensis	250
kotoensis	285
kotoensis	311
kraatzi	22
kunzeni	10
kuronis	117

L

labariosa	289
labiatus	2
labilis	274
laborator	240
LACCOPHILINAE	16
LACCOPHILUS	16
LACCOPTERA	194
LACHNOPTERUS	222
LACON	127
laconoides	131
lacteomaculata	25
lacunipennis	266
laeticolor	226
LAEMOGLYPTUS	109
LAEMOPHLOEINI	65
LAEMOPHLOEUS	65
laeta	253
laeticeps	105
laeticolor	14
laetus	302
laetus	303
laevicollis	274
laevigatus	313
laevior	66
laevistriatus	276
LAGRIA	167
LAGRIINAE	167
LAGRIOCERA	168
LAJUS	107
lama	271
lameeri	231
LAMIA	193
LAMIINAE	197
LAMIINI	198
laminipes	158
LAMPEROS	165
LAMPRA	121
LAMPROLABUS	260
LAMPROPHORUS	101
LAMPROSOMA	186
LAMPROSOMINAE	186
LAMPYRINAE	101
LAMPYROCERINAE	99
lampyroides	100
landaisi	20
languidus	8
LANGURIINAE	73
LAOGENIA	256
LARINUS	252
larvatus	129
LASIOCHILA	192
LASIODACTYLUS	64
LASIODERMA	118
LASIOPSIS	292
lata	291
lata	305
latecostatus	238
latefascia	207
lateralis	48
lateralis	157
lateralis	187
laterialba	208
lateritius	67
laterufescens	232
LATHETICUS	159
LATHROBIUM	30
laticeps	179
laticincta	15
laticollis	156
laticostatis	239
latifasciatus	107
latior	63
latiusculus	24
latreillei	163
latus	35
latus	94
LEBIA	16
LEBIDIA	15
lefevrei	188
legatus	313
LEICHENUM	153

PAGE.
LEIOCHRINAE 156
LEIOCHRINUS 156
LEIOCHRODES 156
LEIS 86
LEMA 184, 313
LEMULA 225
lentus 97
lentus 259
lenzi 280
LEONTIUM 230
LEPADORETUS 300
LEPERINA 59
lepidus 267
LEPRODERA 198
LEPTACINUS 31
LEPTALEUS 180
LEPTAMORPOCEPHALUS 240
LEPTAPODERUS 262
LEPTARTHA 191
LEPTAULAX 270
LEPTOCARABUS 5
LEPTOCHIRI 22
LEPTURINI 225
lesnei 231
LESTICUS 8
LEUCOCRASPEDINI 36
LEUCOCRASPEDUM 36
LEUCOPARYPHUS 36
leucoscutellatus 235
leucos[illegible]eticum 224
levis 219
lewisi 53
lewisi 54
lewisi 67
lewisi 78
lewisi 79
lewisi 87
lewisi 130
lewisi 154
lewisi 180
lewisi 186
lewisi 189
lewisi 204
lewisi 268
lewisi 283
lewisi 313
lewisii 267
lewisius 24
lewisius 29

PAGE.
lewisius 32
libidinosa 295
LIBNETIS 107
LICENOPHANES 118
ligatus 133
limbatum 160
limbatus 6
limbatus 18
limbifera 295
limbolaria 19
LIMNASTIS 8
LINA 188
linbaticollis 178
LINDA 218
lineata 214
lineaticeps 217
lineaticollis 108
lineatomaculata 215
lineicolle 55
lineola 15
lineolata 202
lineolus 249
lineosa 214
LIOCOLA 307
LIPRUS 191
LISPINI 22
LISPINUS 23
LISTROBYCTISCUS 266
LITARGUS 78
LITOCERUS 243
liturata 203
lividipenne 116
lividus 284
LIXINI 252
LIXUS 252
LOBERUS 76
longiceps 263
longicollis 68
longicollis 176
longicorne 223
longicorne 224
longicornis 33
longicornis 75
longicornis 214
longicornis 247
longimanus 256
longipenne 49
longipennis 23
longipennis 202

	PAGE.
longipes	246
longipes	277
longispinus	180
longissimum	166
longithorax	142
longulus	145
LOPHOCATERES	59
LUCANINAE	270
LUCANUS	270
LUCIDINA	100
LUCIDOTINAE	100
lucidula	313
lucidus	25
LUCIOLA	101
LUCIOLINAE	101
LUDIGENUS	142
LUDIINAE	142
LUDIUS	142
lugubris	126
luidus	200
lunata	236
lunatus	282
luniferus	69
lunigera	207
lunulata	70
LUPERODES	313
luridipennis	282
lutarius	56
lutea	192
luteipennis	37
luteipes	135
luteoguttata	73
luteolus	62
luteonotatus	181
lutescens	156
lutosopictus	282
luzonic	74
luzonica	120
luzonicus	134
luzonicus	162
LYCHROSIS	208
LYCOPERDINA	82
LYCOPERDININI	81
LYCOSTOMUS	103
LYCTUS	120
LYPONIA	103
LYPROPS	162
lyratus	17
LYSTRUS	254
LYTTINAE	176

M

	PAGE.
maaki	232
macleayi	72
macleayi	294
macleayi	302
MACRATRIA	179
MACROCHILUS	15
macrogona	5
MACROLYCUS	103
MACROMELA	75
MACROMINA	310
MACRONOTA	305, 311
MACRONOTIDES	305
MACRONOTINA	305
macrophthalma	290
MACROSIAGON	176
MACROTOMA	195, 314
MACROTOMINI	195
MACROTOMOXIA	174
macularis	91
macularius	199
maculata	189
maculata	222
maculaticollis	209
maculatithorax	105
maculatus	275
maculicollis	115
maculipes	246
maculonatus	268
madaranus	252
madurensis	33
madurensis	38
madurensis	81
magnicollis	232
magnicollis	233
magnifica	213
magnificus	178
malaccana	174
MALACHIUS	108
MALADERA	289
Malaisiensis	147
MALLAMBYX	220
MALTHINUS	108
mamilla	43
mandarina	86
mandarinea	82

PAGE.
mandibalaris 196
manilarum 160
marginalis 290
marginata 59
marginatum 30
marginatus 20
marginatus 81
marginatus 205
marginella 217
marginellus 61
marginellus 234
marginicollis 36
marginicollis 76
marginicollis 144
marginicollis 164
MARGITES 221
mariana 265
marinus 152
marmorata 290
MARMYLARIS 208
marshalli 311
marseuli 166
marseuli 175
MASTAX 9
matsumurai 171
matsumurana 261
matsumuranus 258
mauritanicus 59
maxillosus 314
maxi 170
maximoviczi 4
MECANTHRIBUS 242
MECISTOCERUS 311
MECOCERUS 242
MECODEMA 7
MECOPUS 254
MECYNOTARSUS 180
MECYSMODERUS 253
mediomaculatus 181
medius 77
medius 162
MEDON 29
megacephalus 17
megaceros 24
MEGALODACNE 73
MEGAPENTHES 132
MEGASTERNINI 96
MEGAUCHENIA 63
MEGOPIS 196, 314

PAGE.
melanarius 277
MELANAUSTER 199
melanocephalus 82
melanocephalus 133
melanocephalus 149
MELANOPHTHALMA 77
melanopterus 138
melanopyga 171
melanosternus 75
melanota 86
MELANOTINAE 137
melanotoides 138
MELANOTUS 139, 313
MELANOXANTHUS 133
melanula 207
meleagris 255
mellyi 20
MELOE 177
MELOLONTHA 293
MELOLONTHINAE 291
MELYBAEUS 123
mendicus 52
mendicus 281
MENEMACHINI 253
MENENEPHILUS 162
mentor 124
MERIONOEDA 227
MEROHISTER 57
MESOCHIROZETES 311
MESOMORPHUS 151
MESOPENTHEA 208
MESOSA 202
MESOSINI 202
mesosternalis 311
METALLACTULUS 274
metallica 197
metallicus 31
METANEUS 106
METAPOCYRTUS 249
methocoides 236
METOPIESTES 79
METOPODONTUS 272
METRIAULACUS 139
METRIONA 194
MIAENIA 212
micans 24
MICRENCAUSTES 70
MICROLANGURIA 76
MICROLERA 210

PAGE.
MICROLOMALUS 53
MICROMULCIBER 205
MICROPEDINUS 151
MICROPELECOTOIDES 175
microps 26
MICROSCYDMUS 44
MICROTRICHIA 292
MICROVONUS 79
midas 278
MIKADO 47
milabilis 131
miles 241
milis 73
MIMASTRA 190
MIMELA 298, 313
MIMEMODES 69
MIMOGONUS 26
minimus 35
minimus 77
minimus 180
minor 21
minor 124
minuta 45
minutissimus 153
minutum 36
minutus 22
minutus 33
minutus 66
minutus 118
MIOLISPA 239
mirus 77
misellus 311
MISOLAMPIDIUS 314
MITOMORPHUS 31
miwai 60
miwai 167
miwai 258
mniszecnii 314
MOECHOTYPA 206
moerens 150
moestus 284
modesta 303
modestum 187
modestus 128
molitor 161
mollis 113
MOLORCHINI 227
molossus 278
monaldaoi 311

PAGE.
MONANUS 68
mongolica 299
MONOCHAMINI 198
MONOCHAMUS 198
MONOCHIRUS 193
monogramus 12
MONOLEPTA 191
MONOMMA 172
MONOTOMA 69
MONOTOMINAE 69
monstrosicornis 181
montana 60
montana 70
montanus 128
monticola 262
montivagus 134
montrouzieri 88
MORDELLA 174
MORDELLINI 174
MORDELLISTENA 175
MORIO 13
morio 47
morosum 259
MORPHOSPHAERA 312
mortuorum 26
mosonica 244
motschulskyi 62
mouhoti 74
mouhoti 85
moultoni 70
mounaldaui 146
m-signatus 109
MUCRONIANUS 244
multidens 56
multiguttata 63
multilatus 61
multimaculatus 64
multimaculatus 93
multinotatus 173
mundula 101
mundum 115
murpurea 260
mus 130
musculus 52
musculus 128
museorum 93
mushana 59
mushanus 141
mushanus 144

	PAGE.
mushanus	262
mushensis	220
mutabilis	145
MYCETAEINAE	80
MYCETAEINI	80
MYCETOPHAGUS	78
MYCETOPORUS	34
MYLABRIS	176
MYLLAENA	36
MYLLAENINI	36
MYLLOCERUS	251
MYRMEDONIAE	39
MYRMEDONIINI	37
myrmido	124

N

naevia	209
nanophyes	8
NANOPHYES	258, 311
NANOPHYINI	258, 311
NAPOCHUS	44
narae	286
nasutum	176
nasutus	104
NEBRIA	5
nebulosus	242
NECROBIA	116
NECROBIOIDES	161
NECRODES	46
NECRODINI	46
NECYDALINI	226
NECYDALIS	226
NEDA	89
neglecta	209
NELIGETHINAE	60
NEMOGNATHINAE	178
NEMOSTIRA	169
NEOCERAMBYX	220
NEOCLERUS	114
NEOCOLLYRIS	1
NEODEPRAUS	265
NEODIPLOCONUS	137
NEOHELOTA	62
NEOLUCANUS	271
NEOSERICA	290
NEOSERIXIA	214
NEOSPHAERION	223
NEOTRICHOPHORUS	142
NEOTRIPLAX	71
neoxenum	229
nepalensis	46
NEPHUS	88
NERTHOMMA	245
NESSIARA	244
NESSIODOCUS	244
NEURAPHINI	44
NICOTIKIS	55
NICROPHORINI	46
NICROPHORUS	46
niger	93
niger	116
NIGIDIONUS	275
NIGIDUS	274
nigra	46
nigra	219
nigra	228
nigra	304
nigra	311
nigrescens	39
nigriceps	24
nigriceps	96
nigricinctus	123
nigricollis	140
nigricollis	306
nigricolor	311
nigricornis	46
nigriforns	185
nigrimembris	106
nigripennis	88
nigripennis	109
nigripennis	133
nigripennis	140
nigripennis	189
nigripes	33
nigripes	82
nigripes	163
nigripes	187
nigripes	239
nigrita	187
nigritarsis	302
nigroaeneum	165
nigroapicatus	262
nigrobilineata	191
nigrocinctulum	49
nigroguttata	288
nigroguttatus	262
nigrolineatus	104

	PAGE.
nigromaculata	203
nigromaculosa	288
nigromarginatus	112
nigromarginatus	114
nigromarginatus	255
nigroplagiatum	276
nigroscutellaris	305
nigrostriatus	106
nigrotibialis	171
niitakana	5
niitakana	311
nilgirensis	75
NIPHONA	206
NIPHONINI	206
niponensis	52
niponensis	54
niponensis	142
niponicus	50
niponicus	57
niponicus	89
niponicus	266
NIPONIUS	58
nitida	14
nitidiceps	281
nitidicus	247
nitidipennis	160
nitidissima	111
NITIDULINAE	62
nitidulus	13
nitidulus	16
nitidulus	40
nitidum	112
nitidus	280
nitens	264
nitobei	134
nivicincta	4
nobilis	253
NOCERIUS	220
nodicornis	263
NODINA	186
nokozanus	143
nokozanus	236
NORTIA	220
notabilis	33
notabilis	234
notatus	112
NOTERINAE	16
nothus	136
NOTODOMA	58
notopedalis	73
nubilus	89
NUPSERHA	216
NYCTIMENE	205
NYCTIMENINI	205

O

	PAGE.
OBEREA	216
oberthuri	60
oberthuri	167
oberthuri	187
oberthuri	240
oberthuri	312
obesa	42
obesus	221
obliquecauda	269
obliquefasciatus	2
oblitus	132
oblongicollis	134
obnotatus	124
OBRIINI	225
OBRIUM	225
obscura	206
obscura	207
obscura	260
obscurioripes	99
obscuripenne	94
obscuripennis	174
obscuripennis	181
obscuripes	99
obscurus	161
obscurus	283
obsoletus	61
obsoletus	284
obtusata	195
obtusus	230
occipitalis	169
occipitalis	272
oceanitis	52
ocelota	213
OCHODAEINAE	275
OCHODAEUS	275
ochraceosignata	228
ochraceus	29
octoguttata	15
octomaculata	84
octomaculata	92
octospilotus	260

	PAGE.
oculalis	62
ocularis	39
oculatus	247
odontocera	167
ODONTOCHILA	2
ODONTOCHILINA	2
ODONTOLABINAE	271
ODONTOLABIS	271, 312
OEDEMERA	173
OEDEMERINI	173
OEDEMUTES	164
OEMINI	219
officinator	198
OICEOPTOMA	45
OIDES	189
okinaensis	298
OLENOCAMPTUS	294
OLIGOTA	36
OLIGOTINI	36
omissus	126
OMMADIUS	114
OMMATOLAMPUS	257
OMOPHRON	6
ONITICELLINI	279
ONITICELLUS	279
ONITINI	279
ONITIS	279
onoba	314
ONTHOPHAGINI	280
ONTHOPHAGUS	280
ONTHOPHILUS	50
OOSTERNUM	96
opaca	37
opacotuberculatus	283
opacus	107
OPATRINAE	151
OPATROIDES	152
OPATRUM	135
operosus	24
OPHIONEA	15
OPHRIDA	192
OPHTHALMAIA	314
OPILO	113
OPISTHENOPLUS	242
oppugnans	162
optabilis	51
optatus	294
orbiculus	88
orbifer	250
ORCHESTES	258
ORCHESTINI	258
ordinata	210
ordinatus	235
ORECTOCHILUS	314
orestes	125
orichalcea	311
orientalis	6
orientalis	13
orientalis	17
orientalis	20
orientalis	56
orientalis	82
orientalis	94
orientalis	157
orientalis	221
orientalis	261
orientalis	282
orientalis	285
orientalis	308
ornata	79
ornata	192
ornata	306
ornatellum	154
ornatus	120
OROCHLESIS	311
oriphanus	25
ORPHILINAE	93
ORPHILOIDES	93
ORPHINUS	93
ORSIDIS	199
orthocnemis	311
ORTHRIUS	113
ORYCTES	301
oryzae	159
oryzae	184
oryzae	256
ORYZAEPHILUS	68
oscitans	205
osculans	46
OSORIINI	26
OSORIUS	26
OSPHYA	173
OSPHYINAE	173
OSTEDES	212
ostreatus	50
OTHNIUS	169
OTIORRHYNCHINI	250
ovalis	102

PAGE.
ovalis 135
ovalis 253
ovatula 289
ovatus 8
ovatus 90
ovivarius 93
OXYCETONIA 310, 312
OXYDERES 244
OXYNOPTERINAE 130
OXYOMUS 285
OXYTELINAE 22
OXYTELINI 23
OXYTELOPSIS 23
OXYTELUS 23
OZOPEMON 269

P

PACHYDISSUS 221
PACHYLANGURIA 73
PACHYLISTER 56
PACHYLOMALUS 52
PACHYMERUS 182
PACHYPARNUS 94
pachypezoides 211
PACHYRRHYNCHINI 249
PACHYRRHYNCHUS 250
PACHYSERICA 290
PACHYTERIA 229
PAEDERINAE 26
PAEDERINI 26
PAEDERUS 26, 314
pagana 55
paganus 89
PAGRIA 313
paivae 73
palaeotropicus 27
palimnoides 204
pallens 185
palleola 296
pallescens 225
palliata 185
palliata 189
pallida 178
pallidiceps 34
pallidicinctus 284
pallidicolle 155
pallidipennis 151
pallidipennis 260
pallidipes 135
pallidirostre 259
pallidulum 187
pallidulus 30
pallipes 191
pallipes 279
PALORUS 158
palpator 42
PANELUS 277
panicea 117
PARABOSTRYCHUS 119
PARACARDIOPHORUS 135
PARACHADOXENA 76
PARACLYTUS 235
PARACYCNOTRACHELUS 263
PARAGLENEA 215
PARAGONUS 26
PARALACON 129
PARALICHAS 110
PARALITOSTETHUS 90
parallela 292
parallelaris 134
paralleliceps 303
PARALLELOSTETHUS 142
parallelus 31
parallelus 126
parallera 78
PARAMECOLABUS 260
PARAMETOPIA 63
PARANDRA 195
PARANDRINI 195
PARAPHLOEOBIUS 247
PARAPHYTUS 277
paraplesia 248
PARAPYROPTERUS 106
parastarioides 257
PARASTASIA 294
PARASTASIINA 294
PARATHOUS 140
PARATRACHELOPHORUS 263
PARAULACA 313
pardaloides 261
PAREMPLEURUS 311
parenthesis 88
PAREPIERUS 53
parilis 78
parki 80
parlida 235
PAROMALUS 52

PAGE.
PAROPLAPODERUS 261
parnicollis 221
parryi 272
parryi 275
parumpunctatus 31
parvipennis 38
parvulus 274
parvulus 277
PASSANDRINAE 66
patagiatus 88
patruelis 276
paulula 63
pauper 301
panssoides 29
PAUSSUS 21
paviei 245
pectinicornis 176
pectlis 182
PECTOCERA 130
pectoralis 114
PEDANUS 81
pedicularium 34
PEDININAE 150
PEDININUS 150
PEITHONA 225
PELECOTOMINI 175
plecotomoides 175
PELONIUM 115
PELTODYTES 19
PENCLITENA 313
PENGAMETHES 134
PENIA 141
penicillata 305
peninsularis 287
pennata 226
PENTAGONICA 9
PENTALANGURIA 73
PENTHICOIDES 150
peotinatum 42
PERANUS 57
PERATOGONUS 96
perelegans 256
PERICLITENA 190, 312
PERILANGURIA 74
PERISSUS 233
perlatus 252
permutans 198
perplexa 252
perrandieri 306, 311

PAGE.
persimilis 247
pertaetum 230
pervianus 92
PETALOSCELIS 70
PHAEDON 188, 313
PHAEOCHROUS 287
phaeogastra 296
PHAEONYCHUS 83
phalerata 177
PHALERIA 153
phanæoides 279
PHAULIMIA 245
PHELOTRUPES 276
PHEROPSOPHUS 10
PHILANTHAXIA 121
philemon 279
PHILINI 225
philippinarum 72
philippinensis 57
philippinensis 98
philippinensis 286
PHLOEOBIUS 247
PHORACANTHINI 223
PHRISSOMINI 197
phyeus 246
PHYGASIA 192
PHYLLOBIINI 251
PHYLLOCLADUS 178
PHYLLOPERTHA 298
PHYLLOTRETA 191
PHYMATAPODERUS 262
PHYMATODES 232
PHYSAUCHENIA 185
PHYSODERA 13
PHXSORRHININAE 134
PHYTOECIA 218
PHYTOECIINI 251
PHYTOSI 37
PHYTOSUS 37
piceus 158
piceus 266
pici 108
pici 196
picipes 69
picipes 148
pictula 15
pictum 259
pictus 12
pictus 13

	PAGE.
pictus	64
pictus	82
PIESTINI	12
PIEZOTRACHELUS	259
pilasellum	114
PILIDENTATA	268
pilifera	305
piliferus	27
pilosellus	62
pilositessellatus	265
pilosulus	138
pilosus	8
pilosus	283
pini	54
pini	130
piperata	195
pirithous	58
pisorum	138
pithecius	278
PLAESIUS	56
plagiata	6
plagiata	41
plagiata	205
plagiatus	8
plagiatus	205
plagicollis	33
plagioderoides	192
PLAGIUSA	36
planicollis	241
planicollis	312
PLATEROS	104
PLATINOTUS	150
platisoides	159
PLATYCIS	104
PLATYCREPIS	163
PLATYDEMA	155, 313
PLATYLISTER	54
platymelus	273
PLATYNASPIS	87
PLATYNECTES	18
PLATYPROSOPUS	31
PLATYPUS	267
PLATYRHOPALUS	20
PLATYSCELINAE	150
PLATYSCELIS	150
PLATYSOMA	53
PLATYSOMINI	53
PLATYSTETHUS	24
PLAXOMICRUS	219
plebejus	142
PLECTAURA	197
PLECTROSTERNUS	146
PLESIOPHTHALMUS	165
PLEUROCERINAE	242
plicatipennis	118
plicatulus	254
plicatulus	254
PLOCAEDERUS	221
plumbeus	258
POCADITES	64
PODABRUS	98
PODONTIA	192
poecilochalcea	295
poecilus	245
POGONOCHERINI	211
POGONOCHERUS	211
polijanor	295
polita	157
polita	304
politus	87
politus	127
politus	142
POLYCTESIS	311
POLYPHYLLA	293
POLYZONUS	230
PONYALIS	104
POPILLIA	299
POPILLIINA	299
PORODERUS	43
PORRHYNCHUS	20
postica	40
postica	207
postica	253
postica	307
posticalis	2
posticata	217
postrema	185
POTHYNE	211
POTOSIA	307
poweri	241
praefectus	12
praetexta	100
PRAOLIA	213
prasina	122
prasinata	307
PRIA	60
prianus	124
PRIOCHIRUS	22

	PAGE.
PRIONINAE	195
PRIONINI	193
PRIONOCERUS	107
prionoides	225
PRIOPTERA	195
PRIOTYRANNUS	196
priseus	284
PRISMOGNATHUS	272
PROCAUTIRES	106
procera	306
processa	91
PRODIOCTES	311
PRODRASTERIUS	132
proletarius	282
prolongatus	113
PROMETOPIA	63
propheti	237
PROPHTHALMUS	240
propinquus	77
propinquus	279
PROPYLEA	84
PROSTHECARTHRON	43
PROTAETIA	308
PROTHEMA	228
PROTHEMINI	228
PROTHYMA	1
PROTHYMINA	1
PROTONECRODES	46
proxima	1
proxin...	306
proximus	69
pruinosa	292
pryeri	309
PSACOTHEA	198
PSALIDOREMUS	272
PSAMMOBIINA	286
PSAMMOBIUS	286
psammodroma	4
PSAMMOECINI	68
PSAMMOECUS	68
PSELAPHINAE	40
PSELLIS	137
PSEUDABAX	164
PSEUDADRUS	152
PSEUDALE	208
PSEUDOBALANININA	254
PSEUDOBLAPS	150
PSEUDOBOTHRIDES	20
PSEUDOCALAMOBIUS	211
PSEUDOCEOCEPHALINI	242
PSEUDONAUTES	164
PSEUDOPIDONIA	226
PSEUDOPYROCHROA	178
PSEUDORYCHODES	241
PSEUDOTHAPHRODERES	240, 312
PSEUDOZAENA	6
psilica	3
psyllioides	117
PSYDUS	164
PTERICOPTINI	210
PTEROLOPHIA	206
PTEROTARSUS	146
PTILODACTYLA	111
PTILODACTYLINAE	111
PTININAE	117
ptinoides	210
PTINUS	117
PTOMASCOPUS	47
PTOMAPHAGUS	47
pubens	151
pubens	238
puberula	40
pubescens	71
puerilis	146
pulchellator	200
pulchra	214
pulchripes	81
pulla	157
PULLUS	89, 312
punctata	201
punctatipennis	150
punctatissima	4
punctatostriata	210
punctatus	275
punctillatus	44
punctipennis	53
punctipennis	219
punctipennis	243
punctipennis	314
punctulatus	44
punctulatus	56
punctus	26
purcherrima	5
purpuratus	164
purpureus	105
PURPURICENUS	237, 314
purpurvittatus	164
purus	104

	PAGE.
pusillimus	183
pusillus	59
pustulifer	162
putridus	129
PYCNOMERINI	79
PYCNOMERUS	79
pygmaea	55
pygmaeum	97
pyramidata	73
PYRESTES	227
PYRESTINI	227
PYROCALYMMA	227
pyrochroides	227
PYROCOELIA	100
PYROPOTOSIA	309
PYRRHONA	226
pyrrhus	124
PYXIDICERINI	40

Q

quadricolle	230
quadricollis	63
quadricolor	235
quadridens	275
quadrifasciata	209
quadriguttata	209
quadriguttatus	51
quadriguttatus	81
quadriguttatus	87
quadriguttatus	134
quadriguttatus	313
quadrillum	8
quadrillum	89
quadrimacula	72
quadrimaculata	63
quadrimaculata	158
quadrimaculata	194
quadrimaculata	314
quadrimaculatus	180
quadrimaculatus	183
quadrimaculatus	230
quadrinotata	211
quadrinotatum	223
quadrinotatus	13
quadrinotatus	23
quadripes	233
quadriplagiata	85
quadriplagiata	313
quadripustulatus	69
quadrisignatus	205
QUASIMUS	135
quattuordecimstriata	52
QUEDIINI	34
quindecimguttata	84
quindecimmaculata	87
quinquefasciatus	234
quinquemaculata	187
quinquemaculatum	95
quinquemaculatus	114
quinquenspinatus	268
quinquepunctata	20
quinquepunctatus	88
quisquilius	181
quisquiliarius	32

R

RAAPIA	147
raddei	220
radivolus	125
ramicornis	110
ramosus	148
rarus	135
rectangulus	33
rectus	273
reducte-lineata	3
reductelineata	108
reductescripta	4
reductesignata	217
reflexus	279
regalis	139
REGIMBARTIA	98
regularis	59
regularis	222
reichei	273
reichei	284
REICHENBACHIA	42
reini	288
reitteri	255
relicta	214
relucens	14
rengetensis	267
repandus	244
repanda	84
resplendens	304
restrictus	138
reticulatus	242

	PAGE.
reversus	96
RHAETULUS	271
RHANTATICUS	18
RHAPHIDOPALPA	313
RHAPHUMA	234
rhinoceros	301
RHIPICERINI	148
RHIPIDIINI	176
RHIPIDIUS	176
RHIPIPHORUS	176
RHIZOBIUS	91
RHIZOPERTHA	120
rhizophagoides	67
RHODOPINI	204
RHODOPIS	204
RHOMBORRHINA	304
RHOMBORRHININA	303
RHYNCHITES	265
RHYNCHITINI	264
RHYNCHOPHORUS	256
RHYPARINA	286
RHYPARUS	286
RHYSODES	21
RHYSSEMUS	286
RHYTIDODERA	222
rigida	207
robustor	75
robustus	133
robustus	159
RODO[illegible]A	91
roelofsi	245
roelofsi	258
rollei	173
rollei	236
RONDIBILIS	212
ROPICA	209
ROSALIA	231
roseonotata	100
rostralis	251
rotundata	63
rotundatus	17
rotundatus	51
rotundicollis	160
rotundulus	90
rougeti	87
rubens	70
ruber	200
rubricollis	145
rubripennis	104
rubripes	95
rubrofemoratus	273
rubus	201
rufangulus	140
rufescens	28
ruficephalus	143
ruficolle	48
ruficollis	116
ruficollis	140
ruficollis	168
rufifrons	109
rufina	171
rufipenne	31
rufipenne	231
rufipennis	83
rufipennis	169
rufipennis	170
rufipes	97
rufipes	116
rufipes	210
rufithorax	109
rufithorax	137
rufithorax	140
rufitibialis	252
rufiventris	100
rufiventris	139
rufiventris	265
rufoapicalis	108
rufobrunnea	291
rufoniger	33
rufonotatus	111
rufopiceus	35
rufotestacea	184
rufus	42
rufus	90
rufus	146
rugicollis	169
rugicollis	202
rugosipennis	173
rugosostriatus	283
russatus	285
rusticator	199
rusticola	309
RUTELINAE	294
RUTELINI	294

S

sacchari	132

	PAGE.
saccharivora	253
SAETIDENTATAE	269
sagax	296
sagittarius	279
sahlbergi	292
SAIMIA	203
saitoi	290
sakaguchii	128
salebrosa	289
salicis	127
SAMBUS	123
SANDALINI	149
SANDALUS	149
sanguineus	140
sanguineus	143
sanguinicollis	112
sanguinicollis	138
sanguinicollis	143
sanguiniventer	100
sanguinolenta	213
sanguinolentus	237
SANTALUS	56
SAPERDA	213
SAPERDINI	213
SAPRININAE	51
SAPRINUS	51
SAPROSITES	286
sarcitis	250
SARMYDYS	197
SATHYTES	42
satzumae	121
sauciipes	41
SAULA	82
saundersi	123
saundersi	127
sauterana	74
sauteri	1
sauteri	2
sauteri	3
sauteri	4
sauteri	5
sauteri	9
sauteri	19
sauteri	21
sauteri	24
sauteri	25
sauteri	26
sauteri	28
sauteri	41
sauteri	43
sauteri	44
sauteri	47
sauteri	50
sauteri	52
sauteri	53
sauteri	56
sauteri	61
sauteri	64
sauteri	65
sauteri	67
sauteri	74
sauteri	77
sauteri	78
sauteri	79
sauteri	80
sauteri	88
sauteri	92
sauteri	95
sauteri	97
sauteri	98
sauteri	99
sauteri	102
sauteri	105
sauteri	108
sauteri	109
sauteri	111
sauteri	112
sauteri	115
sauteri	117
sauteri	118
sauteri	121
sauteri	122
sauteri	123
sauteri	124
sauteri	126
sauteri	127
sauteri	144
sauteri	145
sauteri	147
sauteri	149
sauteri	154
sauteri	155
sauteri	170
sauteri	173
sauteri	174
sauteri	175
sauteri	179
sauteri	180

	PAGE.
sauteri	181
sauteri	184
sauteri	193
sauteri	194
sauteri	196
sauteri	215
sauteri	252
sauteri	253
sauteri	255
sauteri	257
sauteri	259
sauteri	264
sauteri	267
sauteri	271
sauteri	281
sauteri	289
sauteri	291
sauteri	292
sauteri	296
sauteri	299
scaber	283
SCAPHIDEMA	154
SCAPHIDIUM	48
scaphoides	152
scaphoides	192
SCAPHOSOMA	49
SCARABAEINI	276
SCARABAEUS	311, 312
SCARITES	6
SCELAENUS	143
scenicus	258
SCEPTICUS	249
shaumi	55
schenklingi	37
schenklingi	41
schenklingi	44
schenklingi	54
schenklingi	76
schenklingi	96
schenklingi	156
schenklingi	166
schenklingi	259
schenklingi	265
schenklingi	273
SCHISTOGENIA	39
SCHISTOGENINAE	39
schoenfeldti	306
schoenherri	177
SCHOENHERRIA	293
SCIRTES	111
scitus	269
SCLERON	151
SCLEROLIPS	311
SCOPAEUS	29
scopula	42
SCOTAEUS	163
scotomedes	11
scriptipenne	155
scrofa	128
sculpturatum	7
sculpturatus	79
scutellaris	272
scutellata	207
scuticollis	68
SCYDMAENINI	45
SCYDMAENUS	45
SCYMNUS	88
SCYTHON	147
SEBAETHA	192
sedecimnotata	86
segmentaroides	284
sejugatus	263
SEMACIA	312
SEMANOTUS	231
semifulva	60
semiglobosum	49
semigriseus	147
semiignitus	229
seminiveus	211
semiopacus	269
semipunctatus	41
semirufum	48
semistriatus	51
semisuturalis	10
semivelutinum	229
semperi	18
seniculus	281
SENODONINAE	141
separandus	265
SEPHILUS	131
septempunctata	83
septenaria	84
septentrionus	72
serialis	179
seriatomaculatus	212
seriatoporus	150
seriatopunctatus	163
seriatum	95

PAGE.
SERICA 288
sericea 175
sericeomicans 198
sericeus 167
SERICINAE 288
SERICODERUS 48
seriehispidum 153
SERIXIA 213
serricorne 118
serrirostris 241
serrulata 293
serverini 267
servilis 136
SESSINIA 172
SETENIS 160
setiger 28
setigera 28
setigera 236
setosus 251
sevilis 126
sexmaculata 85
sexmaculata 312
sexmaculatus 8
sexmaculatus 11
sexmaculatus 107
sexmaculatus 108
sexpunctata 4
sexpunctatus 132
sexspinosus 269
sharpi 16
sharpi 19
shirakii 4
shirakii 135
shirakii 261
siamense 9
siamensis 41
siamensis 43
sibilica 118
sieboldi 142
signaticollis 115
signaticollis 234
signaticornis 214
signaticornis 218
signatus 68
signatus 227
signellus 245
signipes 237
sika 273
silacea 211

PAGE.
SILESIS 145
SILPHA 45
SILPHINAE 45
SILPHINI 45
silphoides 36
SILVANINAE 67
SILVANINI 67
SILVANOPHUS 67
SILVANUS 67
silvestre 54
silvestris 23
SIMIANELUS 149
similis 16
similis 68
similis 103
similis 148
similis 169
similis 190
similis 193
similis 303
simius 255
simplex 19
simplex 38
simplex 74
simplex 113
simulans 218
simulans 222
sinae 51
sinense 230
sinensis 19
sinensis 44
sinensis 60
sinensis 111
sinensis 131
sinensis 162
sinensis 222
sinensis 291
singhalensis 41
singularicollis 106
sinica 196
sinica 289
sinica 296
sinica 314
sinicum 224
sinicus 300
siniopyga 296
SINTOR 243
sinuaticollis 44
sinuatipes 169

PAGE.
sinuatum 48
sinuatus 277
sinuatus 284
SISYPHUS 277
SITODREPA 117
siva 271, 314
sobrius 193
socius 106
sodalis 89
SOLANOPHILA 92
solidus 267
solskyi 314
sonami 133
sonani 60
sonani 136
sonani 137
sonani 250
sonani 282
sonanis 143
sordida 38
sordidus 256
soreli 190
sorex 285
sorocinus 126
SPALACOPSINI 212
speciosus 51
speciosus 141
speciosus 199
spectabilis 164
spectabilis 165
spectabilis 237
speculifer 307
SPERMORHAGUS 184
sphacelatus 242
SPHAERIDIINAE 95
SPHAERIDIINI 95
SPHAERIDIUM 95
SPHAERIONINI 223
sphaerioninus 223
SPHENISCOSOMUS 138
SPHENOCORYNUS 256
spilota 186
spinicollis 159
spinicornis 221
SPINIDENTATAE 268
spinosa 309
spinosula 212
spiridion 125
splendens 238
splendens 298
splendens 299
splendida 291
splendida 304
SPONDOTRIPLAX 71
spretus 255
spuria 305
squamacea 238
squamaceus 255
squamosus 249
STAPHYLININAE 31
STAPHYLININI 32
staphylinoides 29
STAPHYLINUS 33
STATIRINAE 168
STELIDOTA 63
STENASPINI 236
STENINAE 26
STENINI 26
STENODRYAS 224
STENOTARSINI 82
STENUS 26
STENYGRINUM 223
stercorea 78
STELEODERMINI 238
STERNAULAX 55
STERNOLOPHUS 97
STERNOPLISTES 237
STETHORUS 90
stibinus 246
STIBODERES 246
STICHOLOTIS 87
sticticus 18
stictieus 243
STIGMATIUM 114
STILICOPSIS 28
STILICUS 28
STOMONAXUS 14
streptopyga 295
striata 12
striata 260
striaticollis 14
striatipennis 160
striatipennis 273
staiatulus 149
striatus 72
striatus 313
stridula 289
strigicollis 150

PAGE.

strigosus 150
striolata 3
striolatus 79
striolatus 152
STROMATIUM 223
STRONGYLIINAE 166
STRONGYLLIUM 166
stultum 68
stultus 95
suaviter 237
subannulipes 217
subaratum 153
subchalybeata 227
subcrenatus 162
subdepressus 158
subelongata 171
subfascia 155
subfasciata 91
subfasciata 212
subfasciatus 17
subfasciatus 199
subglaber 35
submarginatus 26
submarmorea 307
subocellatus 313
subopacipennis 99
subparallelus 102
subrufescens 161
subrufescens 118
subspinosum 313
subspinosus 109
substriata 102
substriatellus 276
subtestaceus 66
subtilesculpta 4
subtuberculatus 264
subundulatus 184
subuniforme 224
succinctor 201
suffusa 214
sugillatus 19
sulcatus 6
sulcicollis 140
sulcifrons 32
sulcifrons 313
sulcipenne 196
sulphuriventris 287
sulphurus 242
sumatranus 239

PAGE.

sumatrensis 3
surinamensis 68
suturalis 191
swinhoei 11
swinhoei 85
swinhoei 185
swinhoei 215
swinhoei 271
SYBRA 210
SYMPIEZOMIAS 249
SYNAPSIS 278
SYNAPTOPS 260
SYNCHITINI 78
SYNIA 87
SYNONYCHA 85
SYNSTROPHUS 173
systenus 136

T

tabacci 313
TACHYGONINI 255
TACHYPORINAE 34
TACHYPORINI 34
TACHYPORUS 34
TACHYS 7
TACHYUSIDA 37
taciturnus 129
TAGONOIDES 149
taiheizanus 311
taihokuensis 293
taihorensis 234
taihorinensis 264
taihorinus 45
taikozana 144
tainanensis 89
taishoensis 72
taiwana 59
taiwana 141
taiwana 179
taiwana 299
taiwana 308
TAIWANATHOUS 141
taiwanensis 127
TAIWANIA 194
TAIWANOBYCTISCUS 265
taiwanus 89
taiwanus 128
taiwanus 172

	PAGE.
taiwanus	257
takahashii	250
takahashii	257
takanoi	138
takanonis	85
takaosus	181
tamsuyensis	139
TANYMECINI	249, 311
TANYMECUS	249, 311
taprobanae	21
tarandus	272
tardus	33
TARSOSTENUS	115
tattakensis	140
taurinus	281
taurus	274
telum	138
temmineki	314
temperatus	140
TENEBRIO	161
TENEBRIOIDES	59
TENEBRIONINAE	160
tenebrosus	157
tener	55
TENERUS	115
TENGUZO	252
tenuatum	230
tenuicorne	66
tenuicornis	256
tenuis	314
TERETRINAE	50
TERETRIOSOMA	50
teretus	84
terminalis	112
terrenus	183
terricola	6
tessellatocollis	313
tesserula	199
testacea	153
testacea	218
testaceicolor	182
testaceicornis	118
testaceipes	235
testaceoviridis	299
testaceus	29
testaceus	66
TETRALANGUROIDES	74
TETRAOPINI	218
tetraspilotus	230
TETRATOMINAE	173
TETRIGUS	130
textor	198
thais	194
thaiwanus	311
THANATOPHILUS	45
THEA	84
THECA	118
THERATES	2, 311
THERATINA	2
THEREBUS	311
thermarum	32
THERMONECTINI	18
therobromae	183
thibetanus	57
THLASPIDA	194
thomsoni	229
thoracica	45
thoracica	60
thoracica	236
thoracicus	24
thoracicus	277
thoracicus	302
THORACOCHIRUS	22
THRANIINI	226
THRANIUS	226
THYESTILLA	213
tibialis	7
tibialis	156
tibialis	177
tibialis	220
tibialis	254
tigrinus	249
TILLINI	111
TILLOMORPHINI	236
TILLUS	112
titanus	272
tobafolius	250
TOMAPODERUS	262
tonkinensis	22
tonkinensis	26
tonkinensis	98
tonkinensis	144
tonkinensis	306
tonkinensis	309
TORAMUS	76
TORYNORRHINA	304
tosta	127
TOXICUM	161

PAGE.
TOXOTINUS 225
TRACHELIZINI 239
TRACHELIZUS 239
TRACHELOPHORINI 263
TRACHYCYRTUS 249
TRACHYLOPHUS 222
trachypyga 298
TRACHYODES 311
TRACHYPHLOEINI 311
TRACHYPHOLIS 79
TRACYSCELINAE 153
TRACHYSCELIS 153
tragus 281
transversalis 84
transversus 268
treini 225
triangularis 7
triangularis 131
triangulus 68
TRIBALINI 53
TRIBALUS 53
TRIBOLIUM 158, 313
TRICANUS 64
TRICHIINAE 301
trichimerus 240
TRICHIORHYSSEMUS 286
TRICHIUS 301, 311
TRICHOLUS 71
TRICHOSTOMES 189
tricolor 90
tricolor 171
tricolor 311
TRICONDYLA 1
tricornis 282
tricornutum 161
TRICTENOTOMA 182
tricuspis 313
tridentatus 240
trifasciata 203
trifassiatus 185
trifasciatus 238
trifasciella 201
trifidus 257
trifoliata 76
trigibber 180
trigibber 181
TRIGONOPHORUS 303
TRIGONOPODA 151
TRIGONOTOMA 9

PAGE.
trigrinus 64
trilineata 174
trilobatus 41
TRIMENUS 62
TRIMIOMICRUS 43
TRINODES 93
TRINODINAE 93
triodes 244
tripartitus 278
TRIPETICINAE 50
TRIPETICUS 50
TRIPHERUS 109
TRIPLACINI 70
TRIPLATOMA 72
TRIPLAX 71
tripunctatus 19
tripustulatus 15
TRIRACHYS 221
tristoides 261
TRITOMA 71
trituber 278
TROCHOIDEINAE 81
TROCHOIDES 81
TROGINAE 283
TROGOPHLOEUS 23
TROPIDERES 245
TROX 283
truncatus 149
TRYPOXYLUS 312
tsunobosonis 312
tuberculatus 117
tuberculatus 264
tuberculatus 269
tuberculipennis 128
tumaaka 60
tumens 129
tumidicollis 147
turmaris 281
tutus 135
tyndarus 125
TYPHAEA 78
TYPINI 44
tyrtaeus 125

U

ULEIOTA 65
ULEIOTINI 65
ULOMA 157

PAGE.
ULOMINAE 157
ulomoides 161
umber 139
umbiratica 210
umbraculata 203
umbratus 113
umbratus 155
undatus 188
undulatus 222
unicolor 28
unicolor 30
unicolor 112
unicolor 171
unicolor 184
unicolor 304
unicum 54
uniformis 96
uniformis 264
univittatus 116
URAECHA 200
uraiensis 129
uraiensis 227
uraiensis 311
urbanus 183
urostigma 283
ustus 96
uvidus 29

V

VALGINAE 302
valgipes 160
validus 262
validus 269
vanvolxemi 5
variabilis 208
variabilis 209
variabilis 251
varians 51
varians 303
varicolor 157
varicornis 205
variecollis 202
variegata 83
variegata 205
variegata 211
variegatus 226
variegatus 252
variepennis 212
variiconris 314
variolosa 63
variolosus 22
velatus 80
velutina 170
velutinus 28
velutinus 30
velutinus 274
venalis 139
venator 50
vendri 271
ventralis 139
venustus 264
verbasci 93
vernalis 53
versicolor 310
versuta 215
vertagus 279
vespertina 195
VESTA 99
vestitoides 45
vestitus 45
vexans 38
viaticus 52
viator 74
vicinalis 96
vicinum 49
vidua 85
viduus 125
vigintioctopunctata 91
vigoris 312
vigorsi 190
vilis 29
vilis 89
violacea 116
violaceipennis 115
violaceus 154
violaceus 163
virgatus 204
viride 230
viridicostata 295
viridmetallica 169
viridirufa 295
viridula 306
vittata 121
vittata 191
vittata 212
vittatus 18
vittatus 70

PAGE.
vitticeps 261
vittiger 144
vossi 263
vulpinus 93

W

wallacei 48
wallacei 266
watanabei 102
watanabei 131
waterhousei 177
waterhousei 314
weisei 86
wichmanni 241
williger 151
wissmanni 91

X

x-album 311
XANTHOCHELUS 252
XANTHOCHROA 314
XANTHOLININI 31
XANTLINUS 31
xanthopleura 297
xantippus 125
xavieri 52
XENORTHRIUS 113
x-notatus 69
XOANODERA 222
x-rubrum 63
XYLEBORUS 269
XYLINADES 246
XYLOBANUS 106
XYLOPSOCUS 119
XYLOTRECHUS 232, 312
XYLOTHRIPS 119
XYLOTROGUS 120
XYLOTRUPES 300
XYSTROCERA 220

Y

yaminus 250
yanagiharae 136
yunnana 121
yunnanus 101

Z

ZABROMORPHUS 56
zealandica 55
zebrinus 208
ZETHOPSUS 40
zeylanicum 224
ZIAELAS 167
zigzaga 314
ZINIPTERUS 229
ZONITIS 178
ZOOBLAX 314
zuguronis 90
ZUPHIUM 9
ZYGAENODES 244
ZYGOPINI 254
ZYRAS 39